

ΚΟΥΠΡΟΛ 50WP

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ 50% σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού
(Copper oxychloride σε Cu 50%)

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγ. Σύνθεση: Μεταλλικός χαλκός 50% β/β
σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού
Βοηθ. ουσίες 10,71 % β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ:
6275/26.02.1980

Ανόργανο μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πολύ τοξικό για τους
υδρόβιους οργανισμούς
Μπορεί να προκαλέσει
μακροχρόνιες δυσμενείς
επιπτώσεις στο υδάτινο
περιβάλλον

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:
50 γραμμάρια

Κάτοχος της έγκρισης:
MAT INVESTMENT HOLDING S.L., Ισπανία
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε., Μουρούζη 9, 10674, Αθήνα
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-
Παρασκευαστής - Εργοστάσιο παρασκευής:
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A., Ισπανία

Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομή:



ΑΘΗΝΑ: Φλέμιγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900-9
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ, 57022 Σίνδος, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9
e-mail: info@hellafarm.gr

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: - Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.-
Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.- Το υλικό αυτό και ο
περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή
ειδικών αποβλήτων-Πλύντε τα ρούχα της δουλειάς μετά τον
ψεκασμό.-Μην αναπνέετε τη σκόνη ή το ψεκαστικό υγρό.-Να φοράτε
κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.- Σε περίπτωση
ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική
συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).
“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και
το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης”.
Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο: Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε
γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο
Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Πενικιλλαμίνη.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους
επικινδύνους απόβλητα. Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον.
Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη
περιοχή για 3 εβδομάδες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Είναι φυτοτοξικό στη Ροδακινιά, Κερασιά και Δαμασκηνιά
αφού φουσκώσουν τα μάτια και στα Κολοκυνθοειδή. Στη Μηλιά, Αχλαδιά να
χρησιμοποιείται πριν την άνθηση. Γενικά ν' αποφεύγεται η χρήση του κατά την
άνθηση. Οι ποικιλίες μηλιάς Golden delicious, Jonathan, Reinette και Staimon
είναι ευαίσθητες όταν το σκεύασμα εφαρμόζεται μετά την έναρξη της
βλάστησης.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δε συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής ή πολύ όξινης
αντίδρασης και με THIRAM ή CAPTAN.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της
συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι) μαζί με τα κουτιά
αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή
ανάκτηση ενέργειας.

**Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών .Τελευταία επέμβαση πριν τη
συγκομιδή:** Εσπεριδοειδή: 21 ημέρες, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα: Μη
εφαρμοσμένο (καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την
εφαρμογή), Αμπέλι: 21 ημέρες **Ελιά:** 21 ημέρες, **Λαχανικά (υπαίθρου +
θερμοκηπίου):** 7 ημέρες, **Τομάτα (υπαίθρου):** 10 ημέρες, **Τομάτα
(θερμοκηπίου):** 7 ημέρες, **Πατάτα:** 21 ημέρες.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Αποθηκεύετε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία, σε μέρος δροσερό, ξηρό
και σκιερό. Διατηρείται σταθερό 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής, όταν
αποθηκεύεται σύμφωνα με τις παραπάνω συνθήκες.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:



ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΟΣΗ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέϊφ
φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά): εναντίον προσβολής κλαδίσκων, φύλλων
και καρπών από Pseudomonas syringae. Εφαρμογές με δόση 190 γρ/ 100 λίτρα ψ.υ.
πριν την έναρξη των βροχών και μετά από χαλάζι ή παγετό. Όγκος ψεκαστικού υγρού
(λίτρα/στρέμμα): 125-250. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδος: 3.
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά): Εφαρμογές με δόση 250 γρ/ 100 λίτρα ψ.υ. εναντίον α)
Φουζικλαδίου και Σεπτορίωσης το φθινόπωρο πριν την πτώση των φύλλων και στα
στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη
των ασθενειών. β) Βακτηρίωσης στις περιοχές που υπάρχει χρόνιο πρόβλημα
προσβολών από τα βακτήρια, συνιστώνται δύο εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της
πτώσης των φύλλων. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 100-200. Μέγιστος
αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδος: 3. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Βερικοκιά, Κερασιά,
Ροδακινιά, Δαμασκηνιά): εναντίον εξώασκου και κορύννευ. Εφαρμογές με δόση 170
γρ/ 100 λίτρα ψ.υ. στις περιοχές όπου ενδημούν οι ασθένειες, ψεκασμοί α) το
φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των
οφθαλμών. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 100-120. Μέγιστος αριθμός
εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδος: 4. **ΑΜΠΕΛΙ** (επιτραπέζια και οινολογία
σταφύλια): εναντίον περονόσπορου. Εφαρμογές με δόση 260 γρ/ 100 λίτρα ψ.υ. όταν
ο βλαστός έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και
λίγο μετά τη γονιμοποίηση. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 50-150.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδος: 3. **ΕΛΙΑ:** εναντίον κυκλοκονίου
δύο εφαρμογές με δόση 260γρ/ 100 λίτρα ψ.υ.: Η πρώτη εφαρμογή το φθινόπωρο λίγο
πριν την έναρξη των βροχών και η δεύτερη την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν
μήκος 2 εκ. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 150-300. Μέγιστος αριθμός
εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδος: 2. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ** (Καρότο, κρεμμύδι, πιπεριά, πράσο,
κουνουπίδι, λάχανο, μαρούλι, σέλινο, φασόλι, μπίζελη): εναντίον α) περονόσπορου,
εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σπορόφυτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες.
και β) κλαδοσπορίωσης εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της
ασθένειας και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
Δόση 240 γρ/ 100 λίτρα ψ.υ. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 50-100.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδος: 3. **Τομάτα (υπαίθρου &
θερμοκηπίου):** εναντίον περονόσπορου. Δόση 250 γρ/ 100 λίτρα ψ.υ. Προληπτικές
εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Όγκος
ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 50-100. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/
καλλιεργητική περίοδος: 2. **ΠΑΤΑΤΑ:** εναντίον περονόσπορου. Εφαρμογές με δόση 240
γρ/ 100 λίτρα ψ.υ. όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επανάληψη σε 7-10 ημέρες
ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 50-
100. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδος: 2.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού
μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη δόση του
σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο
αναδεύοντας συνέχεια. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: -Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την
άνθηση, ιδιαίτερα για τα μηλοειδή. Οι μεγαλύτερες δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς
που γίνονται όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των
ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το εύρος της
δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής.

-Στα λαχανικά να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις
θερμές ώρες της ημέρας. - Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι
καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. - Στις καλλιέργειες αμπέλι,
εσπεριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να
ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών
προειδοποιήσεων.

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΝΤΑ
ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ