

ΧΕΛΓΚΑΡ 25WG

Fenoxycarb 25% (φenoξυκάρμπ)

Εγγυημένη Σύνθεση: fenoxycarb 25% β/β

Βοηθητικές ουσίες 74,23% β/β

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Αρ. Εγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α&Τ:
14216/12-03-08

Καρβαμιδικό εντομοκτόνο. Ρυθμιστής αυξήσεως των εντόμων που δρα δι' επαφής και από στομάχου. Εμποδίζει τη μεταμόρφωση των προνυμφών ή την εκκόλαψη των αυγών (ωοκτόνο και προνυμφοκτόνο Ν δράση). Δεν έχει ακμαιοκτόνο δράση.



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Καθαρό βάρος: 600 γραμ.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ (γραμ / 100 λίτρα ψεκ. υγρού) - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΞΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά) καταπολεμά τον Κηροπλάστη και το Λεκάριο. Ψεκασμός μόλις εμφανιστούν οι κινητές μορφές με δόση 20-40. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα) 150. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά) καταπολεμά α) Φυλλορύκτες (*Phyllonorycter corylifoliella*, *Ph. blancardella*, *Chemiosoma scitella*, *Lyonetia spp.*), εφαρμογή με την έναρξη της εναπόθεσης των αυγών, που συνήθως συμπίπτει με το μέγιστο της πτήσης των ακμαίων με δόση 50. β) Φυλλοδέστες εφαρμογή με την εμφάνιση των προνυμφών του τελευταίου σταδίου με δόση 40. γ) Καρπόκαφα ψεκασμός με την έναρξη των πρώτων εναποθέσεων με δόση 40. δ) Ψύλλα αχλαδιάς, εφαρμογή κατά την άνοιξη μέχρι και τις αρχές του καλοκαιριού που ο πληθυσμός είναι ακόμα χαμηλός και δεν υπάρχει υπέρθεση των γενεών, ιδίως κατά την ένταξη του σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης με δόση 100. ε) Κοκκοειδή (*Quadraspidiotus perniciosus*) εφαρμογή όταν τα 2/3 του πληθυσμού είναι σε κινητά στάδια με δόση 150. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα) 150. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ καταπολεμά α) τους Φυλλοδέστες, ψεκασμός με την εμφάνιση των προνυμφών του τελευταίου σταδίου με δόση 40 και β) τα Κοκκοειδή (*Quadraspidiotus perniciosus*, *Pseudalacaspis pentagona*) εφαρμογή όταν τα 2/3 του πληθυσμού είναι σε κινητά στάδια με δόση 150. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα) 150. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών.

ΑΜΠΕΛΙ καταπολεμά την Ευδεμίδα και την Κογκυλίδα, εφαρμογή με την έναρξη των πρώτων εναποθέσεων των αυγών με δόση 20-40. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα) 150. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών.

ΕΛΙΑ καταπολεμά το Λεκάριο, εφαρμογή όταν το 65% του πληθυσμού είναι σε κινητά στάδια με δόση 40. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα) 150. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

Παρατηρήσεις: Το εύρος των δόσεων (όπου υπάρχει) εξαρτάται από την ένταση της προσβολής. Οι προαναφερόμενες δόσεις σε όλες τις καλλιεργείες αφορούν σε ποσότητα 150 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα. Εάν ανά στρέμμα η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού είναι μεγαλύτερη τότε πρέπει να ρυθμιστούν ανάλογα οι δόσεις ανά 100 λίτρο.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά τα 3/4 με νερό. - Ρίχνουμε, χωρίς προδιάλυση, την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. - Αναδεύουμε καλά και συμπληρώνουμε μέχρι επάνω με νερό.

Φυτοτοξικότητα: Υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας σε καρπούς και φύλλα μερικών ποικιλιών αχλαδιάς. Πριν από ευρεία χρήση σε συγκεκριμένη ποικιλία κάντε δοκιμαστική εφαρμογή και μην υπερβαίνετε τις δόσεις.

Συνδυαστικότητα: Ειδικά όταν χρησιμοποιείται στην αχλαδιά να μην αναμινύεται με ορυκτέλαια.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ:

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. - Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

" Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης."

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο και προστάξτε τον από την υποθερμία. - Σε περίπτωση υποθερμίας καλέστε αμέσως γιατρό. - Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. - Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε γιατρό. - Σε περίπτωση κατάποσης και εφ' όσον ο παθών έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε σε επανάληψη ενεργό άνθρακα με μεγάλη ποσότητα νερού. Μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομα που δεν έχουν τις αισθήσεις τους. Μην προκαλέσετε εμετό. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210.77.93.777

Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτία δεδομένων ασφαλείας. Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΙΑΚΤΙΚΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΑ**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι σκούλες και οι σακοί ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) καταστρέφονται με τρύπημα ή σκίσιμο αντίστοιχα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης και εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
-Εσπεριδοειδή: 45 ημέρες. -Μηλιά, ροδακινιά, αμύγδα: 20 ημέρες. -Αχλαδιά: 30 ημέρες-Ελιά: 60 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική και κλειστή συσκευασία του σε καλά αεριζόμενο, ξηρό και δροσερό χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δυο(2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΗΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας

Κάτοχος Έγκρισης-
Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. Φλέμιγγ 15,
151 23 Μαρούσι, Αθήνα



ΑΘΗΝΑ: Φλέμιγγ 15, Μαρούσι 151 23, Τηλ.: 210.68.00.900
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ, 57022 Σίνδος, Τηλ.: 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9
e-mail: info@hellafarm.gr