

ΧΕΛΛΑΒΟΡ

20WP

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: - Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.-Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. - Μην αναπνέετε τη σκόνη ή το ψεκαστικό υγρό. - Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. - Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. - Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.-Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). - Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση κατάποσης: χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.

Αντίδοτο: Πενικιλλαμίνη.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 77 93 777

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον.

Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Κρατήστε τα παραγωγικά ζωα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σασκούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΗΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε σφραγίδα

Bordeaux mixture (Cu 20%)

Μεταλλικός χαλκός 20% σε μορφή βορδιγάλειου πολτού

Εγ.σύνθεση:Μεταλλικός χαλκός 20%β/β σε μορφή βορδιγάλειου πολτού
Βοηθ.ουσίες 21,57% β/β

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Αριθ. Έγκρ. Κυκλοφορίας:
6704/23.9.98

Ανόργανο μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση

Xi



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς
επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

**Καθ. Βάρος:
5 ΚΙΛΑ**

Κάτοχος της έγκρισης:
MAT INVESTMENT HOLDING S.L., Ισπανία.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε., Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα.

Παρασκευαστής - Εργοστάσιο παρασκευής-
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-
Εργοστάσιο συσκευασίας:
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A., Ισπανία

Αποκλειστικός Διανομέας



ΑΘΗΝΑ: Φλέμινγκ 15, Μαρσίου 151 23 Τηλ.: 210 68.00.900
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ. 57022 Σινδός, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9
e-mail: info@xellafarm.gr

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΔΟΣΕΙΣ (γραμ./100 λίτρα νερό): **Εσπεριδοειδή** (Πορτοκαλιά, μανταρινιά, λεμονιά): Κορυφοξήρα. Δόση 400. Προληπτικές εφαρμογές φθινοπώρου εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Προσβολή κλαδίσκων, φύλλων και καρπών (*Pseudomonas syringae*). Δόση 400. Εφαρμογή μετά από χαλάζι ή παγετό. **Αμυγδαλιά:** Κορύνεο. Δόση 400. Μια εφαρμογή το φθινόπωρο όταν έχει πέσει το 75% των φύλλων και μια το χειμώνα λίγο πριν την έκπτυξη των ξυλοφόρων οφθαλμών. Με την έναρξη της βλάστησης γίνονται άλλες 1-2 εφαρμογές εφ' όσον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. **Καρυδιά:** Ανθράκωση. Δόση 400. Συνιστώνται 3-4 εφαρμογές που αρχίζουν πριν βγουν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες. Να αποφεύγονται οι εφαρμογές στην άνθηση. **Μηλιά:** Φουζικλάδιο. Δόση 550-625. Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων συνιστώνται εφαρμογές στα στάδια της πράσινης, ρόδινης κορυφής και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **Πυρηνόκαρπα** (βερικοκιά, κερασιά, ροδακινιά, δαμασκηλιά): Εξώσκος, κορύνεο, φαιά σήψη. Δόση 425. Προληπτικές εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πριν φουσκώσουν τα μύτια. **Αμπέλι:** Περονόσπορος, ανθράκωση. Δόση 550-650. Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων προληπτικές εφαρμογές που αρχίζουν την άνοιξη όταν υπάρχουν οι κατάλληλες για την προσβολή συνθήκες και συνεχίζονται ανάλογα με την εξέλιξη των τοπικών συνθηκών. **Ελιά:** Κυκλοκόνιο. Δόση 600-650. Δύο εφαρμογές. Η πρώτη εφαρμογή το φθινόπωρο λίγο πριν την έναρξη των βροχών και η δεύτερη την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ. Γλοιοσπόριο. Δόση 600-650. Δύο εφαρμογές. Η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. Καρκίνωση (*Pseudomonas savastanoi*). Δόση 600-650. Εφαρμογές μετά το κλάδεμα και μετά από χαλάζι ή παγετό. **Τομάτα:** Περονόσπορος. Δόση 550-625. Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Βακτηριακή κηλίδωση. Δόση 550-625. Εφαρμογές με την εκδήλωση της ασθένειας και εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωσή της. **Λαχανικά** (κρεμμύδια, πιπεριά, κολοκύθι, πεπόνι, καρπούζι, κουνουπίδι, λάχανο, σπανάκι, σέλινο, φασόλι): Περονόσπορος, Σπυρίωση. Δόση 350. Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες. Ανθράκωση. Δόση 350. Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά. Βακτηριώσεις. Δόση 350 Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σποροφύτων και σταματούν στην καρπώδηση. **Πατάτα:** Περονόσπορος. Δόση 550-612,5. Εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας οι εφαρμογές ξεκινούν όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επαναλαμβάνονται ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **Ζαχαρότευτλα:** Κερκασπορίωση. Δόση 550-650. Εφαρμογές που αρχίζουν με την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας. **Καλλωπιστικά:** Περονόσπορος, Σπυρίωση. Δόση 550-650. Εφαρμογές που αρχίζουν με την εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων. Φυτοσθένεια. Δόση 550-650. Εφαρμογή στα νεαρά φυτά στο σπορείο ή μετά τη μεταφύτευση.

Μείγματος οριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Εσπεριδοειδή 4, Αμυγδαλιά 4, Καρυδιά 4, Μηλιά 2, Πυρηνόκαρπα 2, Αμπέλι 4, Ελιά 2, Τομάτα 6, Λαχανικά 4, Πατάτα 6, Ζαχαρότευτλα 4, Καλλωπιστικά 6.

Παρατηρήσεις: Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση, ιδιαίτερα για την μηλιά και οι μεγάλες δόσεις όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις καλλιέργειες αμπέλι, εσπεριδοειδή, μηλιά, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

Τρόπος εφαρμογής: ψεκασμός φυλλώματος
Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά και αφού το περάσουμε από φίλη σitta. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας καλά (με επιστροφή 10-20 λίτρα νερό το λεπτό).

Όγκος Ψεκαστικού Υγρού (λίτρα/στρ): Εσπεριδοειδή 200-250, Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά): 100-150, Μηλιά 100-200, Πυρηνόκαρπα 100-120, Αμπέλι 50-100, Ελιά: 150-300, Λαχανικά 50-80, Τομάτα 50-100, Πατάτα 50-100, Ζαχαρότευτλα 40, Καλλωπιστικά 50-100.
Φυτοτοξικότητα: Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, κερασιά και δαμασκηλιά αφού φουσκώσουν τα μύτια. Επίσης μπορεί να παρουσιάσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή κάτω από ορισμένες συνθήκες (υψηλή υγρασία). Φυτοτοξικότητα παρουσιάζει επίσης σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς. Στη μηλιά να χρησιμοποιείται πριν την άνθηση. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με οργανοφωσφορικά και καρβαμικά εντομοκτόνα καθώς και με maneb, mancozeb, folpet, captan, thiram. Επίσης δεν συνδυάζεται με ελαιοίχνα σκευάσματα όταν ο ψεκασμός γίνεται εκτός της εποχής του λήθαργου των δέντρων.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Εσπεριδοειδή: 21 ημέρες, Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά): 28 ημέρες, Μηλιά, Πυρηνόκαρπα: Μη Εφαρμόσιμο (Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της Καλλιέργειας κατά την εφαρμογή), Αμπέλι (για επιτραπέζια και ονοποποίηση σταφύλια): 21 ημέρες, Ελιά: 21 ημέρες, Λαχανικά (Υ+Θ): 7 ημέρες, Τομάτα Υπαίθρου: 10 ημέρες, Τομάτα Θερμοκηπίου: 7 ημέρες, Πατάτα, Ζαχαρότευτλα: 21 ημέρες