

# ΧΕΛΛΑΣΥΜ 505WP

**Mancozeb (Μανκοζέμπ) 46,5% + Cymoxanil (Σιμοξανίλ) 4%**

**Εγγ. Σύνθεση:** Mancozeb 46,5% β/β + Cymoxanil 4% β/β  
Βοηθ. Ουσίες 41,1 % β/β

**ΑΔΑΑ:** 60410/6-03-2014

**Μείγμα δύο μυκητοκτόνων, ενός τοπικά διασυστηματικού (cymoxanil) και ενός επαφής (mancozeb) με προληπτική και θεραπευτική δράση.**

**ΦΥΛΛΑΣΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ - ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Κάτοχος της έγκρισης:  
**Indofil Industries Limited**  
Via Filippo Turati, 6 20121  
Milan, Ιταλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση  
στην αγορά:

**ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.,**  
Θέση ΝΤΡΑΣΕΖΑ (ΒΙ.ΠΑ), 190 11 ΑΥΛΩΝΑΣ  
ΑΤΤΙΚΗ Τηλ.: 22950 29350

Διανομέας:

Εργαστάσιο συσκευασίας:



ΑΘΗΝΑ: Φλέμιγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210 68 00 907  
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ. 57022 Σίνδος, τηλ. 2310 797 907  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδας Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380 22 008-9  
e-mail: info@hellafarm.gr

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1250 γραμ.**

## ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα):** για τον Περονόσπορο (*Plasmopara viticola*). Προληπτικές εφαρμογές από Απρίλιο-Σεπτέμβριο (BBCH 11-79) με δόση 240 - 300 γρ./ στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 30-60 λίτρα/ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες.

**ΠΑΤΑΤΑ:** για Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*). Προληπτικές εφαρμογές από Απρίλιο-Σεπτέμβριο (BBCH 10-91) με δόση 240 - 300 γρ./ στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 30-50 λίτρα/ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Συνιστάται η ανάδευση να συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** 1. Το ΧΕΛΛΑΣΥΜ δεν πρέπει να εφαρμόζεται αν αναμένεται βροχή ή παγετός ή όταν τα φυτά είναι σοκαρισμένα. Αν βρέξει η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος μπορεί να μειωθεί και συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής. 2. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε στρες λόγω έλλειψης ή περίσσειας νερού, χαμηλών θερμοκρασιών, εντομολογικών προσβολών, τροφωπενιών ή άλλων παραγόντων οι οποίοι μειώνουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας.

**Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

**Προστασία των καταναλωτών: Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα): 28 ημέρες, Πατάτα: 21 ημέρες

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά συσκευασίας (σακούλες μαζί με τα κουτιά και οι σάκοι) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες < 40 °C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ:** -Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. - Αποφεύγετε να αναπνεύετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων. -Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. - Περιέχει mancozeb και cymoxanil. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»  
**Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Να μην χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το παθόντα στον καθαρό αέρα. Καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα στα οποία έπασε σκεύασμα. Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777**

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα **5 μέτρων** για την καλλιέργεια της πατάτας **και 5 μέτρων** + ακροφύσια μείωσης διασποράς 50% για πρώιμες εφαρμογές **και 5 μέτρων** + ακροφύσια μείωσης διασποράς 75% για όψιμες εφαρμογές στο αμπέλι ή αψέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων με συμβατικά ακροφύσια, για το αμπέλι**

Αριθμ. Παρτίδας - Ημερ. Παρασκευής - Ημ. Λήξης: Βλέπε επί τη συσκευασίας



Υποπτο για πρόκληση βλάβης  
στη γονιμότητα ή στο έμβρυο  
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,  
με μακροχρόνιες επιπτώσεις



**ΠΡΟΣΟΧΗ**

03/14