

ΧΕΛΛΑΘΕΙΟΝ^{80WG}

ΘΕΙΟ (SULFUR) 80% β/β

Εγγ. Σύνθεση: Sulfur 80% β/β,
Βοηθ.ουσίες 19,2%β/β

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας
60155/28-01-08

Περιεχόμενο:
1 ΚΙΛΟ

Κάτοχος της έγκρισης-
Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση -
Παρασκευαστής :
UNITED Phosphorus Limited (Un.Pn.Group)
Chadwick House, Birchwood Park
Warrington, Cheshire WA36AE, Ηνωμένο Βασίλειο
Εργοστάσιο παρασκευής:
CEREXAGRI SAS, Γαλλία

Υπεύθυνος επικοινωνίας,
Εργοστάσιο συσκευασίας:



ΑΘΗΝΑ: Φλέμινγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210 68.00.900
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τεχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ. 57022 Σινός, τηλ. 2310 797 807
ΕΠΙΣΤΑΣΙΟ: Στουάδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380 22 008-9
e-mail: info@kellathion.gr



Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

ΦΥΛΑΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ- ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μηλιά, Αχλαδιά: καταπολεμά το Ωίδιο, εφαρμογή με δόση 400 γραμ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού στα στάδια πράσινης και ρόδινης κορυφής και με δόση 200-300 γραμ/ 100 λίτρα ψεκ υγρού στην πτώση των πετάλων και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Επίσης καταπολεμά το φουζικλάδιο, εφαρμογή με δόση 500 γραμ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού στα στάδια πράσινης και ρόδινης κορυφής, στην πτώση των πετάλων και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-200 λίτρα/ στρέμμα.

Ροδακινιά, Βερικοκιά: καταπολεμά το Ωίδιο, εφαρμογή με δόση 300-400 γραμ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού στα στάδια πτώσης πετάλων, απόσπασης του κάλυκα και στάδιο καρπιδίου και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Όγκος ψεκαστικού υγρού 150-250 λίτρα/ στρέμμα.

Αμπέλι: καταπολεμά το Ωίδιο, εφαρμογή με δόση 200-400 γραμ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκατ και με 100-200 γραμ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού κατά την άνθηση, μετά το δέσιμο των ραγών και κάθε 15-20 μέρες μέχρι το στάδιο του «γυαλισματος» των ραγών ανάλογα πάντοτε με την ένταση της προσβολής. Επίσης καταπολεμά την Ερίνωση με δόση 1000 γραμ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού στην έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-150 λίτρα/ στρέμμα.

Τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, αγγούρι, κολοκύθι, πεπόνι, καρπούζι: καταπολεμά το Ωίδιο, εφαρμογή με δόση 200-300 γραμ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής ανά 10-15 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού (Τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά): 50-100 λίτρα/ στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού (Κολοκυνθοειδή): 50-80 λίτρα/ στρέμμα.

Τριανταφυλλιά: καταπολεμά το Ωίδιο, εφαρμογή με δόση 200-300 γραμ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού μόλις οι βλαστοί αποκτήσουν μήκος 10-15 εκατ. και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Όγκος ψεκ.υγρού 50λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο για όλες τις καλλιέργειες: 4

Παρατηρήσεις: 1.Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού. 2.Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. 3.Στις καλλιέργειες μηλιά-αχλαδιά, ροδακινιά, βερικοκιά, αμπέλι, λαχανικά να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων. 4.Το θειάφι έχει μέτρια δράση κατά των ακάρεων.

Ειδικές γεωργικές συνθήκες: Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18 °C. Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20 °C.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ρίχνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με ορυκτέλαια καθώς και με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

Φυτοτοξικότητα: Όταν χρησιμοποιείται μέσα σε 4 εβδομάδες από την εφαρμογή πολλού προκαλεί φυτοτοξικότητα. Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 28 °C) μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στα φυτά. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή και σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς, αχλαδιάς και βερικοκιάς

Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών: Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 7 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι) μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγούμενως με σκίαση, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Συνθήκες αποθήκευσης-Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική κλειστή συσκευασία του , σε χώρο καλά αεριζόμενο, προφυλαγμένο από απευθείας έκθεση στον ήλιο και από υγρασία και μακριά από εστίες φωτιάς, μένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το φάρμακο ή τη συσκευασία του.

Xi



Ερεθίζει το δέρμα

ΕΠΕΞΙΣΤΙΚΟ

Αρ. Παρτίδας - Ημ. Παρασκευής - Ημ.Λήξης: βλέπε επί της συσκευασίας

Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία: ● Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές ● Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε μην καπνίζετε ● Μην αναπνέετε τα εκνεφώματα. ● Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυνείτε αμέσως με άφθονο νερό . ● Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί. ● Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε το αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση κατάποσης πιείτε δύο ποτήρια νερό. Μην δίνετε τίποτα από το στόμα και μην προκαλείτε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777