

MAGNET-MED

Deltamethrin (Δελταμεθρίν) 0.03% (χημική ομάδα: πυρεθρίνες)



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

Xi
Ερεθίζει το δέρμα και το αναπνευστικό σύστημα. Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ετοιμόχρηστο δόλωμα (RB)

ΑΑΔΑ: 14416/13-3-2013

Εγγυημένη σύνθεση:
deltamethrin 0.03% β/β [= 10 mg/panel]
βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% β/β

Το Magnet MED βασίζεται στην τεχνική της προσέλκυσης και θανάτωσης (attract & kill). Αποτελείται από παγίδες (πάνελ) ειδικά διαμορφωμένες έτσι ώστε να αναρτώνται εύκολα στα κλαδιά των δέντρων.

Στις παγίδες περιέχεται ελκυστικό τροφής ενώ η εξωτερική επιφάνειά τους είναι καλυμμένη με τη δραστική ουσία deltamethrin. Τα ακμαία της μύγας της Μεσογείου προσελκύονται από το τροφικό ελκυστικό και όταν έρθουν σε επαφή με την επιφάνεια της παγίδας, θανατώνονται.

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ (ΠΑΓΙΔΕΣ): XXX

Κάτοχος της άδειας: Suterra Europe Biocontrol S.L.,
Gava Business Park,
C/de la Imaginació no 7-9,
08850 Gava, Barcelona – Ισπανία

Suterra®

Υπεύθυνος επικοινωνίας -
Υπεύθυνος για τελική διάθεση
στην αγορά: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ



ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ: Φιλέμυγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ. 57022 Σίνδος, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλida Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9
e-mail: info@hellafarm.gr

Πεδίο εφαρμογής: Εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά, κίτρι, φράπα, γκρέιπ-φρουτ κ.ά υβρίδια), Μηλοειδή (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, μουσμουλιά, Nashi (αχλαδόμηλο)), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, βερικοκιά, νεκταρινιά, κερασιά, βυσσινιά, δαμασκηνιά, κορομηλιά), Αμύγδα (επιτραπέζιο και οиноποιήσιμο), Λωτός, Φραγκοσυκιά

Στόχος: Μύγα της Μεσογείου (Ceratitis capitata)

Δοσολογία: 5-7 τεμάχια (παγίδες/ στρέμμα)

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Η ανάρτηση στα φυτά πρέπει να γίνει νωρίς, κατά προτίμηση με χαμηλό πληθυσμό ενηλίκων του εντόμου, πριν την ωρίμανση των καρπών και σε κάθε περίπτωση πριν το έντομο προσβάλει την καλλιέργεια. Για βέλτιστο προσδιορισμό του χρόνου εφαρμογής, ακολουθήστε τις ενδείξεις παγίδων παρακολούθησης και τις συμβουλές των γεωργικών προειδοποιήσεων όπου υπάρχουν. Το εύρος του αριθμού των παγίδων κυμαίνεται ανάλογα με την ευπάθεια της καλλιέργειας και τον πληθυσμό της Μύγας Μεσογείου.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Παρατηρήσεις: 1) Τοποθετήστε τις παγίδες κατά προτίμηση στο μέρος του φυτού που είναι προσανατολισμένο προς τον νότο και στο μεγαλύτερο ύψος που μπορείτε από το έδαφος, προσέχοντας να επιλέγετε κλαδιά αρκετά γερά τα οποία δεν θα κλαδεύονται πριν από το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου. 2) Μην χρησιμοποιείτε παγίδες αν προέρχονται από συσκευασίες κατεστραμμένες, τρύπιες ή ανοικτές. 3) Η συγκεκριμένη μέθοδος προσέλκυσης-θανάτωσης δίνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όταν η εφαρμογή γίνεται σε συγκεντρωμένους οπωρώνες/αμπελώνες με εκτεταμένη επιφάνεια και ομαλό σχήμα. 4) Σε περίπτωση γειτνίασης του οπωρώνα/αμπελώνα με άλλους στους οποίους δεν εφαρμόζεται η συγκεκριμένη μέθοδος ή σε περίπτωση γειτνίασης με αυτοφυή βλάστηση που προσβάλλεται από τη Μύγα Μεσογείου, συνιστάται η ενίσχυση των ορίων με συμπληρωματικό αριθμό παγίδων. 5) Μία εφαρμογή αρκεί για την καταπολέμηση του εντόμου για ολόκληρη την περίοδο.

Τρόπος εφαρμογής: Αναρτήστε τις παγίδες στα κλαδιά μέσω του ειδικού γάντζου. Βεβαιωθείτε ότι η κάθε παγίδα έχει στερεωθεί καλά στο κλαδί.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Μην αναρτάτε τις παγίδες κοντά ή πάνω από την περιοχή ανάπτυξης των καρπών για να μην έρχονται σε άμεση επαφή με αυτούς.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μην εφαρμόζετε

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι παγίδες μετά τη χρήση τους και τα υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και θερμοκρασία όχι πάνω από 40°C.

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: -Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.

-Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου -Το άνοιγμα της συσκευασίας να γίνεται σε αεριζόμενο χώρο - Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλα γάντια όταν κατά την περίοδο που πραγματοποιούν εργασίες στα φυτά, υπάρχουν αναρτημένες οι παγίδες.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το φυτοπροστατευτικό προϊόν ή την ετικέτα. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ - ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΗΜ. ΛΗΞΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας