

Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Μην αναπνέετε εκκενρώματα. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός (ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή ή την επείγουσα βοήθεια του τοπικού δημόσιου φαρμακείου). «Για να αποφύγετε καπνούς για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα».

Πρώτες Βοήθειες-Αντίδοτο: Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον ασθενή σε καθαρό αέρα. Κάντε τεχνητή αναπνοή σε περίπτωση που δεν αναπνέει. Καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης (ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Μην προκαλέσετε εμετό. Πιάνει να χρειαστεί πολλή στομάχι. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες/δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν προηγούμενες για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 400 Κ.Ε.

MYCLOFIL 12.5 EC

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΥΓΡΟ (EC)

Myclobutanil (Μικλομπουτανίλ) 12.5%

Εγγυημένη σύνθεση: Myclobutanil 12,5% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 86,06% β/β

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΕΥΦΛΕΚΤΟ. ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΕΩΣ. ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ. ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ.

Αρ. Εγκρίσης Κυκλοφορίας: 60.143/23-01-08

Κάτοχος της έγκρισης – Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Ιταλία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας - Διανομέας:



ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ), Τ.Κ. 190 11
Αυλώνας Αττικής, Τηλ.: 22950 29350, Φαξ: 22950 29305

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΙΘΗΝΕΙΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ (ανά 100 λίτρα ψεκ. υγρού)

-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΜΗΛΙΑ: Δόση 30-40 κ.εκ. Για Δίοδο και

Φουγκιάδιο εφαρμογή στα στάδια πράσινης, ρόδινης κορυφής

πώσης πετάλων και 10-15 ημέρες αργότερα (καρπίδιο). Όγκος

ψεκαστικού υγρού: 100-200 λίτρα/στρ. ΑΧΛΑΔΙΑ, ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ:

Δόση 30-40 κ.εκ. Για Φουγκιάδιο εφαρμογή στα στάδια πράσινης

κορυφής, λευκής κορυφής, πώσης πετάλων και 15-20 ημέρες αργότερα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-200 λίτρα/στρ. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

(ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΙΝΙΑ): Δόση 30-40

κ.εκ. Για Δίοδο η πρώτη εφαρμογή γίνεται στην πώση των πετάλων, η

δύτερη στην απόσπαση του κάλυκα και η τρίτη 20 ημέρες αργότερα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150-250 λίτρα/στρ. ΑΜΠΕΛΙ: Δόση 15-25

κ.εκ. Για Δίοδο βασική εφαρμογή την άνοιξη όταν έχουν εκπτυχθεί 2-3

φύλλα και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις

καιρικές συνθήκες. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-150 λίτρα/στρ.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (ΑΙΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΚΑΡΠΟΥΣΙ, ΠΕΠΟΝΙ):

Δόση 40-50 κ.εκ. Για Δίοδο εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων

συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει

πρόβλημα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ: Δόση 40-50 κ.εκ. Για Δίοδο και Μελανή κηλίδαση

εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη

ανά 7-14 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.

ΓΑΡΦΑΛΙΑ: Δόση 40-50 κ.εκ. Για Εκμύρση εφαρμογή με την εμφάνιση

των πρώτων συμπτωμάτων. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100

λίτρα/στρ.

Παρατηρήσεις: Η μικρή δόση συνιστάται για προληπτικές και η μεγάλη για θεραπευτικές εφαρμογές. Στις καλλιέργειες μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι και κολοκυνθοειδή υπό κάλυψη να ακολουθούνται στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων. **Μείγνωση αριθμής εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο:** Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσουλιιά): 4, Πυρηνόκαρπα (Βερίκοκιά, Ροδάκινια, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά), Αμπέλι: 3, Κολοκυνθοειδή (Αγγούρι, Κολοκύθι, Καρπούζι, Πεπόνι), Τριανταφυλλιά, Γαρφαλιά: 5.

Τρόπος εφαρμογών: Ψεκασμοί καλύμμε.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Εμείξτε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε στη συνέχεια με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσουλιιά), Πυρηνόκαρπα (Βερίκοκιά, Ροδάκινια, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά), Αμπέλι: 21 ημέρες, Κολοκυνθοειδή (Αγγούρι, Κολοκύθι, Καρπούζι, Πεπόνι): 7 ημέρες.