

Προφυλάξεις:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. • Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια. • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Ζητείστε την συμβουλή του γιατρού. **Σε επαφή με το δέρμα:** Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε. **Σε επαφή με τα μάτια:** Πλύντε τα αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Εάν εμφανισθεί ερεθισμός ζητήστε την συμβουλή οφθαλμιάτρου. **ΓΙΑΤΡΟΙ:** Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα :

• Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. • Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. • Μην σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν δέκα μήνες από την εφαρμογή του και πριν καλλιεργήσετε καλά το έδαφος μετά την εφαρμογή του. • Αποφεύγετε τη χρήση του σε οργανικά εδάφη. • Μη ρυπαίνετε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. • Αν ρυπανθούν τα νερά αρδεύσεως να μη χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση. • Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. • Μή διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. • Μην αυξάνετε τις δόσεις. • Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI). • Χρησιμοποιείτε μπέκ τύπου σκούπας. • Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται. • Μετά τον ψεκασμό ξεπλύντε καλά τα ψεκαστικά μέσα με πετρέλαιο και μετά με νερό και απορροπαντικό.

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε τη διάθεση του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

KEYFEN 48 SC

Ζιζανιοκτόνο

Συμπυκνωμένο εναιώρημα

Εγγυημένη σύνθεση: oxyfluorfen 48% (οξυφλουορφέν 48%) β/ο
βοηθητικές ουσίες: 57,71% β/β.

Αρ. Εγκ. Κυκλοφορίας: 7834/10.09.2007

Ζιζανιοκτόνο ετήσιων και πολυετών πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΜΕ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥΣ

Κάτοχος της έγκρισης-Παρασκευαστής του σκευάσματος- Εργοστάσιο Παρασκευής & συσκευασίας του σκευάσματος: **INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A.** Ισπανία.

Υπεύθυνος επικοινωνίας & για την τελική συσκευασία και σήμανση:
ΑΝΟΡΓΑΧΗΜ Α.Ε. Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα.

Διανομή:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

196 00 Μάνδρα Αττικής
Τηλ. 210 5555 220, 210 5559 001-2
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ : Σαλαμίνας 10 τηλ. 2310 541883



Περιεχόμενο:

500 κ. εκ.

ΣΤΟΧΟΙ: Ετήσια και πολυετή πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια (1). **Αγρωστώδη:** Αγριάδα, Αιματόχορτο, Αλεπονούρα, Βέλιουρας από σπόρο, Ήρα, Ελευσίνη, Κύπερη, Μουχρίτσα, Σετάρια. **Πλατύφυλλα:** Αγριοβαμβάκι, Αγριομελίτζανα, Αγριοτονιάτα, Αντράκλα, Βερόνικα, Βλήτο, Δωδεκάνθη, Ζωγός, Λουβουδιά, Μαρτιάκος, Μικρή τσουκνίδα, Οξάλις, Ραπανίδα, Στελλάρια, Τάτουλας, Τριβόλι, Φυσαλίδα.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΟΣΕΙΣ (κεκ./στρέμμα) - ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: **Εσπεριδοειδή** (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρούτ, Κίτρο): 250. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά. **Μηλοειδή** (Μηλιά, Αχλαδιά): 250. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά. **Πυρηνόκαρπα** (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Νεκταρινιά, Κορομηλιά, Κερασιά, Βυσσινιά): 250. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά. **Αμπέλι** (2) (Σταφίδες, Οινόποιήσιμα, Επιτραπέζια): 250. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά. **Ελιά:** 250. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά. **Μελιτζάνα:** 125-150. Εφαρμόζεται πριν τη μεταφύτευση και ακολουθεί κατάκλιση. **Κρεμμύδι** (4): 75. Α) Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά ως προς την καλλιέργεια στο στάδιο των 3-4 φύλλων στο κρεμμύδι από σπόρο. Β) Εντός δύο ημερών από τη φύτευση στο κρεμμύδι από κοκκάρι. **Κουνουπίδι, Λάχανο:** 125-150. Εφαρμόζεται πριν τη μεταφύτευση και ακολουθεί κατάκλιση. **Αγγινάρα:** 150. Εφαρμόζεται προ της βλάστησης του ξηροφύτου. **Ηλιανθος** (3): 50. Εφαρμόζεται μετά τη σπορά και πριν το φύτευμα της καλλιέργειας. **Βαμβάκι:** 50-150. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά.

Καπνός: Εφαρμογή με ομοιόμορφο ψεκασμό σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, σε έδαφος ψιλοχωματισμένο και απαλλαγμένο από τα ζιζάνια. Α) Ανατολικά καπνά με Virginia 100-150, Καπνά Burley 150-200. Εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση, ψεκασμός σε γυμνό έδαφος. Β) Ανατολικά καπνά 50, Καπνά Burley 100-150. Εφαρμογή κατά το παράχωμα ή "γέμισμα", με κατευθυνόμενο ψεκασμό του εδάφους μεταξύ των γραμμών. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται υπό συνεχή ανόδευση, με μπέκ τύπου σκούπας και με πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 atm.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): Για όλες τις καλλιέργειες (πλήν του καπνού): 60, καπνός: 20-40.

Παρατηρήσεις:

1) Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το στάδιο του σπόρου μέχρι τα 2-4 φύλλα. Τα ζιζάνια *Calendula arvensis* (Καλέντουλα) και *Rumex* spp (Λάπαθα) είναι ανθεκτικά στο KEYFEN 48 SC. 2) Το αμπέλι πρέπει να είναι ηλικίας πάνω από 3 χρόνια και να είναι υποστηλώμενο ή αναρριχώμενο, γιατί αν είναι σε πολύ μικρή απόσταση από το έδαφος υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας. 3) Στον ηλιανθο δόση μεγαλύτερη από 60 κ.εκ./στρέμμα, δρά φυτοτοξικά. 4) Στο κρεμμύδι: να χρησιμοποιείται μόνο στο κρεμμύδι που προορίζεται για παραγωγή ξηρών βολβών. Να μην εφαρμόζεται με κρύο και υγρό καιρό. 5) Η εφαρμογή του να γίνεται σε ποτισμένο έδαφος. 6) Να μη γίνεται δεύτερη εφαρμογή τον ίδιο χρόνο. 7) Για τις κράμβες και τη μελιτζάνα η μεγάλη δόση εφαρμόζεται όταν ο πληθυσμός των ζιζανίων είναι μεγάλος και τα ζιζάνια βρίσκονται σε μεσαίο ή μέγιστο στάδιο ανάπτυξης.

Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους με μπέκ τύπου σκούπας και πίεση μικρότερη από δύο (2) atm.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Ανακινείστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση του. Γεμίστε το ψεκαστικό κατά 3/4 με νερό και προσθέστε τη δόση που χρειάζεται. Ξεπλύντε πολλές φορές τα κενά δοχεία και ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανόδευση.

Φυτοτοξικότητα: Στις καλλιέργειες που δεν συνιστάται μπορεί να προκαλέσουν φυτοτοξικότητα ακόμα και τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού. Στον ηλιανθο προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν γίνει υπέρβαση της δόσης. Στο κρεμμύδι συνήθως παρατηρείται η νέκρωση των άκρων των φύλλων, που όμως δεν έχει επιπτώσεις στην παραγωγή, γιατί είναι παροδική. Η φυτοτοξικότητα αυτή είναι πιο έντονη όταν ο καιρός είναι κρύος και υγρός.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Κρεμμύδι, Καπνός: 60 μέρες. Λοιπές καλλιέργειες: 21 μέρες.

Ημ. Παρασκευής:

Αρ. Παρτίδας:

Αναγράφονται στο άνω μέρος της φιάλης

17/01/2008

01080117

