

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. **Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:** • Σε περίπτωση εισπνοής μετακινήστε τον ασθενή σε καθαρό περιβάλλον και ζητείστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση κατάποσης μη προκαλείτε εμετό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Αντίδοτο:** Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα, εάν ο ασθενής έχει χάσει τις αισθήσεις του.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του αραβόσιτου. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες και μεταφέρεται σε όλο το φυτό.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού υγρού μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και απογεμίζουμε το δοχείο. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται 3 φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με λάδι και υγρά λιπάσματα.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. Οι καλλιέργειες των δικτυληδονών φυτών είναι ευαίσθητες, γιαυτό πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του ψεκαστικού υγρού με βαμβάκι, σόγια, μηδική, κλπ καθώς και με αμπέλια, οπωροφόρα και καλλωπιστικά.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Για τον αραβόσιτο 40 ημέρες εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ζωοτροφή (χλωρά νομή και ενσίρωση).

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Χρονική σταθερότητα – Συνθήκες αποθήκευσης: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον εάν διατηρηθεί σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σε δροσερό και ξηρό μέρος. Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης 40°C.

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
Η Μ. ΛΗΞΗΣ: Βλέπε άνω μέρος φιάλης
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:



BERTOLE
48 SL

DICAMBA (ΝΤΙΚΑΜΠΑ) 48%
Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση: DICAMBA 48 % β/ο σε μορφή αλάτος διμεθυλαμίνης
Βοηθητικές ουσίες: 52,55% β/β
Αρ. εγκρ. Κυκλοφορίας: 7787/ 21-7-2006

**ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ.
ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΥΤΟ**

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Περιεχόμενο: 600 κ.εκ.

Παρασκευαστής: SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Ελβετία
Εργοστάσιο παρασκευής: ISTROCHEM A.S. BRATISLAVA, Σλοβακία
Κάτοχος της έγκρισης – Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση - Εργοστάσιο Συσκευασίας:



ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΒΕΕ

Θέση Στρατηγικό, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ: 210 55 55 220, 55 59 001-2
Φαξ/νέτα: 55 011, Γ. ΦΑΣΤΗ ΕΠΙΕ.Θ. - Σίνδος,
τηλ: 2310 79 58 84, Fax: 2310 79 67 41



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ		ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		κ.εκ/στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα		
Αραβόσιτος	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια. Περιορίζει την ανάπτυξη των πολυετών πλατύφυλλων ζιζανίων	60	30-60	Καθολικός ψεκασμός του εδάφους μεταφυτρωτικά και πριν τα φυτά του αραβόσιτου ξεπεράσουν το στάδιο των 6 φύλλων.	1

Τρόπος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικά με ψεκαστήρα υψηλού όγκου μπεκ τύπου σκουπας και πίεση μικρότερη από 3 Atm και ποσότητα ψεκαστικού υγρού 30-60 λίτρα το στρέμμα.

Παρατηρήσεις: Ευαίσθητα ζιζάνια: Τραχύ βλήτο, Λουβουδιά, Αγριοτοματιά, Αντράκλα, Τάτουλας, Αγριοβαμβακιά, Αγριομελιτζάνα. Περιορίζει την ανάπτυξη των πολυετών πλατυφύλλων: Περιπλοκάδα, Κίρσιο, Λάπαθο. Τα αποτελέσματα στα πολυετή ζιζάνια είναι καλύτερα όταν αυτά έχουν αναπτύξει αρκετό φύλλωμα κατά την εφαρμογή. Κηλίδες των ζιζανίων αυτών μπορούν να καταπολεμηθούν με κατευθυνόμενο ψεκασμό (χωρίς να βρέχονται τα φυτά του αραβόσιτου) αφού τα φυτά του αραβόσιτου αποκτήσουν ύψος 40 κ.εκ. και πριν βγάλουν “φούντα” και εφόσον δεν υπάρχουν σε μικρή απόσταση ευαίσθητες πλατύφυλλες καλλιέργειες.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπο τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Ειδικές προφυλάξεις για ζιζανιοκτόνα: Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. • Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. • Μην το χρησιμοποιείτε σε εδάφη με υδροφόρο ορίζοντα μικρότερο των 10 μέτρων. • Μην ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. • Σε περίπτωση ρύπανσης των νερών άρδευσης να μην χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση. • Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. • Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. • Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 atm. • Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας. Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται. • Μετά τον ψεκασμό πλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με απορρυπαντικό και ξεπλύνετε με πολύ νερό.

278 x 115 mm