

BUCKET

Nicosulfuron (Νικοσουλφουρόν) 4% **4 SC**

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC).

Αρ. Εγκρ. Κυκλοφορίας : 7847/28.01.2008

Εγγυημένη σύνθεση : nicosulfuron 4% β/ο, βοηθητικές ουσίες : 95,17% β/β

Διασυστηματικό, και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες αραβοσίτου.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Κάτοχος της Έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση - Παρασκευαστής: CHEMINOVAA/S, Δανία
Εργοστάσιο παρασκευής : PRESMAR, S.L, ΙΣΠΑΝΙΑ..



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ :

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ. 210 5555 220, 210 5559 001-2
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ' Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ.-Σίνδος
Τηλ. 2310 795 884, Fax: 2310 796 741

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ :
5 ΛΙΤΡΑ**



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος. • Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποθεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων. • Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/πρωτογενή για ανάκτηση/ανακύκλωση.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ : • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό και σαπούνι. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, για αρκετά λεπτά και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. • Σε περίπτωση κατάποσης τοποθετείστε τον ασθενή σε καλά αεριζόμενο χώρο και προστατεύστε τον από υποθερμία. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Σε περίπτωση υποψίας για δηλητηρίαση, καλέστε αμέσως γιατρό. • Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα, κρατήστε τον ξαπλωτό και σε ανάπαυση. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ : Δεν υπάρχει αντιδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 7793777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού : Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστήρα : Ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα. Αν δεν γίνει αυτό ενδέχεται να προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό μέσο. Συνιστάται η χρήση αμμωνιακού διαλύματος 3% (1 λίτρο ανά εκατόλιτρο) μέχρις ότου απομακρυνθούν όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Τα στάδια καθαρισμού τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής : Αδειάστε τελείως το βυτίο. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντίλη, ψεκαστικό αυλό) και αδειάστε το ξανά. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό στο οποίο προσθέστε μισό λίτρο αμμωνίας οικιακής χρήσης 3% ανά 100 λίτρο. Κυκλοφορήστε το διάλυμα αυτό μέσω όλου του συστήματος "ψεκάζοντας" υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να αδειάσει. Επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία (προσθέτοντας πάλι αμμωνία) άλλη μία φορά και ακόμη μία φορά χωρίς αμμωνία. Χρησιμοποιήστε το ίδιο διάλυμα για το ξέπλυμα δύο φορές των φίλτρων και των μεκ τα οποία στο τέλος ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας : Αποσύρση /καταστροφή του BUCKET 4 SC πρέπει να γίνεται σε υψόμετρο που έχει κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα, να τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανακίνηση ενέργειας.

Κατηγορία και τρόπος δράσης : Διασυστηματικό, και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες αραβοσίτου.

Τρόπος εφαρμογής : Καθολικός με μεταφυτρωτικό ψεκασμός φυλλώματος και με πίεση μικρότερη από 2,5 Atm (40 psi) με τη συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, με μπεκ τύπου σκούλας.

Φάσμα Δράσης - Πεδίο εφαρμογής - Στόχοι - Δόσεις (σε κ.εκ./στρέμμα) - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής :
Αραβοσίτος : **Αγρωστώδη ζιζάνια :** Μουχρίτσες : 100 κ.εκ./στρ. όταν αυτή είναι στο στάδιο των 3-4 φύλλων. 100-150 κ.εκ./στρ. στο στάδιο των 1-2 αδελφών. **Στάριες :** 100 κ.εκ./στρ. όταν αυτές είναι στο στάδιο των 2-4 φύλλων. **Βέλιουρας (α. από σπόρο, β. από ρίζωμα) :** 100 κ.εκ./στρ. όταν αυτός είναι στο στάδιο μέχρι 8 φύλλα και 125-150 κ.εκ./στρ. όταν αυτός είναι 10-20 εκ. ύψος. **Πλατύφυλλα ζιζάνια :** **Βλήτα :** 100 κ.εκ./στρ. όταν αυτά βρίσκονται στο στάδιο των 2-4 φύλλων. **Τάτουλας :** 100-150 κ.εκ./στρ. όταν αυτός βρίσκεται στο στάδιο των 2-4 φύλλων.

Μενίσκος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο : 1
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 1. Όταν έχουμε σταδιακή εμφάνιση των ζιζανίων στο χρόνο, συνιστάται 2 εφαρμογές σε μεσοδιάστημα 1-2 εβδομάδων, ως εξής : 1η εφαρμογή με δόση 100 κ.εκ./στρέμμα και 2η εφαρμογή με δόση 50 κ.εκ./στρέμμα.

Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. Να αποφευχθεί η χρήση ολόκληρου του φυτού στο αραβοσίτου ως ζωοτροφή, πριν την ωρίμανσή του. Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. Μην ψεκάτε όταν φυσάει και αντίθετα με την φορά του ανέμου. Μην διπλοψεκάτε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή : Αραβοσίτος -- **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και :** α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας : Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το BUCKET 4 SC, στον ίδιο αγρό, την ίδια περίοδο, μπορεί να ξανασπαρεί μόνο αραβοσίτος.

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν : Για σπορά χειμερινού σιταριού πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες και οποιαδήποτε άλλης καλλιέργειας τουλάχιστον 10 μήνες από την εφαρμογή του BUCKET 4 SC και αφού προηγηθεί βαθιά άροση.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ : Να μη χρησιμοποιείται όταν ο αραβοσίτος βρίσκεται υπό stress υγρασίας και σε θερμοκρασίες πάνω από 25°C και κάτω από 10°C. Κατά την 1η - 2η εβδομάδα μετά την εφαρμογή είναι δυνατόν να παρατηρηθούν χλωρώσεις στα φύλλα του καλαμποκιού. Το φαινόμενο αυτό είναι συνέπεια της χρησιμοποιούμενης δόσεως είναι δε παροδικό. Δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της καλλιέργειας ή τις αποδόσεις. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σε γλυκά καλαμποκί καθώς και σε αραβοσίτο που προορίζεται για σπορά. Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες στις οποίες έγινε χρήση κοκκιδώδους οργανοφωσφορικού εντομοκτόνου κατά τη σπορά. Η εφαρμογή του να απέχει τουλάχιστον μία εβδομάδα από τον ψεκασμό φυλλώματος με οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ : Να μην συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα (να εφαρμόζεται μόνο του).

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ : Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο και σε συνθήκες θερμοκρασίας.

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

23.04.10

23.03.10