

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Καλλιέργειες-Εχθροί-Δόσεις (κ.εκ.σκευάσματος)/100 λίτρα ψεκαστικό υγρό) – Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Αμπέλι: Ευδεμίδα, Κοχυλίδα, Πυραλίδα: 15. Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των προσβολών. **Τομάτα (υπαίθρου):** Αλευρώδεις: 15. Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των προσβολών και μόνο όταν το φυτό είναι μέχρι ύψος 50 εκ. **Πατάτα:** Δορυφόρος: 18,75.Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των προσβολών και μόνο όταν το φυτό είναι μέχρι ύψος 50 εκ. **Ελαιοκράμβη:** Κολεόπτερα: 33,3. Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των προσβολών. **Σιτάρι:** Αρίδες: 30. Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των προσβολών. **Αραβόσπος:** Πυραλίδα: 60. Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των προσβολών.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα ανά στρέμμα): Αμπέλι, Τομάτα υπαίθρου: 100, Πατάτα: 80. Ελαιοκράμβη: 30, Σιτάρι, Αραβόσπος: 50.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Για Αμπέλι, τομάτα υπαίθρου, Πατάτα, Σιτάρι: Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Για Ελαιοκράμβη, Αραβόσπο: 1 εφαρμογή. Μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες για ψεκασμό με άλλο εντομοκτόνο εφόσον απαιτείται.

Παρατήρηση: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος DRIVER 10EC.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: - Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.- Εφαρμογές, μόνο όταν είναι απαραίτητο, με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς και με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για τα ωφέλιμα αρθρόποδα. – Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. – Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με DRIVER 10 EC. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τα πυρεθρινοειδή. – Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περπιτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Η πρόσβαση των ανθρώπων στις περιοχές που έχουν ψεκαστεί με το σκεύασμα είναι δυνατή χωρίς κίνδυνο αφού στεγνώνει το ψεκαστικό διάλυμα.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μαστικών και μυζητικών εντόμων. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευροξόνες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αμπέλι, Τομάτα υπαίθρου: 7. Πατάτα: 14. Ελαιοκράμβη: 48. Σιτάρι: 42. Αραβόσπος: 14.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

Συνδυαστικότητα: – **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγούμενης με τριπλή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα - Συνθήκες αποθήκευσης - Ημερομηνία λήξης: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

DRIVER

10 EC

ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (EC)

Alpha cypermethrin (Άλφα κυπερμεθρίν) 10% β/ο

Εγγ. σύνθεση: Alpha cypermethrin 10% β/ο
Βοηθ. ουσίες 98,61% β/β

Αρ. εγκ. κυκλοφορίας: 14338/20.08.09

ΠΥΡΕΘΡΙΝΟΕΙΔΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ, ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΜΑΖΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΥΖΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης.
- Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.
- Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.
- Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης

ΕΥΦΛΕΚΤΟ

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Παρασκευαστής: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : 400 ml

BASF S.E., Γερμανία

Εργοστάσιο παρασκευής:

BASF Agri-Production S.A.S., Γαλλία

Εργοστάσιο συσκευασίας: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,

Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική

συσκευασία και σήμανση:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Σπυριγγιάς, 19600 Μόνδρα Αττικής

Τηλ. 210 5555220, 210 5559001-2

ΟΕΣ/ΜΗΚΗ 53 0.7, Γ' Φάση Φ.Π.Π. 9-Σίνδος

Τηλ. 2310 795884, Fax: 795741



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: •Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. •Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Να φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. • Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. •Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό". Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την διάθεση του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ –ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενικά, Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν ο ερεθισμός παραμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση κατάποσης: Να ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά να πιείτε άφθονο νερό. Να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Πληροφορίες για το υλικό: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μετά την εφαρμογή, οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες. Πολύ τοξικό σε βομβίνους και σε ωφέλιμα έντομα και ακάρεα.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. **ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αβέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια αμπελιού και 20 μέτρων για τις λοιπές καλλιέργειες. Για να προστατέψετε μη στοχευμένα αρθρόποδα να αφήσετε μιαν αβέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από την μη γεωργική γη για την καλλιέργεια αμπελιού και 5 μέτρων για τις λοιπές καλλιέργειες.

Ημ/νία παρασκευής:

Ημ/νία λήξης:

Αρ. παρτίδας:

Αναγράφονται στο άνω

μέρος της φιάλης.

