

CURENOX 50 WG

CURENOX
50 WG

COPPER OXYCHLORIDE 50%
(ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ) ΒΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Μεταλλικός χαλκός 50% β/β (σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού)
Βοηθητικές ουσίες 10.71% β/β
Αρ. εγκρ. κυκλοφορίας: 60010 / 26-09-05

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.



- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.



- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
- Μπορεί να προκαλέσει μακρο-χρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Κάτοχος έγκρισης κυκλοφορίας: ALINTRA S.A., Ισπανία
Παρασκευαστής του σκευάσματος - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία & σήμανση - Εργοστάσιο παρασκευής:
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES (IQV) S.A., Ισπανία
Υπεύθυνος επικοινωνίας ANORGKAXHM A.E., Μουρούζη 9, 106 74 Αθήνα.



Εργοστάσιο συσκευασίας - ΔΙΑΝΟΜΗ: ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ. 210 5555220, 210 5559001-2
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ' Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ-Σίνδος
Τηλ. 2310 795884, Fax: 796741

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ :
ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ -ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ : (Γκρέιπ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Νερατζιά). Δόση : 190 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Κορυφοξίγρα, Σεπτορίωση : Με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. Φυτόφθορα καρπών : Το δεύτερο 15νήμερο του Οκτωβρίου και επανάληψη μετά από 3-4 μήνες. Συνιστάται να ψεκάζονται τα χαμηλά κλαδιά μέχρι 1,5 μ. από το έδαφος.

Αμυγδαλιά: Δόση: 160 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Κηλιδωση φύλλων: Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και το χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών.

Φουντουκιά: Δόση: 160 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Βακτηριακό έλκος: Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές: α. μόλις αρχίσουν να πέφτουν τα φύλλα και β. όταν πέσει το 75% των φύλλων.

Καρυδιά: Δόση : 160 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ανθράκνωση, Κηλιδωση φύλλων και καρπών : Εφαρμογές που αρχίζουν πριν εκπτυχθούν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες.

Φιστικιά : Δόση : 160 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Σεπτορίωση : α. Στην πρώτη εμφάνιση της βλάστησης, β. όταν ο καρπός αποκτήσει μήκος 1 εκ., γ. Μετά από 20 ημέρες δ. αρχές φθινοπώρου μετά τη συγκομιδή των καρπών.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ : (Μηλιά, Αχλαδιά) : Δόση : 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Φουζικλάδιο, Σεπτορίωση, Φαϊά σήψη : Το φθινόπωρο πριν την πτώση των φύλλων και στα στάδια της πράσινης και ροδίνης κορυφής εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Βακτηρίωση, Βακτηριακό κάψιμο : Στις περιοχές που υπάρχει χρόνιο πρόβλημα προσβολών από τα βακτήρια, συνιστώνται δύο εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ : (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά) : Δόση: 170 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Κορύνεο, Εξώασκος, Κλαδοσπορίωση : Στις περιοχές όπου ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών. Φαϊά σήψη : Εφαρμογές στη διόγκωση των οφθαλμών και στη ροδίνη κορυφή. Βακτηριακό έλκος: Σε περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων.

Λιμνέλι (για επιτραπέζια και οиноποιησιμα σταφύλια) : Δόση : 260 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Περονόσπορος : Εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά την γονιμοποίηση.

Ελιά : Δόση : 260 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Κυκλοκόνιο : Δύο εφαρμογές : Η πρώτη εφαρμογή το φθινόπωρο λίγο πριν την έναρξη των βροχών και η δεύτερη την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ. Γλοιοσπόριο : Δύο εφαρμογές: Η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. Καρκίνωση : Εφαρμογές μετά το κλάδεμα και μετά από χαλάζι ή παγετό.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ : (Καρότο, Κρεμμύδι, Πιπεριά, Πράσο, Κουνουπίδι, Λάχανο, Μαρούλι, Σέλινο, Φασόλι, Μητζέλι) : Δόση : 240 γρ./100 λίτ. ψεκ. υγρό. Περονόσπορος : Από το στάδιο των νεαρών σπορόφυτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες. Ανθράκωση, Σεπτορίωση, Κλαδοσπορίωση: Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

Τομάτα υπαίθρου - θερμοκηπίου : Δόση : 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Περονόσπορος : Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.

Καλλωπιστικά : Δόση : 280-350 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Περονόσπορος, Φυτοφθώρα : Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

Πατάτα : Δόση : 240 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Περονόσπορος : Όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Ζαχαρότευτλα : Δόση : 350 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Κερκοσπορίωση : Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

Μένιστος Αριθμός Εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο : Εσπεριδοειδή, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Μηλοειδή, Αμπέλι, Λαχανικά, Ζαχαρότευτλα : 3. Καρυδιά, Φιστικιά, Πυρηνόκαρπα : 4. Ελιά, Τομάτα (υ+θ), Πατάτα, Καλλωπιστικά : 2.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα) : Εσπεριδοειδή : 125-250, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Καρυδιά: 100-150, Μηλοειδή : 100-200, Πυρηνόκαρπα: 100-120, Αμπέλι : 50-150, Ελιά : 150 - 300, Λαχανικά, Τομάτα (υ+θ), Πατάτα, Καλλωπιστικά : 50 -100, Ζαχαρότευτλα : 40.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ : Εσπεριδοειδή, Αμπέλι (για επιτραπέζια και οινόποιηση σταφύλια), Ελιά, Πατάτα, Ζαχαρότευτλα : 21 ημέρες, Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φιστικιά, Φουντουκιά : 28 ημέρες. Λαχανικά (Υ+Θ) : 7 ημέρες, Τομάτα Υπαίθρου : 10 ημέρες, Τομάτα θερμοκηπίου : 7 ημέρες. Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα : Μη Εφαρμογίμο (Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή)

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 ΚΙΛΟ

CURENOX
50 WG

COPPER OXYCHLORIDE 50%
(ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ) ΒΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Μεταλλικός χαλκός 50% β/β (σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού)
Βοηθητικές ουσίες 10.71% β/β
Αρ. εγκρ. κυκλοφορίας: 60010 / 26-09-05

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.



- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.



- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
- Μπορεί να προκαλέσει μακρο-χρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Κάτοχος έγκρισης κυκλοφορίας: ALINTRA S.A., Ισπανία
Παρασκευαστής του σκευάσματος - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία & σήμανση - Εργοστάσιο παρασκευής:
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES (IQV) S.A., Ισπανία
Υπεύθυνος επικοινωνίας ANORGKAXHM A.E., Μουρούζη 9, 106 74 Αθήνα.



Εργοστάσιο συσκευασίας - ΔΙΑΝΟΜΗ: ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ. 210 5555220, 210 5559001-2
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ' Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ-Σίνδος
Τηλ. 2310 795884, Fax: 796741

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΕΙΣ : • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
• Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Μην αναπνέετε τη σκόνη ή το ψεκαστικό υγρό. • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. • Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια. • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
• Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων. • Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε τη διάθεση του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ : Σε περίπτωση κατάποσης χορηγείστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ : πενικιλλαμίνη.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 7793777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ : Δεν συνδυάζεται με αλκαλικούς πολτούς, με σκευάσματα mancozeb, maneb, thiram, captan, folpet και με ισχυρά οξέα και αμμωνία. ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ : Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, κερασιά και δαμασκηλιά αφού φουσκώνουν τα μύτα καθώς και στα κολοκυθοειδή. Οι παλαιές της μηλιάς Golden delicious, Jonathan, Reinette και Staimon είναι ευαίσθητες όταν το σκεύασμα εφαρμόζεται μετά την έναρξη της βλάστησης. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.

Παρατηρήσεις : • Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση, ιδιαίτερα για τα μηλοειδή. Οι μεγαλύτερες δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που γίνονται όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. • Στα λαχανικά να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. • Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. • Στις καλλιέργειες αμπέλι, εσπεριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : ψεκασμός φυλλώματος
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ : • Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. • Ρίξτε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας συνέχεια. • Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ : Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ : Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και σκιερό. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ :
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ :

