

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ : • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί. • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Να ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 7793 777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα: • Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. • Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα και το σκεύασμα αυτό. • Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό. • Αν ρυπανθούν τα νερά αρδεύσεως, να μη χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση. • Μη ψεκάζετε όταν φυσάει. • Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. • Μην αυξάνετε τις δόσεις. • Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό.

Φυτοτοξικότητα : Δεν είναι φυτοτοξικό στο βαμβάκι και τις δόσεις που συνιστάται όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως.

Συνδυαστικότητα: Το σκεύασμα συνδυάζεται με τα περισσότερα συνήθη εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και διαφυλλικά λιπάσματα. Το ψεκαστικό διάλυμα του μίγματος πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την παρασκευή του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα : Στην αρχική απараβίαστη συσκευασία του, σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

HEDIX 5 SL

HEDIX 5 SL

Meriquat chloride (Μετρίκουάτ χλωράιντ) 5%
Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση:

Meriquat chloride: 5% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 95% β/β

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

8142/13.05.2004

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

του βαμβακιού για την παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και την πρωίμηση της παραγωγής.
Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση του γιββερελλικού οξέος.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

Παρασκευαστής - Εργοστάσιο παρασκευής : BASF SE, Γερμανία.

Εργοστάσιο συσκευασίας: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,
Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου,
57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη.



Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ. 210 5555 220, 210 5559 001-2
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ' Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ.-Σίνδος
Τηλ. 2310 795 884, Fax: 2310 796 741



Κατηγορία και τρόπος δράσης : Ρυθμιστής ανάπτυξης του Βαμβακιού για την παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και την πρωίμηση της παραγωγής. Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση του γιββερελλικού οξέος.

Τρόπος εφαρμογής : Καθολικός ψεκασμός του φυλλώματος με τουλάχιστον 20 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού : Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Φάσμα δράσης - Δόσεις - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής

α. Βαμβάκι αρδευόμενο καθ' όλη τη βλαστική περίοδο: Γίνεται ένας ψεκασμός όταν υπάρχουν 8-10 άνθη ανά 10 μέτρα γραμμής. Δόση : 150 κ.εκ.σκευάσματος / στρέμμα.

β. Βαμβάκι με πολύ πλούσια βλάστηση : Ο ψεκασμός μπορεί να γίνει όταν το ύψος του φτάσει τα 60 εκ. ακόμη κι αν δεν έχουν εμφανιστεί τα άνθη. Συνήθως γίνεται ένας ψεκασμός. Δόση : 150 κ. εκ.σκευάσματος / στρέμμα.

Όταν τα φυτά είναι πολύ ζωνηρά, μπορεί να γίνει και δεύτερος ψεκασμός με μειωμένη δόση σε 10-15 ημέρες από τον προηγούμενο (50-100 κ. εκ. σκευάσματος / στρέμμα).

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λιτ/στρέμμα): ≥ 20

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο : 2 με μεσοδιάστημα επεμβάσεων 10-15 ημέρες.

Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή : Δεν εφαρμόζεται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Μην ψεκάζετε το σκεύασμα εάν αναμένεται βροχή ή προγραμματίζετε να ποτίσετε (με τεχνητή βροχή) μέσα στις επόμενες 8 ώρες. 2. Μην χρησιμοποιείτε το σκεύασμα σε βαμβάκι που υποφέρει από έλλειψη νερού, από τροφοπενίες και από σοβαρές ζημιές από έντομα. 3. Για καλύτερη διαβροχή των φυτών προσθέστε στο ψεκαστικό διάλυμα προσκολλητικό.



HMER. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ως άνω μέρος συσκευασίας
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Ως άνω μέρος συσκευασίας