

ΟΞΥΧΛΩΡ 50 WP

Copper oxychloride (Οξυχλωριούχος χαλκός 50 %)
ΒΡΕΞΙΜΗ ΣΚΟΝΗ (WP)

Εγγυημένη σύνθεση: Μεταλλικός χαλκός 50% β/β σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού (Copper Oxychloride) • Βοηθητικές ουσίες : 14,53% β/β
Αρ. εγκρ. κυκλοφορίας : 6507/31.01.90

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΔΟΣΕΙΣ (γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα
ψεκαστικού υγρού) - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέιφφρουτ, Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Νεραντζιά) : Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση. 190. Με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. Φυτόφθορα καρπών. 190. Εφαρμογή το δεύτερο 15νήμερο του Οκτωβρίου και επανάληψη μετά από 3-4 μήνες. Συνιστάται να ψεκάζονται τα χαμηλά κλαδιά μέχρι 1,5 μ από το έδαφος. Προσβολή κλαδίσκων, φύλλων και καρπών. 190. Εφαρμογή πριν την έναρξη των βροχών και μετά από χαλάζι ή παγετό. **Αμυγδαλιά** : Κηλίδωση φύλλων. 160. Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και το χειμώνα πριν φουσκώσουν τα μάρτια. **Καρυδιά** : Ανθράκωση, Κηλίδωση φύλλων και καρπών. 160. Εφαρμογές που αρχίζουν πριν εκπτυχθούν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες. **Φουντουκιά** : Βακτηριακό έλκος. 160. Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές : α. μόλις αρχίσουν να πέφτουν τα φύλλα και β. όταν πέσει το 75% των φύλλων. **Φιστικιά** : Σεπτορίωση. 160. Εφαρμογές : α. Στην πρώτη εμφάνιση της βλάστησης, β. όταν ο καρπός αποκτήσει μήκος 1 εκ.γ. μετά από 20 ημέρες, δ. αρχές φθινοπώρου μετά τη συγκομιδή των καρπών. **ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά)** : Φουζικλάδιο, Σεπτορίωση, Φαίά σήψη. 250. Το φθινόπωρο πριν την πτώση των φύλλων και στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Βακτηρίωση, Βακτηριακό κάψιμο. 250. Στις περιοχές που υπάρχει χρόνιο πρόβλημα προσβολών από τα βακτήρια, συνιστώνται δυο εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά)** : Κορύνιο, Εξώσκος, Κλαδοσπορίωση. 170. Στις περιοχές που ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμογές : α) το φθινόπωρο, μόλις πέσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών, Φαίά σήψη. 170. Εφαρμογές στη διόγκωση των οφθαλμών και στη ρόδινη κορυφή. Βακτηριακό έλκος. 170. Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων. **ΑΜΠΕΛΙ (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια)** : Περονόσπορος, Ανθράκωση. 260. Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ, μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση. **ΕΛΙΑ** : Κυκλοκόνιο. 260. Δύο εφαρμογές : η πρώτη εφαρμογή το φθινόπωρο λίγο πριν την έναρξη των βροχών και η δεύτερη την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ. Γλοιοσπόριο. 260. Δύο εφαρμογές : Η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. Καρκίνωση. 260. Μετά το κλάδεμα και μετά από χαλάζι ή παγετό. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ (καρότο, κρεμμύδι, πιπεριά, πράσο, κουνουπίδι, λάχανο, μαρούλι, σέλινο, φασόλι, μπιζέλι)** : Περονόσπορος. 240. Από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων και επανάληψη ανά 10 - 14 ημέρες. Ανθράκωση, σεπτορίωση, κλαδοσπορίωση. 240. Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ** : Περονόσπορος, Φυτόφθορα. 280-350. Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο** : Εσπεριδοειδή, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Μηλοειδή, Αμπέλι, Λαχανικά, Ζαχαρότευτλα : 3, Καρυδιά, Φιστικιά, Πυρηνόκαρπα : 4, Ελιά, Τομάτα (υ+θ), Πατάτα, Καλλωπιστικά : 2.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα) : Εσπεριδοειδή 125-250, Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντουκιά, Φιστικιά : 100-150, Μηλοειδή : 100-200, Πυρηνόκαρπα : 100-120, Αμπέλι : 50-150, Ελιά : 150 - 300, Ζαχαρότευτλα : 40, Καλλωπιστικά, Λαχανικά, Τομάτα (υ+θ), Πατάτα : 50-100.

Παρατηρήσεις : 1) Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση, ιδιαίτερα για τα μηλοειδή. Οι μεγαλύτερες δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που γίνονται όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. 2) Στα λαχανικά να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. 3) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. 4) Στις καλλιέργειες αμπέλι, εσπεριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

Τρόπος εφαρμογής : Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού : Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα : Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.



ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ :
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ :

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

• Επιβλαβές σε περίπτωση
κατάποσης.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει
μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις
στο υδάτινο περιβάλλον.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ : • Μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟ : Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ : Πενικιλλαμίνη.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 77 93 777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους : Είναι φυτοτοξικό στην ροδακινιά, κερασιά και δαμασκηνιά αφού φουσκώσουν τα μάρτια καθώς και στα κολοκυνθοειδή. Οι ποικιλίες της μηλιάς Golden Delicious, Jonathan, Renetta και Staimon είναι ευαίσθητες όταν το σκεύασμα εφαρμόζεται μετά την έναρξη της βλάστησης. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.

Συνδυαστικότητα : Να μην χρησιμοποιείται μαζί με με πολτούς ορυκτελαίων την περίοδο της ενεργής βλάστησης. Δεν συνδυάζεται με mancozeb, captan, maneb, folpet, thiram και αλκαλικούς πολτούς.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή : Εσπεριδοειδή, Αμπέλι (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια), Ελιά, Πατάτα, Ζαχαρότευτλα : 21 ημέρες, Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φιστικιά, Φουντουκιά) : 28 ημέρες, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα : Μη Εφαρμόσιμο (Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή), Λαχανικά (υπαίθρου+θερμοκηπίου) : 7 ημέρες, Τομάτα (υπαίθρου) : 10 ημέρες, Τομάτα (Θερμοκηπίου) : 7 ημέρες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας : Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα - Συνθήκες αποθήκευσης του σκευάσματος : Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ : 25 ΚΙΛΑ

Εργοστάσιο παρασκευής:

SALDECO SALES Y DERIVADOS DE COBRE S.A, ΠΕΡΟΥ



Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση - Παρασκευαστής -
Εργοστάσιο συσκευασίας :

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ. 210 5555 220, 210 5559 001-2
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ' Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ.-Σίνδος
Τηλ. 2310 795 884, Fax: 2310 796 741

