



armetel® courre

armetel® courre armetel® courre armetel® courre armetel® courre

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Μην αναπνέετε τη σκόνη ή το ψεκαστικό υγρό. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή. • Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Σε περίπτωση κατάποσης: χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραιώση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση. Αντίδοτο: πενικιλαμίνη. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ
ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΨΕΚΑΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ 21
ΗΜΕΡΕΣ.

Ημερ.Παραγωγής (Prod.Date):
Αριθ. Παρτίδας (Batch No):



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 500ΓΡΑΜ.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αμπέλι: Περονόσπορος 250 γραμ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 10 εκ. -μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και -λίγο μετά την άνθηση.

Πατάτα: Περονόσπορος 250 γραμ./στρέμμα. Διαδοχικές προληπτικές εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες με έναρξη όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ.

Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα:

Αμπέλι: 50-150 λίτρα.

Πατάτα: 50-100 λίτρα

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιαστήματα επεμβάσεων (ημέρες): Αμπέλι 3 , Πατάτα 2 / 10-14

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εάν μετά την τελευταία εφαρμογή με το σκεύασμα εμφανιστεί περονόσπορος σε διάστημα μικρότερο από 10-14 ημέρες θα πρέπει να γίνει αμέσως επέμβαση με μυκητοκτόνα επαφής ή διασυστηματικά διαφορετικού τρόπου δράσης (να μην περιέχουν δραστικό συστατικό της ομάδας των φαινυλαμιδίων, όπως benalaxyl και ofluace).

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμπέλι: Στο τέλος της ανθοφορίας.

Πατάτα: 28 ημέρες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος με γάλου όγκου.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύουμε τη συνιστώμενη δόση σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση και εφαρμόζουμε μέσα σε λίγες ώρες.

Φυτοτοξικότητα: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας (σακούλες, σάκοι) μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης - Ημ. Λήξης: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από υγρασία και το άμεσο ηλιακό φως και σε θερμοκρασία μέχρι 35 °C. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



armetil® courre

armetil® courre

8/40 WP

(ΑΡΜΕΤΙΑ ΚΟΥΠΕ)

ΒΡΕΞΙΜΗ ΣΚΟΝΗ

METALAXYL (ΜΕΤΑΛΛΕΥΛ) +
COPPER OXYCHLORIDE (ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ)

Εγγυημένη Σύνθεση: Metalaxyl 8% β/β

Μεταλλικός Χαλκός 40% β/β σε
μορφή οξυχλωριούχου χαλκού
Βοηθητικές Ουσίες 20.10% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας:
6752/17-2-99

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
- Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών



ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.



Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-
Παρασκευαστής-Εργαστήριο παρασκευής:INDUSTRIAS QUIMICAS DEL
VALLES (IQV) S.A., Ισπανία.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε. Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα



Εργοστάσιο συσκευασίας-Διανομή:
ΕΠΙΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
Τ.Θ. 58, Θέση Ξηροπήγαδο 196 00 Μάνδρα
Αττικής, τηλ.: 210 5555 220, 210 5559 001-2
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ' Φόση ΒΙ.Π.Ε.Θ-Σίνδος
Τηλ. 2310 795864, Fax: 796741



armetil® courre

