

80 WG  
FRAME

80 WG  
FRAME

Sulphur (Σουλφούρ) 80% β/β  
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγ. Σύνθεση: sulphur 80% β/β  
βοηθητικές ουσίες 19,2 % β/β

Μυκητοκτόνο επαφής  
με προστατευτική δράση

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αρ. Έγκ. Κυκλοφορίας: 6997/21-5-2005

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ



Εργοστάσιο παρασκευής - Παρασκευασευστής : AGROSTULLN GmbH, Germany  
Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση –  
Εργοστάσιο συσκευασίας:

ΕΠΙΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ  
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής  
Τηλ. 210 5555220, 210 5559001-2  
ΦΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ-Σίνδος  
Τηλ. 2310 795884, Fax: 796741



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

| ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ                                                 | ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ   | ΔΟΣΕΙΣ<br>γραμ. σκ./100 λίτ.<br>ψεκ. υγρού | Μέγιστη<br>ποσότητα οκυσμ.<br>πρ. σπέρμ. | ΟΓΚΟΣ<br>ψεκ. υγρού<br>λίτραι/στρέμ. | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μηλιά<br>Αχλαδιά                                            | Όϊδιο       | 400                                        | 1000                                     | 150-250                              | Στα στάδια πράσινης και<br>ρόδινης κορυφής.                                                                                                                                                                              |
|                                                             | Φουζικλάδιο | 200-300<br>500                             | 750<br>1250                              |                                      | Στην πτώση των πετάλων<br>και εφόσον οι συνθήκες<br>ευνοούν την ανάπτυξη της<br>ασθένειας.                                                                                                                               |
| Ροδακινιά<br>Βερικοκιά                                      | Όϊδιο       | 300-400                                    | 1000                                     | 150-250                              | Στα στάδια πτώσης πετά-<br>λων, απόσπασης του κάλυ-<br>κα και στάδιο καρπιδίου<br>και εφόσον οι συνθήκες<br>ευνοούν την ανάπτυξη της<br>ασθένειας.                                                                       |
| Αμπέλι                                                      | Όϊδιο       | 200-400<br>100-200                         | 600<br>300                               | 50-150                               | Όταν οι βλαστοί έχουν<br>μήκος περίπου 10 εκ.<br>Κατά την άνθηση, μετά το<br>δέσιμο των ραγών και<br>κάθε 15-20 μέρες μέχρι το<br>στάδιο του "γυαλισματος"<br>των ραγών ανάλογα<br>πάντα με την ένταση της<br>προσβολής. |
|                                                             | Ερίκωση     | 1000                                       | 1500                                     |                                      | Έναρξη έκπτυξης των<br>αφολώνων.                                                                                                                                                                                         |
| Τομάτα<br>Μελιτζάνα<br>Πιπεριά                              | Όϊδιο       | 200-300                                    | 300                                      | 50-100                               | Με την εμφάνιση των<br>πρώτων συμπτωμάτων της<br>ασθένειας και επανάληψη<br>ανάλογα με την ένταση<br>της προσβολής ανα 10-15<br>ημέρες.                                                                                  |
| ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ:<br>Αγγούρι<br>Κοκοκύθι<br>Πεπόνι<br>Καρπούζι | Όϊδιο       | 200-300                                    | 240                                      | 50-80                                | Με την εμφάνιση των<br>πρώτων συμπτωμάτων της<br>ασθένειας και επανάληψη<br>ανάλογα με την ένταση<br>της προσβολής ανα 10-15<br>ημέρες.                                                                                  |
| Τριανταφυλλιά                                               | Όϊδιο       | 200-300                                    | 150                                      | 50                                   | Μόλις οι βλαστοί αποκτή-<br>σουν μήκος 10-15 εκ και<br>επανάληψη ανάλογα με<br>την ένταση της προσβο-<br>λής.                                                                                                            |

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Αμπέλι, Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Κολοκυνθοειδή, Τριανταφυλλιά: 4.  
Παρατηρήσεις:

- Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.
- Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
- Στις καλλιεργείες μηλιά-αχλαδιά, ροδακινιά, βερικοκιά, αμπέλι, λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
- Το θεράφι έχει μέτρια δράση κατά των ακάρεων.  
Ειδικές συνθήκες γεωργικές φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπο τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί : Το θεράφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18 °C. Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20 °C.  
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος  
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.Ρίχνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας συνεχώς. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευση. Το ψεκαστικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του αφού προηγηθεί ισχυρή αναδευση. Παρατήρηση: Επειδή το θεράφι διαβρώνει τα μέταλλα, οι ψεκαστήρες πρέπει να πλένονται πολύ καλά αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού.  
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Νερό και απορρυπαντικό

80 WG  
FRAME

Sulphur (Σουλφούρ) 80% β/β  
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγ. Σύνθεση: sulphur 80% β/β  
βοηθητικές ουσίες 19,2% β/β

Μυκητοκτόνο επαφής  
με προστατευτική δράση

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αρ. Έγκ. Κυκλοφορίας: 6997/21-5-2005

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ



Εργοστάσιο παρασκευής - Παρασκευασευστής : AGROSTULLN GmbH, Germany  
Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση –  
Εργοστάσιο συσκευασίας:

ΕΠΙΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ  
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής  
Τηλ. 210 5555220, 210 5559001-2  
ΦΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ-Σίνδος  
Τηλ. 2310 795884, Fax: 796741



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε •Αποφεύγετε επαφή με τα μάτια  
•Φοράτε κατάλληλα γάντια. •Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτή την συσκευασία ή την ετικέτα. •Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. Μη ψεκάζετε αντίθετα στον άνεμο

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ

-Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν)

-Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή

-Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε το αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι

-Σε περίπτωση κατάποσης πιείτε δύο ποτήρια νερό. Μην δίνετε τίποτα από το στόμα και μην προκαλείτε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφευρέστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

Φυτοτοξικότητα: Όταν χρησιμοποιείται μέσα σε 4 εβδομάδες από την εφαρμογή πολλού, προκαλεί φυτοτοξικότητα. Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 28 °C) μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στα φυτά. Το θεράφι μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή, καθώς και σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς, αχλαδιάς και βερικοκιάς.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με ορυκτέλαια καθώς και με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 7 ημέρες

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι σακούλες και οι σάκοι ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τα κομμάτια που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος καλά αεριζόμενο, προσταγμένο από την απευθείας έκθεση στον ήλιο και από υγρασία, και μακριά από εστίες φωτός. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα μένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΑΡΙΘ. ΠΑΤΡΙΔΑΣ:



ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ: 1 κιλό