

BORDO

20 WP

ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ - ΒΡΕΞΙΜΗ ΣΚΟΝΗ (WP)

ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Εγγυημένη σύνθεση : Μεταλλικός χαλκός 20% β/β, σε μορφή βορδιγάλειου πολτού. • Βοηθητικές ουσίες 21.57% β/β

ΧΙ



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

Κίνδυνος σοβαρών
οφθαλμικών βλαβών

N

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει
μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις
στο υδάτινο περιβάλλον.

Αρ. εγκρ. κυκλοφορίας : 6540/3-12-91

**Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΔΟΣΕΙΣ (γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα
ψεκαστικού υγρού) - **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

• **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ** (Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρουτ, Κιτριά, Νεραντζιά, Φράπα) : 400. Όγκος ψεκ. υγρού : 200-250 λίτ/στρ. **Κορυφοξήρα**: Προληπτικές εφαρμογές φθινοπώρου εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. **Προσβολή κλαδίσκων, φύλλων και καρπών** : Εφαρμογή μετά από χαλάζι ή παγετό.
• **ΑΚΡΟΔΡΥΑ** (Αμυγδαλιά, Καρυδιά) : 400. Όγκος ψεκ.υγρού : 100-150 λίτ/στρ. **Αμυγδαλιά** : **Κορύμβο** : Μία εφαρμογή το φθινόπωρο όταν έχει πέσει το 75% των φύλλων και μία το χειμώνα λίγο πριν την έκπτυξη των ξυλοφόρων οφθαλμών. Με την έναρξη της βλάστησης γίνονται άλλες 1-2 εφαρμογές εφ' όσον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. **Καρυδιά** : **Ανθράκωση** : Συνιστώνται 3-4 εφαρμογές που αρχίζουν πριν βγουν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες. Να αποφεύγονται οι εφαρμογές στην άνοιξη.
• **ΜΗΛΙΑ** : 550-625. Όγκος ψεκ. υγρού : 100 -200 λίτ/στρ. **Φουζικλάδιο** : Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων συνιστώνται εφαρμογές στα στάδια της πράσινης και ροδίνης κορυφής και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.
• **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά, Βυσσινιά) : 425. Όγκος ψεκ.υγρού : 100-120 λίτ/στρ. **Εξώασκος, Κορύμβο, Φαϊά σήψη** : Προληπτικές εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πριν φουσκώσουν τα μάρτια.
• **ΑΜΠΕΛΙ** (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια) : 550 - 650. Όγκος ψεκ. υγρ. : 50-100 λίτ/στρ. **Περωνόσπορος, ανθράκωση** : Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων προληπτικές εφαρμογές που αρχίζουν την άνοιξη όταν υπάρχουν οι κατάλληλες για την προσβολή συνθήκες και συνεχίζονται ανάλογα με την εξέλιξη των τοπικών συνθηκών.
• **ΕΛΙΑ** : 600-650. Όγκος ψεκ.υγρού:150-300 λίτ/στρ. **Κυκλοκόνιο** : 2 εφαρμογές: Η πρώτη εφαρμογή το φθινόπωρο λίγο πριν την έναρξη των βροχών και η δεύτερη την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ. **Γλοιοσπόριο** : 2 εφαρμογές : Η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. **Καρκίνωση** : 2 Εφαρμογές μετά από χαλάζι ή παγετό.
• **ΛΑΧΑΝΙΚΑ** (Κρεμμύδι, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθι, Κουνουπίδι, Λάχανο, Μαρούλι, Σπανάκι, Σέλινο, Πράσο, Πεπόνι, Καρπούζι, Φασόλι) : 350. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 80 λίτ/στρ. **Περωνόσπορος, Σειποριώση** : Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σπορόφυτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες. **Ανθράκωση** : Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά. **Βακτηριώσεις** : Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σπορόφυτων και σταματούν στην καρπώδηση.
• **ΤΟΜΑΤΑ** (υπαίθρου, θερμοκηπίου) : 550 - 625. Όγκος ψεκ. υγρού : 50 - 100 λίτ / στρ. **Περωνόσπορος** : Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **Βακτηριακή κηλίδωση** : Εφαρμογές με την εκδήλωση της ασθένειας και εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωσή της.
• **ΠΑΤΑΤΑ** : 550-612,5. Όγκος ψεκ. υγρού : 50-100 λίτ/στρ. **Περωνόσπορος** : Εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας οι εφαρμογές ξεκινούν όταν τα φυτά έχουν ύψος 15 - 20 εκ. και επαναλαμβάνονται ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
• **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ** 550 - 650. Όγκος ψεκ. υγρού: 40 λίτ/στρ. **Κερκοσπορίωση** : Εφαρμογές που αρχίζουν με την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας.
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ : 550-650. Όγκος ψεκ.υγρού : 50 - 100 λίτ/στρ. **Περωνόσπορος, Σειποριώση** : Εφαρμογές που αρχίζουν με την εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων. **Φυτόφθορα** : Εφαρμογή στα νεαρά φυτά στο σπορείο ή μετά τη μεταφύτευση.
Παρατηρήσεις : Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνοιξη, ιδιαίτερα για τη μηλιά και οι μεγάλες όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις καλλιέργειες : αμπέλι, εσπεριδοειδή, μηλιά, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο : Εσπεριδοειδή-Ακρόδρυα - Αμπέλι - Λαχανικά - Ζαχαρότευτλα = 4. Μηλιά - Ελιά - Πυρηνόκαρπα = 2. Τομάτα - Πατάτα - Καλλωπιστικά = 6.

Κάτοχος της έγκρισης : ALINTRA S.A., Garbí 3, Poligono Industrial Can Volart, 08150 Parets del Valles, Barcelona, Spain

Υπεύθυνος επικοινωνίας : ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε., Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση - Παρασκευαστής :

Εργοστάσιο παρασκευής : INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A. (I.Q.V.), Ισπανία



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ :

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ. 210 5555 220, 210 5559 001-2
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ' Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ.-Σινδός
Τηλ. 2310 795 884, Fax: 2310 796 741



ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ : Εσπεριδοειδή, Ελιά, Πατάτα, Ζαχαρότευτλα : 21 ημέρες. Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά) : 28 ημέρες. Μηλιά, Πυρηνόκαρπα : Μη εφαρμόσιμο (καθορίζεται από το στάδιο της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή). Αμπέλι (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια) : 21 ημέρες. Λαχανικά (Υ+Θ) : 7 ημέρες. Τομάτα : (υπαίθρου 10 ημέρες, Θερμοκηπίου 7 ημέρες).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ : • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Μην αναπνέετε τη σκόνη ή το ψεκαστικό υγρό. • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). • Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ : Σε περίπτωση κατάποσης χορηγείστε γάλα ή νερό (για αρραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ : πενικιλλαμίνη.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 7793777

**Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα και τη συσκευασία του.
Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.**

Τρόπος εφαρμογής : ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ : Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας και αφού το περάσετε από φιλτή σίτα. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας καλά (με επιστροφή 10-20 λίτρα νερό το λεπτό).

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ : Δεν συνδυάζεται με οργανοφωσφορικά και καρβαμικά εντομοκτόνα καθώς και με maneb, mancozeb, folpet, captan και thiram. Επίσης δεν συνδυάζεται με ελαιούχα σκευάσματα όταν ο ψεκασμός γίνεται εκτός της εποχής του ληθάργου των δένδρων.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ : Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, κερασιά και δαμασκηλιά αφού φουσκώσουν τα μάρτια. Επίσης μπορεί να παρουσιάσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή κάτω από ορισμένες συνθήκες (υψηλή υγρασία). Φυτοτοξικότητα παρουσιάζει επίσης σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς. Στη μηλιά να χρησιμοποιείται πριν την άνθηση. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ : Τα κενά συσκευασίας (σακούλες, σάκοι) μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ / ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ / ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ : Να αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα μένει σταθερό για δύο χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ : 5 ΚΙΛΑ



ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Prod. Date):
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ (Batch No) :