

COPPER HYDROXIDE (ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ)

Cuprigo 50 WP

ΒΡΕΞΙΜΗ ΣΚΟΝΗ (WP)

Εγγ. Σύνθεση:

Μεταλλικός χαλκός 50% β/β, σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού. Βοηθητικές ουσίες 15,26% β/β

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 6833/ 18-9-01

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ - ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ - ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών.



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. • Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους ως επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε τη διάθεση του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές ή δελτία δεδομένων ασφαλείας. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση. **Αντίδοτο:** Πενικιλαμίνη. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδενώντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Φυτοτοξικότητα:** Είναι φυτοτοξικό στις ποικιλίες αμειλίχου Delaware, Rosette, Niagara και Concord. Είναι φυτοτοξικό στα πυρηνόκαρπα μετά την έκπτυξη των φύλλων. Εφαρμογή στις κτήριες ποικιλίες της μηλιάς μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό. Στη μηλιά οι εφαρμογές να σταματούν όταν η πράσινη κορυφή αποκτήσει μήκος 1 εκ. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του μετά την πλήρη άνθηση. Στις ευαίσθητες ποικιλίες αμυγδαλιάς όπως Peerless & Mission παρατηρείται ελαφρά φυτοτοξικότητα όταν εφαρμόζεται μετά την άνθηση. Ο κίνδυνος φυτοτοξικότητας αυξάνεται στις χαμηλές θερμοκρασίες (< 5 °C) και σε υγρασία. **Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα, όξινα σκευάσματα και με σκευάσματα που περιέχουν θειάφι. Σε περίπτωση συνδυασμού με το προσκολλητικό, λάδια, εντομοκτόνα και άλλα μυκητοκτόνα διαλύεται το CUPRIGO 50 WP σε ένα δοχείο και μπαίνει πρώτο στο βυτίο και μετά προστίθενται τα υπόλοιπα σκευάσματα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτ./στρ.):** Επεριδοειδή: 200-250. Ακρόδρια: 100-150. Μηλοειδή: 100-200. Πυρηνόκαρπα: 100-120. Αμειλίχ: 50-150. Ελιά: 150-300. Τομάτα (Y+Θ) - Πιπεριά (Y+Θ) - Κολοκυνθοειδή: 50-100. Φασόλι: Σέλινο: 50-80. Αραχίδα: 60. Ζαχαρότευτλα: 40. Πατάτα: 50-100.

Παρατηρήσεις: • Οι μικρές δόσεις αφορούν στον ψεκασμό που πλησιάζουν προς την άνθηση, ιδιαίτερα για τα μηλοειδή και οι μεγάλες όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. • Στα λαχανικά να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. • Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. • Στις καλλιέργειες αμειλίχ, επεριοδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά από κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** • Επεριοδοειδή: 21 ημέρες. • Ακρόδρια (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντούκι, Φιστικιά): 28 ημέρες. • Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα: Μη Εφαρμοσίμο (Καθαρίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την ερπορήση). • Αμειλίχ (για επιτραπέζια και οиноποιήσιμα σταφύλια): 21 ημέρες. • Ελιά: 21 ημέρες. • Λαχανικά (Y+Θ): 7 ημέρες. • Τομάτα: Υπόψιχου 10 ημέρες. Τομάτα Θερμοκήπιου 7 ημέρες. • Πατάτα: 21 ημέρες. • Αραχίδα: Ζαχαρότευτλα: 21 ημέρες. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (σκακούλι, μιά) ή τα κούτια (αν υπάρχουν), αφού καταστραφούν προηγούμενα με οξύμιο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφονται όλα σε σημεία συλλογής ή ανάκτησης ενέργειας. **Χρονική σταθερότητα - Συνθήκες αποθήκευσης:** Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό (θερμοκρασία κάτω από 38 °C) και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερά για δύο (2) χρόνια.

Καλλιέργειες-Ασθενείς-Δόσεις (γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού)-Χρόνος εφαρμογής: **Επεριοδοειδή (Γκρέιφ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά):** Για Κορυμφοξήρα, Ανθράκωση, Σπορίωση εφαρμόζονται με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. Για Προσβολή κλαδίσμων, φύλλων και καρπών εφαρμόζονται πριν την έναρξη των βροχών και μετά από χαλάζι ή παγετό. Για Φυτοφάγοι καρπών εφαρμόζονται το δεύτερο 15/10/10 του Οκτωβρίου και επανάληψη μετά από 3-4 μήνες. Συνιστάται να ψεκάζονται τα χαμηλά κλαδιά, μέχρι 1,5μ. από το έδαφος. **Δόση:** 100-160. **ΑΚΡΟΔΡΙΑ Αμυγδαλιά:** Για Εξώσκα, στις περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια, εφαρμόζονται το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και το χειμώνα λίγο πριν την έκπτυξη των βλαστών/οφθαλμών. Για Κηλίωση φύλλων και καρπών εφαρμόζονται που αρχίζουν μετά την πτώση των πετάλων και επαναλαμβάνονται κάθε 15-20 ημέρες. **Δόση:** 160. **Καρυδιά:** Για Ανθράκωση,

Κηλίωση φύλλων και καρπών οι εφαρμογές αρχίζουν πριν εκπτυχθούν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες. **Δόση:** 160. **Φουντούκι:** Για Βακτηριακό έλκος, στις περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια, εφαρμόζονται με τις πρώτες βροχές από τα φύλλα και β) όταν πέσει το 75% των φύλλων. **Δόση:** 160. **Φιστικιά:** Για Σπορίωση εφαρμόζονται: α) στην πρώτη εμφάνιση της βλάστησης, β) όταν ο καρπός αποκτήσει μήκος 1 εκ. **Δόση:** 160. **ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά):** Για Φουξιδάκι, Σπορίωση, Φαίδ σήψη εφαρμόζονται το φθινόπωρο, πριν τη πτώση των φύλλων και στο στάδιο της πράσινης κορυφής. Για Βακτηρίαση, Βακτηριακό κάψιμο, στις περιοχές που ενδημούν οι ασθένειες, συνιστώνται δύο εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. **Δόση:** 250. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά:** Για Κορίνιο, στις περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια, εφαρμόζονται α) το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του χειμώνα πριν τη διάγκωση των οφθαλμών. Για Φαίδ σήψη εφαρμόζονται κατά τη διάγκωση των οφθαλμών και στη ρόδινη κορυφή. **Κερασιά:** Για Κορίνιο (Προσβολή από Pseudomonas syringae), στις περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια, εφαρμόζονται α) το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του χειμώνα πριν τη διάγκωση των οφθαλμών. **Ροδανθινά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά:** Για Κορίνιο, Εξώσκα, Κλαδοσπορίωση, στις περιοχές όπου ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμόζονται α) το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του χειμώνα πριν τη διάγκωση των οφθαλμών. Για Φαίδ σήψη εφαρμόζονται κατά τη διάγκωση των οφθαλμών και στη ρόδινη κορυφή. Για Βακτηριακό έλκος, στις περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια, εφαρμόζονται στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων. **Δόση:** 170. **Αμειλίχ (επιτραπέζια και οινόποισιμα σταφύλια):** Για Περονόσπορο, Ανθράκωση, Βακτηριακή νέκρωση εφαρμόζονται που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση. **Δόση:** 240. **Ελιά:** Για Κυκλοκόνιο, στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμόζονται από αρχές φθινοπώρου μέχρι αρχές άνοιξης. **Δόση:** 260 (φθινόβ), 210 (άνοιξη). Για Γλοισπορίο δύο εφαρμογές: η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. **Δόση:** 260. Για Καρκίνωση εφαρμόζονται μετά το κλάδεμα και μετά από χαλάζι ή παγετό. **Δόση:** 260 (φθινόβ), 210 (άνοιξη). **Τομάτα (Y+Θ), Πιπεριά (Y+Θ):** Για Περονόσπορο εφαρμόζονται από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες. Για Κλαδοσπορίωση, Σπορίωση, Ανθράκωση εφαρμόζονται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Για Βακτηρίαση εφαρμόζονται από το στάδιο των νεαρών φυτών μέχρι την καρποδέση. **Δόση:** 250 (βαριά προσβολή), 160 (ελαφρά προσβολή). **Κολοκυνθοειδή (Y+Θ) (Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι):** Για Περονόσπορο, Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Βακτηρίαση εφαρμόζονται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **Δόση:** 110. **Φασόλι:** Για Κερκοσπορίωση εφαρμόζονται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες. Για Βακτηρίαση εφαρμόζονται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **Δόση:** 140. **Σέλινο:** Για Σπορίωση, Κερκοσπορίωση εφαρμόζονται στα φυτά εφώσ ύψος 15-20 εκ. και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **Δόση:** 140. **Αραχίδα:** Για Κερκοσπορίωση εφαρμόζονται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **Δόση:** 180. **Πατάτα:** Για Περονόσπορο, Ανθράκωση εφαρμόζονται όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **Δόση:** 180 (βαριά προσβολή), 110 (ελαφρά προσβολή). **Ζαχαρότευτλα:** Για Κερκοσπορίωση εφαρμόζονται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **Δόση:** 280. **Μήνισμα ορισμός εφαρμογών ανά καλλιέργεια/πρόδο:** Φουντούκι, Ελιά: 2, Επεριοδοειδή (Γκρέιφ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά), Αμυγδαλιά, ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά), Βερικοκιά, Φασόλι, Σέλινο Αραχίδα: 3, Καρυδιά, Φιστικιά, Κερασιά, Ροδανθινά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά, Αμειλίχ (επιτραπέζια και οινόποισιμα σταφύλια), Τομάτα (Y+Θ), Πιπεριά (Y+Θ), Κολοκυνθοειδή (Y+Θ) (Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι), Πατάτα, Ζαχαρότευτλα: 4.

ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ: 500 ΓΡ.

ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΑΣ:



Εργοστάσιο παρασκευής: SALDECO SALES Y DERIVADOS DE COBRE S.A
Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση
Παρασκευαστής - Συσκευαστής: **ΕΛΛΗΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**

Όσση Επιορήσιμο, 19600 Μάνδρα Αττικής Τηλ. 210 5555220, 210 5559001-2
ΟΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ-Σίνδος Τηλ. 2310 795884, Fax: 796741

