COURE FLOW

Οξυχλωριούχος χαλκός 38%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

38 SC

Εγγυημένη σύνθεση: Μεταλλικός χαλκός 38% β/ο, σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού.
Βοηθητικές ουσίες : 53.20% β/β.

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

Xn
ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης.

N
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Κάτοχος της έγκρισης - Παρασκευαστής του σκευάσματος -
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία & σήμανση -
Εργοστάσιο παρασκευής :
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES (IQV) S.A., Ισπανία
Υπεύθυνος επικοινωνίας : ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ, Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα.

Αρ. εγκ. κυκλοφορίας : 60056/20.06.2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : 3,5 ΛΙΤΡΑ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΑΓΡΕΤ

Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομή :
ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ. 210 5555 220, 210 5559 001-2
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ' Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ.-Σίνδος
Τηλ. 2310 795 884, Fax: 2310 796 741

Μέλος του: ΕΣΥΦ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΟΣΕΙΣ :
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέϊπφρουτ, Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κιτριά, Νεραντζιά) **:** για **Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση** με εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου, για **Φυτόφθορα καρπών** με εφαρμογή το δεύτερο 15νθήμερο του Οκτωβρίου και επανάληψη μετά από 3 - 4 μήνες. Συνιστάται να ψεκάζονται τα χαμηλά κλαδιά μέχρι 1,5 μ. από το έδαφος. Δόση : 250 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **Αμυγδαλιά :** για **Κηλίδωση φύλλων**. Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και το χειμώνα πριν φουσκώσουν τα μάτια. Δόση: 210 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **ΚΑΡΥΔΙΑ:** για **Ανθράκνωση, Κηλίδωση φύλλων και καρπών** με εφαρμογές που αρχίζουν πριν εκπτυχθούν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες. Δόση: 210 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρό. **ΦΙΣΤΙΚΙΑ :** για **Σεπτορίωση** με εφαρμογές α) Στην πρώτη εμφάνιση της βλάστησης β) όταν ο καρπός αποκτήσει μήκος 1 εκ. γ) μετά από 20 ημέρες δ) αρχές φθινοπώρου μετά τη συγκομιδή των καρπών. Δόση : 210 κ. εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ :** για **Βακτηριακό έλκος**. Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές α) μόλις αρχίσουν να πέφτουν τα φύλλα και β) όταν πέσει το 75% των φύλλων. Δόση: 210 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά): για **Φουζικλάδιο, Σεπτορίωση, Φαιά σήψη** με εφαρμογές το φθινόπωρο πριν την πτώση των φύλλων και στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών, για **Βακτηρίωση, Βακτηριακό κάψιμο** στις περιοχές που υπάρχει χρόνιο πρόβλημα προσβολών από τα βακτήρια, συνιστώνται δυο εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων. Δόση : 325 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά) : για **Κορύνεο, Εξώασκο, Κλαδοσπορίωση** στις περιοχές που ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμογές α) το φθινόπωρο, μόλις πέσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών, για **Φαιά σήψη** με εφαρμογές στη διόγκωση των οφθαλμών και στη ρόδινη κορυφή, για **Βακτηριακό έλκος** στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων. Δόση : 220 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **ΑΜΠΕΛΙ** (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια) : για **Περονόσπορο, Ανθράκωση** με εφαρμογές όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση. Δόση : 340 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **ΕΛΙΑ :** για **Κυκλοκόνιο** δύο εφαρμογές: η πρώτη εφαρμογή το φθινόπωρο λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση. Δόση : 340 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **ΕΛΙΑ :** για **Κυκλοκόνιο** δύο εφαρμογές: η πρώτη εφαρμογή το φθινόπωρο λίγο πριν την έναρξη των βροχών και η δεύτερη την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ., για **Γλοιοσπόριο** δύο εφαρμογές : η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα, για **Καρκίνωση** με εφαρμογές μετά το κλάδεμα και μετά από χαλάζι ή παγετό. Δόση : 340 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ** (Καρότο, Ραπάνι, Κρεμμύδι, Πιπεριά, Πράσο, Κουνουπίδι, Λάχανο, Μαρούλι, Σπανάκι, Ραδίκι, Αγκινάρα, Σέλινο, Φασόλι, Μπιζέλι) : για **Περονόσπορο** με εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σπορόφυτων και επανάληψη ανά 10 - 14 ημέρες, για **Ανθράκνωση, Σεπτορίωση, Κλαδοσπορίωση** με εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Δόση: 310 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ) :** για **Περονόσπορο** με προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, για **Βακτηριακή κηλίδωση** με εφαρμογές που γίνονται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωσή της. Δόση: 325 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **ΠΑΤΑΤΑ:** για **Περονόσπορο** με εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκατ. και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Δόση: 310 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ :** για **Κερκοσπορίωση** με εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Δόση : 450 κ. εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ :** για **Περονόσπορο, Φυτόφθορα** με εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Δόση: 370-450 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό.
ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ : (Λίτρα/στρ.): Εσπεριδοειδή 125-250, Αμυγδαλιά/ Καρυδιά / Φιστικιά / Φουντουκιά 100-150, Μηλοειδή 100-200, Πυρηνόκαρπα 100-120, Αμπέλι 50-150, Ελιά 150-300,Λαχανικά/ Τομάτα (υ+θ) /Πατάτα/Καλλωπιστικά 50-100, Ζαχαρότευτλα 40.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες) : Εσπεριδοειδή, Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια), Ελιά, Πατάτα, Ζαχαρότευτλα:**21**, Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φιστικιά, Φουντουκιά : **28**, Τομάτα (υπαίθρου) : **10**, Τομάτα (θερμοκηπίου), Λαχανικά (υ+θ) : **7**, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα : Μη εφαρμόσιμο (καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή).
Τρόπος εφαρμογής: ψεκασμός φυλλώματος
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ : Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ : Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Μην αναπνέετε το σκεύασμα ή το ψεκαστικό υγρό. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ : Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Εάν χρειασθεί, να χορηγηθεί οξυγόνο ή να γίνει τεχνητή αναπνοή. Καλέστε γιατρό αμέσως. Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** πενικιλλαμίνη.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 1) Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση, ιδιαίτερα για το μηλοειδή. Οι μεγαλύτερες δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που γίνονται όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. 2) Στα λαχανικά να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. 3) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. 4) Στις καλλιέργειες: αμπέλι, εσπεριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο : Εσπεριδοειδή, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Μηλοειδή, Αμπέλι, Λαχανικά, Ζαχαρότευτλα : **3.** Καρυδιά, Φιστικιά. Πυρηνόκαρπα : **4.** Ελιά, Τομάτα (Υ+Θ), Πατάτα Καλλωπιστικά: **2.**
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ : Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, κερασιά και δαμασκηνιά μετά το φούσκωμα των οφθαλμών καθώς και στα κολοκυνθοειδή. Οι ποικιλίες μηλιάς Golden delicious, Jonathan, Reinette και Staimon είναι ευαίσθητες όταν το σκεύασμα εφαρμόζεται μετά την έναρξη της βλάστησης. Στη μηλιά και αχλαδιά να χρησιμοποιείται πριν την άνθηση. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ : Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας : Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΑΣΜΑΤΟΣ : Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημερ. Παραγωγής (Prod. Date) :
Αριθ. Παρτίδας (Batch No) :

COURE FLOW

Οξυχλωριούχος χαλκός 38%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

38 SC

Εγγυημένη σύνθεση: Μεταλλικός χαλκός 38% β/ο, σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού.
Βοηθητικές ουσίες : 53.20 % β/β.

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

Xn
ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης.

Αρ. εγκ. κυκλοφορίας : 60056/20.06.2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : 800 κ.εκ.

N
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Κάτοχος της έγκρισης - Παρασκευαστής του σκευάσματος -
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία & σήμανση -
Εργοστάσιο παρασκευής :
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES (IQV) S.A., Ισπανία
Υπεύθυνος επικοινωνίας : ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ, Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΑΓΡΕΤ

Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομή :
ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ. 210 5555 220, 210 5559 001-2
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ' Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ.-Σίνδος
Τηλ. 2310 795 884, Fax: 2310 796 741

Μέλος του: ΕΣΥΦ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΟΣΕΙΣ :
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέϊπφρουτ, Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κιτριά, Νεραντζιά) **:** για **Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση** με εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου, για **Φυτόφθορα καρπών** με εφαρμογή το δεύτερο 15νθήμερο του Οκτωβρίου και επανάληψη μετά από 3 - 4 μήνες. Συνιστάται να ψεκάζονται τα χαμηλά κλαδιά μέχρι 1,5 μ. από το έδαφος. Δόση: 250 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **Αμυγδαλιά :** για **Κηλίδωση φύλλων**. Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και το χειμώνα πριν φουσκώσουν τα μάτια. Δόση : 210 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **ΚΑΡΥΔΙΑ :** για **Ανθράκνωση, Κηλίδωση φύλλων και καρπών** με εφαρμογές που αρχίζουν πριν εκπτυχθούν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες. Δόση: 210 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **ΦΙΣΤΙΚΙΑ :** για **Σεπτορίωση** με εφαρμογές α) Στην πρώτη εμφάνιση της βλάστησης β) όταν ο καρπός αποκτήσει μήκος 1 εκ. γ) μετά από 20 ημέρες δ) αρχές φθινοπώρου μετά τη συγκομιδή των καρπών. Δόση: 210 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **Βακτηριακό έλκος**. Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές α) μόλις αρχίσουν να πέφτουν τα φύλλα και β) όταν πέσει το 75% των φύλλων. Δόση: 210 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά) **:** για **Φουζικλάδιο, Σεπτορίωση, Φαιά σήψη** με εφαρμογές το φθινόπωρο πριν την πτώση των φύλλων και στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών, για **Βακτηρίωση, Βακτηριακό κάψιμο** στις περιοχές που υπάρχει χρόνιο πρόβλημα προσβολών από τα βακτήρια, συνιστώνται δυο εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων. Δόση : 325 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά)**:** για **Κορύνεο, Εξώασκο, Κλαδοσπορίωση** στις περιοχές που ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμογές α) το φθινόπωρο, μόλις πέσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών, για **Φαιά σήψη** με εφαρμογές στη διόγκωση των οφθαλμών και στη ρόδινη κορυφή, για **Βακτηριακό έλκος** στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων. Δόση : 220 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **ΑΜΠΕΛΙ** (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια)**:** για **Περονόσπορο, Ανθράκωση** με εφαρμογές όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση. Δόση : 340 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **ΕΛΙΑ:** για **Κυκλοκόνιο** δύο εφαρμογές: η πρώτη εφαρμογή το φθινόπωρο λίγο πριν την έναρξη των βροχών και η δεύτερη την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ., για **Γλοιοσπόριο** δύο εφαρμογές : η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα, για **Καρκίνωση** με εφαρμογές μετά το κλάδεμα και μετά από χαλάζι ή παγετό. Δόση: 340 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ** (Καρότο, Ραπάνι, Κρεμμύδι, Πιπεριά, Πράσο, Κουνουπίδι, Λάχανο, Μαρούλι, Σπανάκι, Ραδίκι, Αγκινάρα, Σέλινο, Φασόλι, Μπιζέλι) : για **Περονόσπορο** με εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σπορόφυτων και επανάληψη ανά 10 - 14 ημέρες, για **Ανθράκνωση, Σεπτορίωση, Κλαδοσπορίωση** με εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Δόση: 310 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ) :** για **Περονόσπορο** με προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, για **Βακτηριακή κηλίδωση** με εφαρμογές που γίνονται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωσή της. Δόση: 325 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **ΠΑΤΑΤΑ:** για **Περονόσπορο** με εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκατ. και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Δόση: 310 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ :** για **Κερκοσπορίωση** με εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Δόση : 450 κ. εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ :** για **Περονόσπορο, Φυτόφθορα** με εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7 - 10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Δόση: 370-450 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό.
ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ : (Λίτρα/στρ.) : Εσπεριδοειδή 125-250, Αμυγδαλιά / Καρυδιά/ Φιστικιά/ Φουντουκιά 100-150, Μηλοειδή 100-200, Πυρηνόκαρπα 100-120, Αμπέλι 50-150, Ελιά 150-300,Λαχανικά/Τομάτα(υ+θ)/Πατάτα/Καλλωπιστικά 50-100, Ζαχαρότευτλα 40.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες) : Εσπεριδοειδή, Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια), Ελιά, Πατάτα, Ζαχαρότευτλα : **21**, Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φιστικιά, Φουντουκιά : **28**, Τομάτα (υπαίθρου) : **10**, Τομάτα (θερμοκηπίου),Λαχανικά (υ+θ): **7**, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα: Μη εφαρμόσιμο (καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή).
Τρόπος εφαρμογής: ψεκασμός φυλλώματος
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ : Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ : Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Μην αναπνέετε το σκεύασμα ή το ψεκαστικό υγρό. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα ό που είναι δυνατόν). Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ : Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Εάν χρειασθεί, να χορηγηθεί οξυγόνο ή να γίνει τεχνητή αναπνοή. Καλέστε γιατρό αμέσως. Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** πενικιλλαμίνη.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 1) Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση, ιδιαίτερα για το μηλοειδή. Οι μεγαλύτερες δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που γίνονται όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. 2) Στα λαχανικά να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. 3) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. 4) Στις καλλιέργειες: αμπέλι, εσπεριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο : Εσπεριδοειδή, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Μηλοειδή, Αμπέλι, Λαχανικά, Ζαχαρότευτλα : **3.** Καρυδιά, Φιστικιά. Πυρηνόκαρπα : **4.** Ελιά, Τομάτα (Υ+Θ), Πατάτα Καλλωπιστικά: **2.**
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ : Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, κερασιά και δαμασκηνιά μετά το φούσκωμα των οφθαλμών καθώς και στα κολοκυνθοειδή. Οι ποικιλίες μηλιάς Golden delicious, Jonathan, Reinette και Staimon είναι ευαίσθητες όταν το σκεύασμα εφαρμόζεται μετά την έναρξη της βλάστησης. Στη μηλιά και αχλαδιά να χρησιμοποιείται πριν την άνθηση. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ : Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας : Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστκό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΑΣΜΑΤΟΣ : Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημερ. Παραγωγής (Prod. Date) : ΒΛΕΠΕ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΦΙΑΛΗΣ
Αριθ. Παρτίδας (Batch No) :

PANTONE MPLE 2727 PRASINO 3385 MAYRO - PORTOKALI 021