ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό. • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή. • Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. • Σε περίπτωση απαγήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). • Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων, • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε τη διάθεση του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. • Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του, **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Πενικιλλαμίνη. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Κρατάτε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στα νερό ανοιξανοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Όγκος ψεκαστικού υγρού (λιτ/στρέμμα):** Εσπεριδοειδή: 200-250, Αμυγδαλιά, Καρυδιά: 100-150, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά: 100-120, Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): 50-150, Ελιά: 150-300, Μηλιά, Αχλαδιά: 100-200, Τομάτα (υ+θ), Πιπεριά (υ+θ), Καλοκαινιθοειδή (υ+θ), Πατάτα: 50-100, Φασόλι, Σέλινο: 50-80, Αραχιδα: 60, Ζαχαρότευτλα: 40. **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:** Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση, ιδιαίτερα για τα μηλοειδή και οι μεγάλες όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, τα είχος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. Στα λαχανικά να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις καλλιέργειες αμπέλι, εσπεριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που ευφυείς τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** Εσπεριδοειδή, Αμυγδαλιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Φασόλι, Σέλινο, Αραχιδα: 3, Ελιά: 2, Καρυδιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια), Τομάτα (υ+θ), Πιπεριά (υ+θ), Καλοκαινιθοειδή (υ+θ), Πατάτα, Ζαχαρότευτλα: 4. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Εσπεριδοειδή, Αμπέλι (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια), Ελιά, Πατάτα, Αραχιδα, Ζαχαρότευτλα: 21 ημέρες, Τομάτα υπαίθριο: 10 ημέρες, Λαχανικά (Υ+θ), Τομάτα θερμοκηπίου: 7 ημέρες, Αμυγδαλιά, Καρυδιά: 28 ημέρες, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα: Μη εφαρμόσιμο (Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή). **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Είναι φυτοτοξικό στις ποικιλίες αμπελιού DELAWARE, ROSETTE, NIAGARA και CONCORD. Είναι φυτοτοξικό στα πυρηνόκαρπα μετά την έκπτυξη των φύλλων. Επαναλαμβανόμενες εφαρμογές στα μηλοειδή μπορεί να προκαλέσουν καστανό χρωματισμό. Στη μηλιά οι εφαρμογές να σταματούν όταν η πρασινη κορυφή αποκτήσει μήκος 1 εκ. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση. Ο κινδυνος φυτοτοξικότητας αυξάνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες (<5°C) και σε υγρές συνθήκες. **Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα, οξινα σκευάσματα και με σκευάσματα που περιέχουν thiram. Σε περίπτωση συνδυασμού του με προσκολλητικό, λάδια, εντομοκτόνα και άλλα μικροκτόνα διαλύεται το XYDROCOURE 36 SC σε ένα δοχείο και μπαινει πρώτο στο βιτιό και μετά προστίθενται τα υπόλοιπα σκευάσματα. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ:** Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε ξηρό μέρος, δροσερό(θερμοκρασία κάτω από 38° C) και καλά αεριζόμενο χώρο. Στις συνθήκες αυτές μένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ : *Βλέπε άνω μέρος φιάλης.*

XYDROCOURE

Υδροξείδιο του χαλκού 36% Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) 36 SC

Εγγυημένη σύνθεση: **Μεταλλικός χαλκός 36% β/ο, σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού**
Βοηθητικές ουσίες: 56,37% β/β
Αρ. εγκ. κυκλοφορίας : 6849/24.01.02

Μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο, επαφής με προστατευτική δράση.

Xn

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : 250 κ.εκ.

N

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Κάτοχος της έγκρισης- Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση - Παρασκευαστής - Εργοστάσιο παρασκευής: INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A. (L.Q.V.), Ισπανία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε. Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΑΓΡΕΤ

Εργοστάσιο συσκευασίας-Διανομή:
ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
τηλ.: 210 55 55 220, 55 59 001-2
Θεσ/νίκη: 53 Ο.Τ., Γ' ΦΑΣΗ ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Σίνδος
τηλ.: 2310 79 58 84, Fax: 2310 79 67 41

Μέλος του ΕΣΥΦ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ- ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ φρουτ: Για Κοριοειδέρα, Ανθράκνωση, Σεπτορίαση, Δόση: 75-125 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό. Εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου, Για προσβολή κλαδάκων, φύλλων και καρπών, Δόση: 75-125 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό, Εφαρμογές πρίν την έναρξη των βροχών και μετά από χαλάζι ή παγετό. **ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ:** Για Κορύνεο. Δόση:175-220 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό. Στις περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και το χειμώνα λίγο πρίν την έκπτυξη των ξυλοφόρων οφθαλμών, Για εξέλκωση κορμού και κλάδων. Δόση: 175-250 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό. Εάν υπάρχουν ευνοϊκές για το βακτήριο συνθήκες συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής στην αρχή της άνθησης. **ΚΑΡΥΔΙΑ:** Για την Ανθράκνωση, Κηλίδωση φύλλων και καρπών, Δόση: 150-220 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό, Εφαρμογές που αρχίζουν πρίν εκπτυχθούν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες, **ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά:** Για Φυσίζκλαδιο, Σεπτορίαση, Φαιά σήψη, Δόση: 150-325 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό, Εφαρμογές τα φθινόπωρο, πρίν την πτώση των φύλλων και στο στάδιο της πράσινης κορυφής, Για την Βακτηρίωση, Βακτηριακό κάψιμο. Δόση: 150-325 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό. Στις περιοχές που ενδημούν οι ασθένειες συνιστώνται δύο εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων και κατά την διάρκεια του χειμώνα. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ: Ροδακινιά, Νεκταρινιά:** Για Κορύνεο, Εξώασκο, Κλαδοσπορίαση, Δόση:150-235 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό, Στις περιοχές όπου οι ασθένειες ενδημούν, εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών, Για την Φαιά σήψη, Δόση: 150-235 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό, Εφαρμογές κατά τη διόγκωση των οφθαλμών και στη ρόδινη κορυφή, Για το Βακτηριακό έλκος, Δόση: 150-235 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό. Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων. **ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ:** Για το Κορύνεο, Δόση:175-225 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό, Στις περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών, Για την Φαιά σήψη, Δόση: 175-225 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό, Εφαρμογές κατά τη διόγκωση των οφθαλμών και στη ρόδινη κορυφή, **ΚΕΡΑΣΙΑ:** Για το Κορύνεο, Προσβολή από Pseudomonas syringae, Δόση: 175-235 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό, Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουντα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πρίν τη διόγκωση των οφθαλμών. **ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιο & οινοποιήσιμα σταφύλια):** Για Περονόσπορο, Ανθράκνωση, Βακτηριακή νέκρωση, Δόση: 150-175 κ.εκ./ στρ. Εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετάπιπ 10 ημέρες, λίγο πρίν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση, **ΕΛΙΑ:** Για Κυκλοκόνιο, Δόση: 325 κ.εκ./ 100 λίτρα νερο (φθινόπωρο), 150 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό (άνοιξη), Στις περιοχές όπου η ασθένεια ενδημεί, εφαρμογές από αρχές φθινοπώρου μέχρι αρχές άνοιξης, Για Γλοιοσπόριο, Δόση: 325 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό, Δύο εφαρμογές: Η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί καιη δεύτερη 20 ημέρες αργότερα, Για Καρκίνωση, Δόση: 325 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό (φθινόπωρο), 150 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό (άνοιξη), Εφαρμογές μετα το κλάδεμα και μετά από χαλάζι ή παγετό. **ΤΟΜΑΤΑ (υ+θ) - ΠΙΠΕΡΙΑ (υ+θ):** Για περονόσπορο, ΔΟΣΗ: 175-250 κ.εκ./στρ. (βαρειά προσβολή), 100-150 κ.εκ./στρ. (ελαφρά προσβολή), Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρων σπαρόφυτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες, Για Κλαδοσπορίαση, Σεπτορίαση, Ανθράκνωση, ΔΟΣΗ: 175-250 κ.εκ./ στρ. (βαρειά προσβολή) 100-150 κ.εκ./στρ. (ελαφρά προσβολή), Εφαρμογές μετην εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής, Για Βακτηρίωσεις, ΔΟΣΗ: 175-250 κ.εκ./ στρ. (βαρειά προσβολή) 100-150 κ.εκ./στρ. (ελαφρά προσβολή). **Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών φυτών μέχρι την καρποδεση.** **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (υ+θ): Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι:** Για Περονόσπορο, Ανθράκνωση, Κλαδοσπορίαση, Βακτηρίωση, Δόση: 100-150 κεκ./στρ, Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση τη προσβολής, **ΦΑΣΟΛΙ:** Για Κερκοσπορίαση, Δόση: 100-150 κ.εκ./στρ, Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθενειας και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες, Για Βακτηρίωσεις, Δόση:100-150 κ.εκ./ στρ, Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής **ΣΕΛΙΝΟ:** Για Σεπτορίαση, Κερκοσπορίαση, Δόση: 100-150 κ. εκ./στρ. **Εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ.** και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής, **ΑΡΑΧΙΔΑ:** Για Κερκοσπορίαση, Δόση: 150 κ. εκ/στρ, Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής, **ΠΑΤΑΤΑ:** Για Περονόσπορο, Ανθράκνωση, Δόση: 175-250 κ. εκ./στρ, (βαρειά προσβολή) 100-150 κ. εκ./στρ, (ελαφρά προσβολή), Εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ, και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής, **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΛΑ:** Για Κερκοσπορίαση, Δόση: 150 κ. εκ./στρ, Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής,