

270x150 mm

DIQUELL
20 SL

Diquat (Ντικουάτ) 20%

Πυκνό Διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση: Diquat: 20 % β/ο (υπό μορφή diquat dibromide 37,4% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 66,4 % β/β

Αρ. Εγκρ. Κυκλ.: 7968/28.12.2011

**Μη εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο επαφής
(μη διασυστηματικό) για την καταπολέμηση μεγάλου εύρους ζιζανίων,
ιδιαίτερα πλατύφυλλων**

**Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες**



ΤΟΞΙΚΟ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα
Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Περιεχόμενο: 1 Λίτρο

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας & σκευάσματος: Syngenta Ltd, Αγγλία
Εργοστάσιο παρασκευής σκευάσματος: Syngenta Chemicals BV, Βέλγιο

Κάτοχος της έγκρισης - Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομή:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ήεροπύγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
τηλ: 210 55 55 220, 55 59 001-2
Θεσ/νίκη: 53 Ο.Τ., Γ' ΦΑΣΗ ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Σίνδος
τηλ: 2310 79 58 84, Fax: 2310 79 67 41



Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μη εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο επαφής (μ η διασυστηματικό) για την καταπολέμηση μεγάλου εύρους ζιζανίων, ιδιαίτερα πλατύφυλλων. Χρησιμοποιείται και σαν αποφυλλωτικό σε συγκεκριμένες καλλιέργειες με σκοπό να διευκολυνθεί η συγκομιδή.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Πεδίο Εφαρμογής –Στόχοι - Δόσεις (κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα) -Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: **Εσπεριδοειδή** (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ, Λιμετία, Φράπα), **Πυρηνόκαρπα** (Ροδακινιά, Βερυκοκιά, Κερασιά, Βυσσινιά, Δαμασκηινιά), **Μηλοειδή** (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά), **Ακρόδρυα** (Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Καστανιά, Καρυδιά), **Ελιές** (ελαιοποιήσιμες), **Αμπέλι:** Πλατύφυλλα ζιζάνια. 330-500. Διαλύστε 1 λίτρο προϊόν σε 100-200 κιλά καθαρό νερό ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο ψεκαστικό για μια καλή διαβροχή των ζιζανίων σε 2-3 στρέμματα. Με το διάλυμα αυτό, ραντίστε τα αγριόχορτα προσέχοντας να μην βρέχεται το φύλλωμα των δένδρων. **Τριφύλλι, Μηδική:** *Cuscuta sp.* 200-250. Ράντισμα των κηλίδων προσβολής και μιας περιμετρικής ζώνης ασφαλείας. Εάν η προσβολή είναι εκτεταμένη ράντισμα μετά την κοπή. **Πατάτα:** Αποξήρανση στελεχών πριν τη συγκομιδή. 400. Ψεκασμός κατά την περίοδο της συγκομιδής. Βεβαιωθείτε πριν το ψεκασμό ότι το έδαφος γύρω από τους κονδύλους είναι υγρό. Μην ψεκάζετε όταν υπάρχει ξηρασία. **Μηδική για σποροπαραγωγή:** Αποξήρανση στελεχών πριν τη συγκομιδή. 300-350. Ψεκασμός 2-6 ημέρες πριν τη συγκομιδή του σπόρου.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Ήγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 30-50

Παρατηρήσεις: **1.** Η συνιστώμενη δόση είναι ανάλογη του σταδίου ανάπτυξης των ζιζανίων. Η μικρή δόση εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του ζιζανίου ενώ η μεγάλη δόση εφαρμόζεται στα μεγαλύτερα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων. **2.** Η χρήση στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στο αμπέλι πρέπει να γίνεται με κατευθυνό μενο ψεκασμό των ζιζανίων αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα και τα άλλα πράσινα μέρη των δένδρων και του αμπελιού. **3.** Η χρήση για αποξήρανση πριν την συγκομιδή στην μηδική επιτρέπεται μόνο σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαραγωγή. Η εναπομ ένουσα φυτική μάζα (σανός) καθώς και το υπέργειο τμήμα της πατάτας να μην χρησι μοποιούνται για ζωτροφή.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με ψεκαστικό υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση. Ψεκαστικό υγρό 30-50 λίτρα το στρέμμα. Με χειροκίνητο ψεκαστήρα ο όγκος του νερού το λιγότερο 20 λίτρα το στρέμμα. Μπεκ τύπου σκούπας. Η πίεση ψεκασμού μέχρι 1 ατμόσφαιρα..

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μ ηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.

Συνδυαστικότητα: -

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: **Εσπεριδοειδή, Πυρηνόκαρπα, Μηλοειδή, Ακρόδρυα, Ελιές** (ελαιοποιήσιμες), **Αμπέλι:** 30 ημέρες. **Πατάτα:** 10 ημέρες. **Τριφύλλι, Μηδική, Μηδική για σποροπαραγωγή: -**

Ημερ/νία Παρασκευής: : Αναγράφονται στο άνω μέρος της φιάλης
Αρ. Παρτίδας



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: ● Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές. ● Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. ● Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). "Για την εφαρμογή με τρακτέρ: Φοράτε ολόσωμη φόρμα, κατάλληλα γάντια και μπότες". "Για την εφαρμογή με ψεκαστήρα πλάτης: Φοράτε προστατευτική μάσκα, ολόσωμη φόρμα, κατάλληλα γάντια και μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση και ψεκασμό". "Στην περίπτωση εισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, ο εργάτης πρέπει να φοράει κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια". ● Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Προκαλέσετε εμετό και μεταφέρετε τον παθόντα αμέσως σε πλησιέστερο νοσοκομείο. Μη χορηγίσετε τίποτα και μη προκαλέσετε εμετό στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

**«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»
ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ**

**Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν
αψέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν αψέκαστη
ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη.
Η είσοδος του εργάτη στον αγρό συνιστάται να γίνεται 24 ώρες μετά
την εφαρμογή. 10 μέρες για είσοδο ζώων.**

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας .
Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως.

L163416 GREC/1Q