

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται μακριά από παιδιά κατά τη διακίνησή. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Αποφύγετε την επαφή με το μάτι. Σε περίπτωση επαφής με το μάτι πλύνετε το μάτι με καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ενδύματα, γάντια και οικιακή προστασία, μεταμπαρμπαρούσι. Φοράτε κατάλληλες μπότες. Οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες εφόσον εργάζονται στα στάδια εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. Αποφύγετε την ελευθέρωση του στα περιβάλλον, αναμειγνύεται σε υφιστάμενα/διατετακμένα ασφαλείας. ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Φοράτε **βοήθημα** **Αντίθετο** Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα που φοράτε και πλύνετε καλά το προσβεβλημένο μέρος με άφθονο νερό. Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα που πλύνουν από το σώμα με σαπούνι με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με το μάτι: Ξεπλύνετε το μάτι με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Χρησιμοποιήστε επανομιμωμένο ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα που πλύνουν από το σώμα με σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα που πλύνουν από το σώμα με σαπούνι. Διατηρείται τον δισκίο και το δοχείο. Αποθηκεύστε προληπτικά σε ψυγείο. **Αντίθετο** Δεν υπάρχει άσφαλτο αντίθετο. Εφαρμόστε σύμφωνα με τις οδηγίες. Η χρήση εργαλείων και άλλων δεν ενδοκινά.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΗΤΗΡΕΩΝ: 210 7793 777

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αεικωνιστική ζώνη προστασίας **6 μέτρων** από τα επιφανειακά υδάτινα. Για να προστατέψετε τα ψάρια μη σπέρσετε, να αφήσετε μια αεικωνιστική ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από την μη γεωργική γη.

Για να αποφύγετε ενδυνάμυνση για την ανδρική υγεία και το περιβάλλον, αποκομίζετε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος εφαρμογής: Ο ορισμός των ψεκασμών του φυλλομίσματος των ζιζανίων με 20 - 40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έλθουν σε επαφή με τα στεγνά του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα τους τριφυλλούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγή των δυσχερειών υποκατάστατων στους καρπούς. Για την εφαρμογή στον καπνό εφαρμόζεται με 30 - 40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με ψεκασμό καλύμματος της φύλλων. Χρησιμοποιείται μικτή λύση σκόνης και υγρού με πύση μερικής από 2 σπινθηροειδείς (50 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση και προσθέτουμε αναλόγως την αναμετρημένη δόση του σκευασμένου. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδύοντας συνεχώς. Να μην χρησιμοποιείτε σκεύη ή σκεύη νερού για τη δόση του φυλλομίσματος.

Μείγματος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Εσπεριδοειδή, Αμυγδαλάς, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αμύγδαλα, Ελιάς - Για το επίσημο ζώο και για κτήνη. 2. Για τα ποικύλια ζώα. 1. Για τα βοοειδή. 1. Για τον καπνό. 2. Για αγρούς μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την καλλιέργεια του εδάφους για σπορά. 1. Για ακαλλιέργειες εκτός. Για επίσημο ζώο. 2. Για ποικύλια ζώα (υδροειδείς, θάλασσας βότα). 1. Κατά μήκος των οδών και των στεγνών και στεγνών καναλιών. 1.

Τελειώνει επιμέλεια πριν τη συγκομιδή. 7 ημέρες

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΕΚΑΤΗΡΙΑ: Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορριπτόμενο και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με το αναγραφόμενο στην ετικέτα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλύνονται από πίσω με καθαρό νερό, νερό ή νερό τρεχούμενο (το νερό του ξεπλύνματος, τα ροχνιστά στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καθαριστούν προηγουμένως με τριτογενή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή ανακύκλωση σκευασμάτων.

ΣΥΝΗΘΕΣ ΑΠΟΧΩΡΙΣΗ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τοποθετημένο στον αποθηκευτικό, στην αρχική εφαρμογή σκευασμένου σε χώρο όπου διαρκώς και καλά αερισμένο.

Ημερίδα Παρασκευής: - Αναγράφεται στο άνω μέρος της φιάλης

Αρ. Παρτίδας: -

IPIGLYCE

(ΙΠΙΓΚΛΑΪΣ) **36 SL**

GLYPHOSATE (ΓΛΥΦΟΣΕΪΤ) 36% ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ SL

Εγγυημένη σύνθεση: GLYPHOSATE οξύ 36% β/ο (υπό μορφή αλάτος ισοπροπυλαμίνης 48,6%), βοηθητικές ουσίες 57% β/β

Αρ. Εγκρ. κυκλοφ. 7477/3.7.95

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστικών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάχνης του καπνού.

Απορροφώται από τα φύλλα και τους τριφυλλούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ενύμιο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.




ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ



Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 250 κ.εκ.

Κάτοχος της ετικέτας - Υποψήφιος για την τελική συσκευασία και σήμανση: NOVAFITO S.p.A., Ιταλία

Παρασκευαστής - Εργαστήριο παρασκευής: Monanto Europe SA, Βέλγιο



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΛΑΔΙΡΕΤ

Εργαστάσιο συσκευασίας:

ΕΛΛΑΔΙΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θεση: Επαρτία, 19600 Μάνδρα Αττικής

Τηλ: 210 55 55 220, 55 59 001-2

Θεολογική: 53 Ο.Τ., 7^ο ΦΑΞΗ ΒΙΛΠΕ.Θ. - Σίνδος

τηλ: 2310 79 58 84, Fax: 2310 79 67 41

Φόρμα δράσης (Πεδίο εφαρμογής - Στόχοι - Δόσεις (κ.εκ.σ.κ.σ.τ.ρ.) - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής): • **Εσπεριδοειδή** (Πορτοκάλια - Μανταρίνια - Λιμόνια - Κιότι φρούτ - Κίτρινα) - **Αμυγδαλιά** - **Μηλοειδή** (Μήλα - Αχλάδια) - **Πυρηνόκαρπα** (Βερμύδια - Νεκταρίνια - Ροδάκνια - Κιρσάδα) - **Αμύγδαλα** (Εσπεριδοειδή - Αμυγδαλιές) - **Ελιάς** α) **Επίσημο ζώο** (1) (αγρωστική και πλατύφυλλο) 150-200. Εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ωριμότητας τους ανάπτυξης. Μολόχα, Τσουκνίδα, Αντράκλα - 400 - 600. Εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ωριμότητας τους ανάπτυξης. β) **Ποικύλια ζώα** (**) Αγρόδια 700 - 1000, βάλανους 500, Φύκη 500, Πικροκάρδα 1000, Κίρσο 1000. Εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. Κίρσο: 1^ο εφαρμογή κατά την άνθηση με 600 κ.εκ.σ.τ.ρ. 2^ο εφαρμογή σε περίπτωση αναδυστροφίας με 500 κ.εκ.σ.τ.ρ. • **Βοοειδή** (**) α) **Επίσημο ζώο** (1) (αγρωστική και πλατύφυλλο) 150-200. Εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό μεταξύ των γραμμών πριν την άνθηση της ανάπτυξης. • **Καπνός** - Οροβάχνη. Ψεκασμοί καλύμματος: α) 40 κ.εκ.σ.τ.ρ. 40 ημέρες μετά τη μεταφύτευση. β) 60 κ.εκ.σ.τ.ρ. 60 ημέρες μετά την μεταφύτευση. • **Αγρούς μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την καλλιέργεια του εδάφους για σπορά:** α) **Επίσημο ζώο** (1) (αγρωστική και πλατύφυλλο) 150 - 200. Εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ωριμότητας τους ανάπτυξης. Μολόχα, Τσουκνίδα, Αντράκλα - 400 - 600. Εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ωριμότητας τους ανάπτυξης. β) **Ποικύλια ζώα** (**) (ως ανωτέρω, π.χ. όπως στα εσπεριδοειδή) 500-1000 (ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου ως ανωτέρω, όπως π.χ. στα εσπεριδοειδή). Εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. γ) **Ευκαλύπτες θάλασσα** 500 - 1000. Εφαρμογή όταν βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη. • **Κατά μήκος οδών και στεγνών καναλιών:** **Υδροχαρά ζώα** 800 - 1000. Εφαρμογή κοντά ή κατά την άνθηση των ζιζανίων.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρον): Για όλες τις καλλιέργειες: (επάνω του καπνού) 20 - 40. Για τον καπνό: 30 - 40. (1) Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνθήκες για με δύο εφαρμογές (επάνω - ανωτά) ή και (κατωτά - φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ωριμότητας τους ανάπτυξης. (**) Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτούνται συνθήκες για εφαρμογή, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. (**) Στο βοσκότομο ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της ανάπτυξης της καλλιέργειας. Τα στεγνά του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στελέχη και τα φύλλα των φυτών. Προτείνεται η χρήση προστατευτικών καλύμματος (καλντρίνι) γύρω από τα φυτά.

Παρατηρήσεις: 1.Στα δένδρεια καλλιέργειες και στα αμπέλια ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των στεγνών του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλα, τριφυλλούς βλαστούς, πορτοκάλια και μη επωαυμένους πηγές κλεισμάτων. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους σπινθηροειδείς ή αμπελινούς από το τρίτο (3^ο) έτος από την φύτευση τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. 2. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια μολόχα, τσουκνίδα, πολυκαυλή, καπνός, αντράκλα ή δομή κινούνται από 400 - 600 κ.εκ.σ.τ.ρ. ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους. 3. Για την αγρόδια, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει υψός 15 - 30 εκατ. 4. Για την φύκη η εφαρμογή να γίνεται μετά το δόνημα της κορυφής. 5. Να μην γίνεται ψεκασμός αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες. 6. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που προσορίζονται για απορροφητικότητα. 7. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 8. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που παράγουν υπέρτατο βότανο πριν από τη συγκομιδή τους. 9. Για τις επιπτώσεις, ελέγξτε επιμελώς τη συλλογή τους μόνο από το δένδρο. 10. Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στεγνά του καπνού. **Ειδικές συνθήκες γεωργικής φυτοπροστασίας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκατέστη:** Να εφαρμόζονται ενυδακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητική μέθοδος κ.λπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται ανάλογη δόση ζιζανίων (ζιζανιοκτόνο με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανεπιθύμητων των ζιζανίων στην δραστηριότητα του glyphosate. Σε αρνητικά και στρατηγικά κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθυνόμενος ψεκασμός από πάνω και με τριτογενή στεγνών του ψεκαστικού διαλύματος να μην πόνε στο νερό. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Σε αγρούς μετά τη συγκομιδή και στην καλλιέργεια του εδάφους για σπορά να ακολουθεί διάστημα τουλάχιστον από (7) ημέρων για τα επίσημα ζώα και δεκαπέντε (14) ημέρων για τα ποικύλια ζώα πριν την καλλιέργεια του εδάφους. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτό ξεραθούν.