

270x150 mm

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ : • Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Μην αναπνέετε ατμούς ή σταγονίδια. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή ετικέτα. • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ : Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Εάν υπάρχει δυσκολία στη αναπνοή, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε με άφθονο νερό & σαπούνι. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης : πλύνετε το στόμα με άφθονο νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Ποτέ μη χορηγείτε από το στόμα τίποτε σε αναισθητό άτομο.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ : Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 77 93 777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί : Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους, προστατευόμενα από το κρύο. Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. Μη ψεκάζετε όταν φυσάει και αντίθετα με τη φορά του ανέμου. Ψεκάστε με πίεση ως 3 Atm (40 - 50 psi). Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας. Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται. Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με διάλυμα 50 ml Agral ανά 100/l νερού.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν : Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας και εφόσον πρόκειται να ακολουθήσει καλλιέργεια δημητριακών, είναι αναγκαία μία περίοδος αναμονής 3 μηνών πριν τη σπορά.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Βαμβάκι 120, Ζαχαρότευτλα : 110, Πατάτα : 60, Τομάτα : 30

SELAS

Clethodim (Κλεθοντίμ)

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

24 EC

Εγγυημένη Σύνθεση : clethodim 24 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 72.9 % β/β

**Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο
με διασυστηματική δράση
σε αγρωστώδη ζιζάνια.**

Αρ. Εγκρ. Κυκλοφορίας : 7825/30.05.07
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

Χι



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

• Ερεθίζει τα μάτια.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : 1 ΛΙΤΡΟ

Κάτοχος της έγκρισης : Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.
Παρασκευαστής : Arysta Lifescience North America LLC
Εργοστάσιο παρασκευής : ARYSTA LIFESCIENCE SAS



Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση -
Εργοστάσιο συσκευασίας :

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ. 210 5555 220, 210 5559 001-2
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ' Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ.-Σίνδος
Τηλ. 2310 795 884, Fax: 2310 796 741

Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:

Το SELAS είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με διασυστηματική δράση σε αγρωστώδη ζιζάνια. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (παρεμποδιστής του ενζύμου καρβοξυλάση του ακετυλοσυνενζύμου Α).

Τρόπος εφαρμογής : Μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση έως 3 Atm με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού / με μπεκ σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού : Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινείστε καλά τη φιάλη συσκευασίας και προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας συγχρόνως για 2 - 3 λεπτά, προσθέστε το λάδι και απογεμίστε το δοχείο με συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ : Πεδίο Εφαρμογής - Στόχοι - Δόσεις (σε κ. εκ. σκευάσματος /στρέμμα) : Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Πατάτα, Τομάτα : Αλεπονουρά, Αγριοβρώμη, Μουχρίτσα, Σετάριας : 75-100 + 0,5% λάδι *. Ψεκασμός όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των 2-3 φύλλων μέχρι αδελφώματος. Βέλιουρας: 100-125 + 0,5% λάδι *. Ψεκασμός στο στάδιο των 20-30 εκ. Αγριάδα: 125-150 + 0,5% λάδι *. Ψεκασμός στο στάδιο των 20 - 30 εκ.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα / στρέμμα) : 20 - 40.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : *Να χρησιμοποιείται ένα μη φυτοτοξικό παραφινικό ορυκτέλαιο.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναφέρονται στην ετικέτα, το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ : Δεν συνιστάται ο συνδυασμός του με άλλα σκευάσματα, με εξαίρεση την προσθήκη λαδιού που πρέπει πάντα να γίνεται.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας : Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος να ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από την άμεση έκθεση του στο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.



ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε άνω μέρος φιάλης