

Προφυλάξτε για το χρήστη και τη δημόσια υγεία: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να μην προκληθεί έμετος. Μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε ασθενή που έχει χάσει τις αισθήσεις του. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΑΠΟΦΥΓΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) εφελκύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 400 κ.εκ.

DOURO 10 EC

**ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (EC)
Penconazole (πενκοναζόλ) 10%**

Εγγυημένη σύνθεση: Penconazole 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 89,7% β/β

**ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Χη



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

**ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΕΜΒΡΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ.**

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 60.232/23-12-08

**Κάτοχος της έγκρισης – Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και
σήμανση: SAPEC AGRO SA - Πορτογαλία**

Υπεύθυνος Επικοινωνίας - Διανομέας:



ELTON

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ), Τ.Κ. 190 11
Αυλώνας Αττικής, Τηλ.: 22950 29350, Φαξ: 22950 29305

Καλλιέργειες – Ασθένειες – Δόσεις (ανά 100 λίτρα ψεκ. υγρού) - Χρόνος εφαρμογής: **Βερικοκία:** Δόση 35-50 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 150-250 λίτρα/στρ. Για **Οίδιο** εφαρμογή στην πτώση των πετάλων, στην απόσπαση του κάλυκα και 20 ημέρες αργότερα. **Ροδακινιά:** Δόση 35-50 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 150-250 λίτρα/στρ. Για **Οίδιο** εφαρμογή στην πτώση των πετάλων, στην απόσπαση του κάλυκα και 20 ημέρες αργότερα. **Αμύγλι:** Δόση 25-40 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-150 λίτρα/στρ. Για **Οίδιο**, εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων και εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, ψεκασμοί όταν οι βλαστοί αποκτήσουν 2-3 φύλλα και κατά την άνθηση. Οι ψεκασμοί μπορούν να συνεχιστούν ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες. **Κολοκυνθοειδή (Πεπόνι, Καρπούζι):** Δόση 25-35 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ. Για **Οίδιο** εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες. Η μικρή δόση συνιστάται για ψεκασμούς κάθε 7-14 ημέρες και η μεγάλη κάθε 10-16 ημέρες. **Καπνός:** Δόση 35-50 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-150 λίτρα/στρ. Για **Οίδιο** 2-3 ψεκασμοί σε όλα τα στάδια με μεσοδιαστήματα 14 ημέρες. **Καλλωπιστικά υπαίθρου:** Δόση 35-50 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ. Για **Οίδιο** μέχρι 5 ψεκασμοί ανάλογα με την ένταση της προσβολής και μεσοδιαστήματα 14 ημέρες. **Παρατηρήσεις:** Η μικρή δόση να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις χαμηλής πίεσης προσβολής. Στο αμπέλι η εφαρμογή του πρέπει απαραίτητα να εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα επαφής και οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις δύο (2) ανά καλλιεργητική περίοδο.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Βερικοκία, Ροδακινιά, Κολοκυνθοειδή (Πεπόνι, Καρπούζι), Καπνός: 3. Αμύγλι: 2. Καλλωπιστικά υπαίθρου: 5.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Ουτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσεως.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Βερικοκία, Ροδακινιά, Καπνός: 21 ημέρες. Αμύγλι: 35 ημέρες. Πεπόνι, Καρπούζι: 3 ημέρες.