

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου, Δρά στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na⁺ στους νευρικούς των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης ασκεί αντιτροφική δράση, **ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:**

Πεδίο Εφαρμογής – Εχθροί - Δόσεις (κ.εκ. σκευάσματος/100λιτ ψεκ υγρού) - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: **Αμπέλι:** Ευδεμίδα, Κοχλίδια, 30-60. Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. **Φυλλώδη λαχανικά:** Μαρούλι (υπαίθρου, θερμοκηπίου), Πράσινο σκουλήκι, Πράσινη αρίδα, 37,5-50. Με την εμφάνιση της προσβολής. **Σολανώδη:** (Τομάτα,Μελιτζάνα) υπαίθρου, θερμοκηπίου, Πράσινο σκουλήκι, Πράσινη αρίδα, 30-60. Με την εμφάνιση της προσβολής. **Σταυρανθή** (Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο) υπαίθρου: Πράσινη αρίδα, 30. Με την εμφάνιση της προσβολής.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: **Αμπέλι:** μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Φυλλώδη λαχανικά, Σολανώδη:** 1 εφαρμογή. **Σταυρανθή:** μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): **Αμπέλι, Σολανώδη:** 50-100. **Φυλλώδη λαχανικά:** 60-80. **Σταυρανθή:** 100.

Παρατήρηση: Οι μακρές δόσεις σκευάσματος ανά 100λίτρο χρησιμοποιούνται με τους μεγάλους όγκους ψεκαστικού διαλύματος και οι μεγάλες δόσεις σκευάσματος ανά 100λίτρο με τους μικρούς όγκους ψεκαστικού διαλύματος, έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα (30 κ. εκ.). **Τρόπος εφαρμογής:** Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμό φυλλώματος εξασφαλίζοντας πολύ καλή και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό κατά 3/4 και προσθέτουμε αναδύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Συνδυαστικότητα: - Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** • Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. • Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητες, με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς και με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για τα ωφέλιμα αρθρόποδα. • Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. • Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με REBEL 10 EC. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τα πυρεθρινοειδή. • Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: **Αμπέλι** (επιτραπέζιο, ονοποίηση), Μαρούλι (Υ/Θ), Τομάτα (Υ), Μελιτζάνα (Υ), Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο, 7 ημέρες, Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ): 3 ημέρες

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ : **ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ :** **Βλέπε άνω μέρος φιάλης**



REBEL

10 EC

**Cypermethrin (συπερμεθρίν) 10%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)**

Εγγυημένη σύνθεση: cypermethrin: 10 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 88,4 % β/β

Αρ. Εγκρ. Κυκλ.: 14378/ 28.12.2011

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Χη



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Ερεθίζει το δέρμα.

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμολογικών βλαβών.

Η έκπνοη στήνων μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνευμονικές σε περίπτωση κατάποσης.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Μπορεί να προκαλέσει μικροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 400 κ.εκ.

Κάτοχος της έγκρισης: CMPA SAS, Γαλλία

Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομή:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Σηρομήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
τηλ: 210 55 55 220, 55 59 001-2
Φακίννη 63 0.7, F' ΦΑΣΗ BUTELB. - Σίνδος
τηλ: 2310 79 58 84, Fax: 2310 79 67 41

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Φοράτε κατάλληλες μπότες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. "Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό". Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Πρώτες Βοήθειες- Αντίδοτο:

Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε ελαφριάς ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αραιώστε τα εμπλεκόμενα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό να αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Να μη δώσετε υγρό και να μην προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. **Πληροφορίες για το γιατρό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΗΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 - 7793777

«Για να αποφευχθεί κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μισή αμέσως ζώνη προστασίας **30 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλέργειες του αμπελιού, και των κηπευτικών των οποίων η ανάπτυξη υπερβαίνει τα **50 cm** και **10 μέτρων** για τα κηπευτικά των οποίων η ανάπτυξη είναι μικρότερη των **50 cm**. Για να προστατέψετε μη σχετιζόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μισή αμέσως ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τη μη γεωργική γη για τις καλλέργειες του αμπελιού και των κηπευτικών των οποίων η ανάπτυξη υπερβαίνει τα **50 cm**.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικίνδυνος μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται μετά την ώρα συλλογής των μελισσών (αργά το απόγευμα). Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για 1 ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρυπήμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφονται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. **Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως.