

VIVIO® 50 WP

Phosmet (Φοσμέτ)

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση: phosmet 50% β/β

Βοηθητικές ουσίες 47,37% β/β

Xn



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ.Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, Τηλ.:210-6860130,
www.basf-agro.gr.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: SBM Formulation, Γαλλία.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.,
Σίνδος, Θεσσαλονίκη.

® Σήμα κατατεθέν της BASF

Μη διασυστηματικό
οργανοφωσφορικό
εντομοκτόνο επαφής
και στομάχου.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ,
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 1830/22-9-1999

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 700 γραμ.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε, όταν το χρησιμοποιείτε.
- Μην αναπνέετε τη σκόνη.
- Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
- Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
- Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.
- Αναφερθείτε στις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί και ξεπλύνετε τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος. Διενεργείστε πλύσιμο στομάχου. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Αντενδείκνυται η χρήση βαρβιτουρικών, μορφίνης, φαινοθειαζίνης, ηρεμιστικών, καφεΐνης και άλλων διεγερτικών του νευρικού συστήματος. Μη χρησιμοποιείτε γάλα, λίπη και αλκοόλ.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Θεϊκή Ατροπίνη και 2-PAM, με επίβλεψη γιατρού.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 - 7793777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ.
Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τ'ανθισμένα ζιζάνια.

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.
Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ. Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή τουλάχιστον για 14 ημέρες μετά την εφαρμογή του ψεκασμού.

VIVIO® 50 WP

Phosmet (Φοσμέτ)

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση: phosmet 50% β/β

Βοηθητικές ουσίες 47,37% β/β

Xn



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ.Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, Τηλ.:210-6860130,
www.basf-agro.gr.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: SBM Formulation, Γαλλία.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.,
Σίνδος, Θεσσαλονίκη.

® Σήμα κατατεθέν της BASF

Μη διασυστηματικό
οργανοφωσφορικό
εντομοκτόνο επαφής
και στομάχου.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ,
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 1830/22-9-1999

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 700 γραμ.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (γρ. στα 100 λίτρα ψεκ. υγρού): Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμούς αλύφειας φυλλώματος με ψεκαστήρες κοινού όγκου και μπεκ τύπου κώνου. Σκότιμο είναι ο ψεκασμός να γίνεται με συνεχή ανάδευση του φαρμάκου.

1. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (ΓΚΡΕΪΠ-ΦΡΟΥΤ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΠΟΡ-ΤΟΚΑΛΙΑ): *Μυίγα Μεσογείου*. Δόση: 120. *Κόκκινη ψώρα, Ψευδο-κοκκος*. Δόση: 140. Εφόσον δεν εφαρμόζεται το πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων, ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφόσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 20-30 ημέρες. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 200-400 λίτρα ανά στρέμμα.

2. ΜΗΛΟΕΙΔΗ (ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ): *Ανάρσια, Καρπόκαφα, Οπλοκάμπη, Φυλλοδέστες, Φυλλορρύκτες, Ψύλλα, Βαμβακάδα, Αιματοψείρα*. Δόση: 120-140. Εφόσον δεν εφαρμόζεται το πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων, ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα ανά στρέμμα.

3. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (ΚΕΡΑΣΙΑ): *Ανάρσια, Καρπόκαφα, Ανθονόμος, Ρυγχίτης*. Δόση: 120. *Βαμβακάδα*. Δόση: 140. Εφόσον δεν εφαρμόζεται το πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων, ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφόσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 20-30 ημέρες. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 150-250 λίτρα ανά στρέμμα.

4. ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: *Σεζάμια, Πυραλίδα*. Δόση: 120. Εφόσον δεν εφαρμόζεται το πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων, ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφόσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 20-30 ημέρες. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα ανά στρέμμα.

5. ΤΕΥΤΛΑ: *Κλεονός*. Δόση: 120. Εφόσον δεν εφαρμόζεται το πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων, ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφόσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 20-30 ημέρες. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-50 λίτρα ανά στρέμμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Για την καταπολέμηση των κοκκοειδών χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με θερινό πετκό.
2. Για την καταπολέμηση των κοκκοειδών στα εσπεριδοειδή επαναλαμβάνεται η εφαρμογή, εάν χρειασθεί ανάλογα με την προσβολή των κοκκοειδών μέχρι τρεις (3) εφαρμογές ανά περίοδο.
3. Να μην επαναχρησιμοποιείται πριν περάσουν 30 ημέρες από την προηγούμενη εφαρμογή.

4. Η δόση των 140γρ. αναφέρεται στην καταπολέμηση των κοκκοειδών.
5. Στα κοκκοειδή εφαρμόζεται όταν έχουμε το μέγιστο των κινητών προνυμφών, που συμπίπτει με το 60-65% της εκκόλαψης των αυγών.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέχρι τη μέση σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέϊπ-φρουτ, Μηλιά, Αχλαδιά, Κερασιά, Αραβόσιτος, Τεύτλα, Τριφύλλι: 28 ημέρες.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιεργείες και τις δόσεις που συστήνεται η εφαρμογή του κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Διατηρούμενο στην αρχική του, κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό και ξηρό, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό νερό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενως σε σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Αριθμός παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερομηνία παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερομηνία λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

