

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ : • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος. • Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. • Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό. • Το υλικό και ο περιέκτης του να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. • Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. • Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. • Μην ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο : Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό σαπουνι. Αν υπάρχει αναπνευστικό πρόβλημα : Ο παθών να μεταφερθεί σε καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί ζητήστε ιατρική βοήθεια. Αντίδοτο : Συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793 777

Για την αποφυγή κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδατίνες επιφάνειες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης (ξύλου) με ψεκαστήρες κοινού όγκου (5-6 atm) ή μηχανοκίνητους (25-30 atm) και μπεκ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού ανακατεύοντας μέχρι να γίνει ομοιογενές γαλάκτωμα και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Σε περίπτωση που πρέπει να προστεθούν άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτό γίνεται αφού πρώτα το γαλάκτωμα του ορυκτελαίου αναδευτεί καλά. Σε περίπτωση που το αναμειγνύμε με βρέξιμη σκόνη, ετοιμάζουμε πρώτα το αραιωμένο γαλάκτωμα ορυκτελαίου και μετά προσθέτουμε την ήδη διαλυμένη σε νερό βρέξιμη σκόνη. Γενικά προσθέτουμε πρώτα τα άλλα φυτοφάρμακα και τελευταίο το LAGOON.

Καθαρισμός ψεκαστήρα : Νερό και απορρυπαντικό.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή : — (εφαρμογή στο στάδιο του λήθαργου). Σε περίπτωση αναμειγνύμε με άλλο σκεύασμα οφείλουμε να τηρούμε τους περιορισμούς που αναγράφονται στην ετικέτα του άλλου σκευάσματος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας : Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (να νερά του ξεπλύνματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος οι φιάλες με τρύπημα και τα καπάκια με σχήσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφονται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης : Διατηρείται στην αρχική του αλληλεπίδραση συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.
ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ :

LAGOON

98,8 EC

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εγγυημένη σύνθεση:

Paraffin oil : 98,8% β/β, CAS No 97862-82-3

Βοηθητικές ουσίες : 1,2% β/β

Αρ. εγκ. κυκλοφορίας : 14167/19.12.06

Χειμερινό λάδι κατά κοκκοειδών, αυγών ακάρεων και διαχειμαζουσων μορφών εντόμων. Συνεργό ζιζανιοκτόνο.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : 500 κ.εκ.



Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας : TOTAL FLUIDES, Γαλλία.

Κάτοχος της έγκρισης -

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση -

Υπεύθυνος για την διανομή στην αγορά -

Παρασκευαστής - Εργοστάσιο παρασκευής / συσκευασίας :



ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Σηροπηγάδο, 19600 Μάνδρα Αττικής

Τηλ. : 210 5555 220, 210 5559 001-2

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ : 53 Ο.Τ. Γ' Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ. -Σινδος

Τηλ.: 2310 795 884, Fax: 2310 796 741

Φάσμα δράσης.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΠΕΛΙ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ : Για χειμερινά αυγά του Κόκκινου τετράνυχου. Δόση: 1000-1500 κ.εκ.σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 λίτρα ψεκ. υγρού/ στρέμμα). Χρόνος εφαρμογής: Τέλος χειμώνα με αρχές άνοιξης, τουλάχιστον 10 ημέρες μετά το κλάδεμα και πριν την έναρξη διόγκωσης των σφαλαίων. **Μηλιά, αχλαδιά :** Για Ψύρα Σαν - Ζοζέ, Παρλατόρια, Βαμβάκαδα, Μυτιλάκορφη ψύρα, Μαύρη ψύρα, Αυγά αφιδών και τετράνυχων Διαχειμαζουσες μορφές εντόμων. Δόση :1500-2000 κ.εκ.σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ.υγρού ή 500 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. (150-250 λίτρα ψεκ. υγρού /στρέμμα). Χρόνος εφαρμογής: Χειμυνιάτικοι ψεκασμοί στο στάδιο του λήθαργου, μέχρι την έναρξη του φουσκώματος των σφαλαίων. **Βερικοκιά, κερασιά, ροδακινιά, νεκταρινιά, δαμασκηνιά :** Για Ψύρα Σαν-Ζοζέ, Παρλατόρια, Βαμβάκαδα, Μυτιλάκορφη ψύρα, Μαύρη ψύρα, Αυγά αφιδών και τετράνυχων Διαχειμαζουσες μορφές εντόμων. Δόση :1500-2000 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 500 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. (150-250 λίτρα ψεκ. υγρού/ στρέμμα). Χρόνος εφαρμογής: Χειμυνιάτικοι ψεκασμοί στο στάδιο του λήθαργου. **ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ :** Για Ψύρα Σαν - Ζοζέ, Παρλατόρια, Βαμβάκαδα, Μυτιλάκορφη ψύρα, Μαύρη ψύρα, Αυγά αφιδών και τετράνυχων Διαχειμαζουσες μορφές εντόμων. Δόση :1500-2000 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 500 κ.εκ.σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. (100-200 λίτρα ψεκ. υγρού /στρέμμα). Χρόνος εφαρμογής: Χειμυνιάτικοι ψεκασμοί στο στάδιο του λήθαργου. **Καλλιπαστικά, Καλλιπαστικοί θάμνοι :** Για Κοκκοειδή : Παρλατόρια, Μυτιλάκορφη ψύρα, Αυγά αφιδών και τετράνυχων Διαχειμαζουσες μορφές εντόμων. Δόση :1500-2000 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 500 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. (80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα). Χρόνος εφαρμογής: Χειμυνιάτικοι ψεκασμοί στο στάδιο του λήθαργου.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδος : 1

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ : ΣΥΝΕΡΓΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ : Δόση: 500 κ.εκ.σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από την καλλιέργεια στην οποία εφαρμόζεται) σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός μεταφωτορρυθμικού ζιζανιοκτόνου. Να ακολουθούνται οι οδηγίες της ετικέτας του ζιζανιοκτόνου, με το οποίο συνδυάζεται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής. Η εφαρμογή να γίνεται όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 4° C και δεν υπάρχει κίνδυνος παγετού. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειοβεστίου. Στα μηλοειδή και ειδικά στο κυρτάλλι να μην προηγηθεί ή έπεται εφαρμογή captan, folpet, δινιπροενωύσεων σε διάστημα τουλάχιστον 1εβδομάδας **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ :** Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες. Να χρησιμοποιούνται οι μικρές δόσεις σε ευαίσθητα στο λάδι φυτά (π.χ. σε μερικά καλλιπαστικά). Να γίνεται δοκιμή σε 1 ή 2 φυτά.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ : Το σκεύασμα συνδυάζεται με όλα τα γνωστά εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα. Δεν συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά σκευάσματα, θείο, Captan.