

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Αποφύγετε αέσιους τα ρούχα που έχουν λερωθεί με το σκεύασμα. Πλύνετε τα πριν τα αναφορέσετε. • Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος. • Αποφύγετε επαφή με τα μάτια και το δέρμα. • Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακλόνητα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΠΕΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση απυλματος ή αν αισθανθείτε οξεία δερματικά καύματα αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία. **Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:** 210 7793777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιεργείες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζώα πριν την ανθοφορία τους. Βλαβερό για τα πουλιά.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλλιεργειών ή ριζοτόπιασμα. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Δεν χρειάζεται προδιάλυση. Ρίχνουμε το σκεύασμα κατ' ευθείαν στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά και προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Νερό και απορρυπαντικό. **Φυτοπροστασία:** Δεν είναι φυτοπροστατικό στις συνιστάμενες καλλιεργείες και δόσεις εφαρμογής στις Ελληνικές εδαφολογικές συνθήκες, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

Συνδυαστικότητα: –

Τελευταία επεξεργασία πριν τη συγκομιδή: Εσπεριδοειδή: 21 ημέρες. Αγγούρια, Τυμάτια (υπαίθρου, θερμοκηπίου), Αγγούρια (υπαίθρου, θερμοκηπίου), Καπνός 7 ημέρες, Βαμβάκι 28 ημέρες, Ροδάκινα, Πατάτα 14 ημέρες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (το νερό του ξεπλύματος ρίχνεται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος οι φιάλες με τρύπημα και τα κουτιά με σχίσμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφονται όλα σε σημείο συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Διατηρείται στην αρχική του απαράβατη συσκευασία, καλά κλειστά, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, χωρίς να εκτίθεται απ' ευθείας στο φως. Ημερομηνία λήξης: Δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ :
ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ : Βλέπε άνω μέρος φιάλης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ :



COURAZE

200 SL

ΥΓΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)
Imidacloprid (Ιμιντακλοπρίν)

Εγγυημένη σύνθεση: Imidacloprid 20 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 82,34 % β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 14273/17.06.08

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ
ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 250 κ.εκ.

Κάτοχος της άδειας - Παρασκευαστής:
CHEMINOVA AGRO S.A., Ισπανία 

Εργοστάσιο συσκευασίας - Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανομή:



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Θέση Σηροπήγιοδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
τηλ.: 210 55 55 220, 55 59 001-2
Θεσσαλονίκη: 53 0.Τ., Γ' ΦΑΣΗ Β.Π.Π.Θ.
- Σίνδος, τηλ.: 2310 79 58 84.
Fax: 2310 79 67 41



 **CHEMINOVA**

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Πορτοκάλι, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρούτ: Εριώδης αλευριάδη: 75 κ.εκ. σκευάσµ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασμός φυλλώματος, Εφαρμόζεται στο χρονικό διάστημα Απριλίου - Σεπτεμβρίου με την εμφάνιση των νυμφών του εντόμου (στάδια L1 και L2), φυλλοκνίστης: 50-75* κ.εκ. σκευάσµ./100 λίτρα ψεκυγρό, Ψεκασμός φυλλώματος, με την έναρξη της προσβολής, ΑΧΛΑΔΙΑ: Ψύλλα αγγουιάς: 60 κ.εκ. σκευάσµ./100 λίτρα ψεκυγρό.Με την έναρξη της προσβολής, Μπορεί να εφαρμοστεί στις εβής περιόδους: Προσθικά μέχρι το στάδιο έναρξης της λευκής κορυφής και μετά την καρπόδεση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ: Αφίδες: 25-30* κ.εκ. σκευάσµ./100 λίτρα ψεκυγρό. Με την έναρξη της προσβολής, Μπορεί να εφαρμοστεί στις εβής περιόδους: Προσθικά μέχρι το στάδιο έναρξης της ροδίνης κορυφής και μετά την καρπόδεση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος, ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: Αφίδες, Αλευριάδη: 50 κ.εκ. σκευάσµ./100 λίτρα ψεκυγρό. Ψεκασμός φυλλώματος, με την έναρξη της προσβολής, ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: Αλευριάδη: 75-125* κ.εκ. σκευάσµ./ στρέμμα. Ριζοτόπιασμα, με το νερό της άρδευσης, με την έναρξη της προσβολής, ΑΓΓΟΥΡΑ (θερμοκηπίου και υπαίθρου): Αλευριάδη: 75-125* κ.εκ. σκευάσµ./ στρέμμα. Ριζοτόπιασμα, με το νερό της άρδευσης, με την έναρξη της προσβολής, ΒΑΜΒΑΚΙ: Αφίδες: 62,5-100 κ.εκ. σκευάσµ./100 λίτρα ψεκυγρό, Ψεκασμός φυλλώματος, με την έναρξη της προσβολής, ΠΑΤΑΤΑ: Αφίδες, Δορυφόρος: 50-100 κ.εκ. σκευάσµ./100 λίτρα ψεκυγρό. Με την έναρξη της προσβολής και μέχρι 4 αφίδες ανά φύλλο. Να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει μελίττωμα. ΚΑΠΝΟΣ: Αφίδες: α) 25-60 κ.εκ. σκευάσµ./100 λίτρα ψεκυγρό, για ψεκασμό φυλλώματος, με την έναρξη της προσβολής, β) 50-100* κ.εκ. σκευάσµ./στρέμμα για ριζοτόπιασμα, κατά την μεταφύτευση (1 εφαρμογή).

* το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.
Παρατηρήσεις: (1) Στα εσπεριδοειδή σε προγράμματα «ολοκληρωμένης αντιμετώπισης» συνιστάται να εφαρμόζεται, όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός σκιάων του παράσιτου *Cales noacki* ωριμών για ωσκότα, (2) Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής (μικτός πληθυσμός, παρουσία μελιτωμάτων) ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο, (3) Στα εσπεριδοειδή για την καταστέλληση του Φυλλοκνίστη (*Phylloxera citrella*) η μικρή δόση συνιστάται για μικρή πίεση προσβολής ενώ η μεγάλη δόση για μεγάλη πίεση προσβολής, (4) Στις περιπτώσεις εφαρμογής με ριζοτόπιασμα, το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την πυκνότητα των φυτών, (5) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας, (6) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθησης, (7) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίττωμα (π.χ. περισσότερο από 4 αφίδες ανά φύλλο).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ (μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες): Εσπεριδοειδή: 2/20-400, Αγγούρια: 1, Ροδάκινα: 2/28, Τυμάτια (υπαίθρου-θερμοκηπίου), Αγγούρια (υπαίθρου-θερμοκηπίου), Βαμβάκι, Πατάτα: 2/14, Καπνός: 2/20-30 (ψεκασμοί φυλλώματος), 1 (εφαρμογή με ριζοτόπιασμα κατά την μεταφύτευση).