

MAZOLAN 80 WP

MAZOLAN 80 WP

MANCOZEB (MANKOZEMΠ) 80% ΒΡΕΞΙΜΗ ΣΚΟΝΗ (WP)
Εγγυημένη σύνθεση: mancozeb 80% β/β, Βοηθητικές ουσίες 13,2% β/β

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

Φυλάξτε το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα
- Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Αρ. έγκρ. Κυκλοφορίας: 60281/ 29.07.10

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ



Παρασκευαστής: Indofil Industries Ltd, Ινδία
Κάτοχος της έγκρισης – Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση – Υπεύθυνος για την διάθεση στην Ελληνική αγορά - Διανομή:
ΕΠΙΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
Θέση Επιρροήγυδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5556220, 210 5559001-2
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ Φάση ΒΙ.Π.Ε.Θ-Σίνδος
Τηλ.: 2310 795884, Fax: 796741



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Σε περίπτωση κατάστασης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείό ή την ετικέτα. • Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την αναμειγνύση και κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή. • Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. • Κατά την εφαρμογή σε επικίνδυνα συντάτα ή χρήση τροφίμων «Μακριά κούρση». • Απορρίψτε τη συσκευασία του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες (δελτίο δεδομένων ασφαλείας). • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απόσταση (ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλέργειες των λαχανικών και την καλλιέργεια της πατάτας, 10 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού και 30 μέτρα για τις δενδροειδείς καλλιέργειες).
Πρώτες βοήθειες - Ανάδραση:
Γενικά: Μη χρησιμοποιείτε νερό και μην προκαλείτε εμετό εάν ο ασθενής δεν διατηρεί τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε το ρυτίσματος με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά το προσβεβλημένο μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Πλύνετε το μαρμαίνο ρούχο των τα ξεναπορίστε. Εάν ο κρούσμος παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Επιδύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξεπλύμα για αρκετά λεπτά ακόμα. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέστε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε γιατρό.
Για το γιατρό: Φροντίδα υποστηρικτική. Ταυτόχρονη έδραση στο ανώτερο αναπνευστικό θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί το mancozeb έχει δράση διαυλωματική.
Μην υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Αναλογισθείτε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΗΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 210-7793777

«Για να απορρίψετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΤΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Κατηγορία και τρόπος δράσης:Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση κατά διαφόρων μικροβιολογικών ασθενειών του Mancozeb δρα εμποδίζοντας την κυτταρική μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλαπλά σημεία. Διεθείτε δε ευρύ φάσμα δράσης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Να μην χρησιμοποιείται στις ποικιλίες της αγκυλιάς Κρωτάλλι Κόσια και Βουτυράτα. Μπορεί να προκαλέσει σκουριαχωση σε μηλιές ποικιλίας "Golden Delicious".

Συνδυαστικότητα: Στα μηλοειδή το MAZOLAN μπορεί να συνδυαστεί με τα σκευάσματα Indar 5 EW και Systane 6 SC.

Καθορισμός ψεκαστήρα: Αδειάζετε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Ξεπλύνετε τα μηχανήματα εξωτερικά με νερό. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου του ψεκαστικού με καθαρό νερό συμπεριλαμβανομένων των αναμίσεων χρησιμοποιώντας για τα σκοπιά αυτά τα ένα τρίτο του όγκου του ψεκαστικού δοχείου. Γεμίζετε το ψεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό κατά το ήμισυ, αναδεύετε και αδειάζετε τελείως. Επαναλάβετε την διαδικασία.
Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού κατά το ήμισυ με νερό, προσθέστε καθαριστικό με βάση την αμυνία (συνέκτριση 0,03 %) αναδεύετε για 2 λεπτά και γεμίζετε το ψεκαστικό με καθαρό νερό. Αφήστε το για 15 λεπτά χωρίς ανάδραση και κατόπιν αδειάζετε το δοχείο με πίεση μέσω από σωλήνα/σέρας και βραχίονας. Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Φύλλα και μερίσματα αφαιρούνται και καθαρίζονται ξεχωριστά με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Καύση σε εγκατεμένες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις, βάση της κείμενης νομοθεσίας.Τα κενά υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν πραγματοποιώντας με σκόνη, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ανατίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα - Συνθήκες αποθήκευσης: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε ξηρό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο προστατευμένο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:



MAZOLAN 80 WP

MANCOZEB (MANKOZEMΠ) 80% ΒΡΕΞΙΜΗ ΣΚΟΝΗ (WP)
Εγγυημένη σύνθεση: mancozeb 80% β/β, Βοηθητικές ουσίες 13,2% β/β

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

Φυλάξτε το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα
- Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Αρ. έγκρ. Κυκλοφορίας: 60281/ 29.07.10

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ



Παρασκευαστής: Indofil Industries Ltd, Ινδία
Κάτοχος της έγκρισης – Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση – Υπεύθυνος για την διάθεση στην Ελληνική αγορά - Διανομή:

ΕΠΙΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
Θέση Επιρροήγυδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5556220, 210 5559001-2
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ Φάση ΒΙ.Π.Ε.Θ-Σίνδος
Τηλ.: 2310 795884, Fax: 796741



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΔΟΣΕΙΣ (γρ./μ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού) - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μηλιά, Αγκυλιά: Φουζυλάδα, 150-200. Εφαρμογές από το στάδιο της πρόσφατης κορυμής και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων. Μεσοδόκιμα εφαρμογών 7-10 ημέρες σε εναλλαγή με άλλα μυκητοκτόνα. Το μεγαλύτερο μεσοδόκιμα αφορά στο συνδυασμό του MAZOLAN με σκευάσματα που περιέχουν ηντοκυβανη ή fenbuconazole ενώ το μικρότερο στις απλές εφαρμογές. Μεταξύ διαδοχικών εφαρμογών του MAZOLAN πρέπει να μεσολαβεί μεσοδόκιμα 14 ημερών. **Αμπελί (επιτραπέζιες και οινολογικές ποικιλίες):** Περονόσπορος, 200. Ψεκασμοί φυλλώματος. **Καρύσι:** Αλτερναρία, 200. Εφαρμόζεται από το στάδιο του φυτάρου με ψεκασμούς που συνεχίζονται. **Κρεμμύδια υπαίθρου, Ασκαλάνια (Εσολόγ) υπαίθρου:** Σκουριά, 200-250. Ψεκασμοί φυλλώματος από το 2ο φύλλο και έπειτα. **Τομάτα υπαίθρου, Μελιτζάνα υπαίθρου:** Περονόσπορος, Αλτερναρία, 200. Προληπτικές εφαρμογές, εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο του 3ου πραγματικού φύλλου και έπειτα. Συνιστάται να γίνεται καλό λούσιμο του φυλλώματος. Μεσοδοσίσματα ψεκασμών ανάλογα με την πίεση της προσβολής. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος το φύλλωμα πρέπει να είναι στεγνό μετά από άρδευση ή βροχή. **Πιπεριά υπαίθρου:** Αλτερναρία, 200. Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο του 3ου πραγματικού φύλλου και έπειτα. Συνιστάται να γίνεται καλό λούσιμο του φυλλώματος. Μεσοδοσίσματα ψεκασμών ανάλογα με την πίεση της προσβολής. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος το φύλλωμα πρέπει να είναι στεγνό μετά από άρδευση ή βροχή. **Κολοκυνθοειδείς: Κολοκύθια υπαίθρου, Κολοκύθα υπαίθρου, Πατάτα υπαίθρου:** Περονόσπορος, 200. Ψεκασμοί φυλλώματος από το στάδιο του 5ου φύλλου και έπειτα. **Μαρούλι υπαίθρου:** Περονόσπορος, 200. Οι εφαρμογές ξεκινούν από το στάδιο των φυτάρων και συνεχίζονται. **Πατάτα:** Περονόσπορος, Αλτερναρία, 200 γρ. σκευάσματος/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με καλό λούσιμο των φυτών. Εφαρμόστε το προστατευτικό από το φύτρωμα των και έπειτα. Μεσοδοσίσματα εφαρμογών ανάλογα με την πίεση της ασθένειας. Αφήστε το φύλλωμα να στεγνώσει μετά από βροχή ή άρδευση πριν εφαρμόσετε το σκεύασμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): Μηλιά, Αγκυλιά, Τομάτα υπαίθρου, Μελιτζάνα υπαίθρου, Πιπεριά υπαίθρου, Μαρούλι υπαίθρου: **50-100**, Αμπελί: **20-100**, Καρύσι, Κολοκυνθοειδείς: **100**, Κρεμμύδια υπαίθρου, Ασκαλάνια (Εσολόγ) υπαίθρου: **80-100**, Πατάτα: **20-80**.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μηλιά, Αγκυλιά: Μέχρι 4 εφαρμογές εφόσον απαιτείται με μεσοδόκιμα εφαρμογών 7-10 ημέρες σε εναλλαγή με άλλα μυκητοκτόνα. Το μεγαλύτερο μεσοδόκιμα αφορά στο συνδυασμό του MAZOLAN με σκευάσματα που περιέχουν ηντοκυβανη ή fenbuconazole ενώ το μικρότερο στις απλές εφαρμογές. Μεταξύ διαδοχικών εφαρμογών του MAZOLAN πρέπει να μεσολαβεί μεσοδόκιμα 14 ημερών. **Αμπελί (επιτραπέζιες και οινολογικές ποικιλίες):** Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδόκιμα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Καρύσι:** Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδόκιμα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Κρεμμύδια υπαίθρου, Ασκαλάνια (Εσολόγ) υπαίθρου:** Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδόκιμα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Τομάτα υπαίθρου, Μελιτζάνα υπαίθρου, Πιπεριά υπαίθρου:** Μέχρι 5 εφαρμογές με μεσοδόκιμα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Κολοκυνθοειδείς, Μαρούλι υπαίθρου:** Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδόκιμα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Πατάτα:** Μέχρι 6 εφαρμογές με μεσοδόκιμα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Προστηρίσεις:

- Το MAZOLAN είναι ένα προστατευτικό μυκητοκτόνο. Η πρώτη εφαρμογή είναι καλή να γίνεται αμέσως πριν την προβλεπόμενη εμφάνιση της ασθένειας. Οι εφαρμογές επαναλαμβάνονται σύμφωνα με τα συνιστώμενα μεσοδοσίσματα ψεκασμών για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απαιτείται προστασία.
- Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής.
- Να μη χρησιμοποιούνται ως τροφή το αμπελόφυλλο σε περίπτωση χρήσης του MAZOLAN 80 WP.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτολογικής ή περιβαλλοντικής υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διορισμένη ανθεκτικότητα: Το MAZOLAN πρέπει να χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης.Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα. Η χρήση του είναι συμβατή με προγράμματα Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης για τις καλλιέργειες των μηλοειδών και του αμπελιού.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των πολεμίων καλλιεργειών. Γενικά πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης της ετικέτας ως προς τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος σε κάθε προτεινόμενη καλλιέργεια.

Τελευταία επίμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλιά, Αγκυλιά, Αμπελί (επιτραπέζιες και οινολογικές ποικιλίες), Κρεμμύδια υπαίθρου, Ασκαλάνια (Εσολόγ) υπαίθρου, Μαρούλι υπαίθρου: 28 ημέρες. Καρύσι: 30 ημέρες. Τομάτα υπαίθρου, Μελιτζάνα υπαίθρου, Πιπεριά υπαίθρου, Κολοκυνθοειδείς: 3 ημέρες. Πατάτα: 7 ημέρες.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 κιλό (2 x 500 γρ.)