

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Μην αναπνέεται - εκνεφώματα. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. Αποφύγετε τη διάθεση του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός· ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Μην ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο: Σε περίπτωση εμεπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κάντε τεχνητή αναπνοή σε περίπτωση που δεν αναπνέει. Καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό. Πιθανό να χρειαστεί πλήυση στομάχου. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

“ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ”

ΤΟΣΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσμουλιά=4, Πυρηνόκαρπα, Αμπέλι=3 Κολοκυνθοειδή, Τριανταφυλλιά, Γαρφαλλιά=5.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες/δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τριπθθούν προηγουμένως για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια

Ημερ/νία Παρασκευής:
Ημερ/νία λήξης:
Αρ. Παρτίδας:

Αναγράφονται στο άνω μέρος της φιάλης



RIBBON

ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ(ΕC) 12 EC

Εγγυημένη σύνθεση: Myclobutanil 12% β/ο
Βοηθ. ουσίες 86.66% β/β
Περιέχει Αρωματικό διαλύτη Νάφθα
και κυκλοςξανθίνη

Αρ. εγκ. κυκλοφορίας: 60037/11-1-06

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ



Χη

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης. Ερεθίζει τα μάτια. Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. Επιβλαβές. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.



N

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΕΥΦΛΕΚΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 400 Κ.Ε.Κ.

Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: SHARDA EUROPE B.V.B.A, Βέλγιο.

Διανομή:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο - 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5556 220, 210 5559 001-2
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ' Θέση ΒΛΠΕ.Θ. - Σινδος
Τηλ.: 2310 795 884, Fax: 2310 796 741



Φάσμα δράσης:
Μηλοειδή: α) Μηλιά: Ωίδιο Φουζικλάδιο. Δόση 30-40 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασμός στα στάδια πράσινης, ροδίνης κορυφής, πτώσης πετάλων και 10-15 ημέρες αργότερα (καρπίδιο). β) Αχλαδιά, Μουσμουλιά: Φουζικλάδιο. Δόση 30-40κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασμός στα στάδια πράσινης κορυφής, λευκής κορυφής, πτώσης πετάλων και 15-20 ημέρες αργότερα. **Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Ροδοκινιά, Νεκταρίνια, Δαμασκηλιά):** Ωίδιο. 30-40κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στην πτώση των πετάλων, η δεύτερη στην απόσπαση του κάλυκα και η τρίτη 20 ημέρες αργότερα. **Αμπέλι:** Ωίδιο. Δόση 15-25 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Βασική εφαρμογή την άνοιξη όταν έχουν εκπτυχθεί 2-3 φύλλα και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες. **Κολοκυνθοειδή (Αγγούρι, Κολοκύθι, Καρπούζι, Πεπόνι):** Ωίδιο. Δόση 40-50κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα. **Τριανταφυλλιά:** Ωίδιο. Μελακή κηλίωση. Δόση 40-50κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες. **Γαρφαλλιά:** Σκωρίαση. Δόση 40-50κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτ/στρεμμα): Μηλοειδή: 100-200, Πυρηνόκαρπα: 150-250, Αμπέλι: 50-150, Κολοκυνθοειδή - Τριανταφυλλιά - Γαρφαλλιά: 50-100. **Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις για τις ελληνικές εδαφολογικές συνθήκες. **Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση (π.χ. βορδιγάλειος πολτός).

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση σκευάσματος αναδεύοντας καλά. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Παρατηρήσεις: Η μικρή δόση συνιστάται για προληπτικές και η μεγάλη για θεραπευτικές εφαρμογές. Στις καλλιέργειες μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι και κολοκυνθοειδή υπό κάλυψη να ακολουθούνται στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων. **Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή:** Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αμπέλι: 21 ημέρες, Κολοκυνθοειδή: 7 ημέρες.