

SCORPION EC

Παραφινικό ορυκτέλαιο 98,5 EC

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εγγυημένη σύνθεση : paraffinic oil 98,5% β/β, CAS No 64742-46-7*

Βοηθητικές ουσίες : 1,5% β/β

Αρ. έγκρ. κυκλοφορίας : 1968 / 4 - 2 - 2003

Θερινός πολτός κατά κοκκοειδών, ακάρεων, αφίδων και λεπιδοπτερών.

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : 5 ΛΙΤΡΑ

Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας : TOTAL FLUIDES, Γαλλία.

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση -
Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά -

Παρασκευαστής - Εργοστάσιο παρασκευής / συσκευασίας :

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπηγάδο, 19600 Μάνδρα Αττικής

Τηλ.: 210 5555 220, 210 5559 001-2

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ : 53 Ο.Τ. Γ' Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ. -Σίνδος

Τηλ.: 2310 795 884, Fax: 2310 796 741



Κατηγορία και τρόπος δράσης : Θερινός πολτός κατά κοκκοειδών, ακάρεων, αφίδων και λεπιδοπτερών.

Καλλιέργειες - Στόχοι - Δόσεις (κ. εκ/100 λίτρα νερό) - Χρόνος Εφαρμογής ΕΞΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέιπ φρούτ, λεμόνι, μανταρίνι, πορτοκάλι, φράπα): Κοκκίνη ψώρα, Ψευδοκοκκος, Λεκάνιο, Άσπιρη ψώρα, Μαύρη ψώρα. Άλλα κοκκοειδή, Τετράνυχος, Αλευρώδεις **1000-1300 ή 500** σε συνδυασμό με την κανονική δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί : - Άνοιξης (με την έναρξη της βλάστησης). - Καλοκαριού. - Φθινοπώρου. - Χειμώνα. Η καλύτερη εποχή είναι αρχές Ιουνίου με τέλος Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση έντονης προσβολής μπορεί να γίνει ψεκασμός και τον χειμώνα (Φεβρουάριο - Μάρτιο). **ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά, Αχλαδιά, Κιδοινιά) : Ψώρα Σαν-Ζοζέ, Παρλατόρια, Βαμβάκαδα, Μυτιλόμορφη ψώρα, Σταγιά ψώρα. Φυλλοδέτες, Τετράνυχος, Ψύλλα, Αφίδες. **1000 -1300 ή 500** σε συνδυασμό με την κανονική δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί : - Άνοιξης (με την έναρξη της βλάστησης). - Καλοκαριού. - Φθινοπώρου. - Χειμώνα. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Βερικοκιά, κερασιά, ροδακινιά, νεκταρινιά, δαμασκηνιά) : Ψώρα Σαν Ζοζέ, Βαμβάκαδα, Σφαίρολεκάνιο, Παρλατόρια, Μυτιλόμορφη ψώρα, Αφίδες, Φυλλοδέτες, Ακάρεα. Προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων. **1000-1300 ή 500** σε συνδυασμό με την κανονική δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί : - Άνοιξης (με την έναρξη της βλάστησης). - Καλοκαριού. - Φθινοπώρου. - Χειμώνα. **ΕΛΙΑ** Λεκάνιο, Ασπιδιωτής, Παρλατόρια, Πολινία, Μυτιλόμορφη ψώρα, Βαμβάκαδα, Προνύμφες εντόμων. **1000 - 1300 ή 500** σε συνδυασμό με την κανονική δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί : - Άνοιξης (με την έναρξη της βλάστησης). - Καλοκαριού. - Φθινοπώρου. - Χειμώνα. **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ** Κοκκοειδή, Φυλλορύκτες, Φυλλοδέτες, Αφίδες. **1000 - 1300 ή 500** σε συνδυασμό με την κανονική δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί : - Άνοιξης (με την έναρξη της βλάστησης). - Καλοκαριού. - Φθινοπώρου. - Χειμώνα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : • Κατά τη χρήση του θερινού πολτού τα δέντρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό. • Αποφεύγετε να τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα και σε περιόδους έντονης ξηρασίας. • Να μην γίνεται εφαρμογή με το σκέυασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C, γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας. • Να μην γίνονται ψεκασμοί όταν υπάρχει παγετός ή κίνδυνος παγετού, καθώς και σε περιόδους ξηρασίας και υπερβολικής υγρασίας. • Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκέυασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή βείου ή θειασβετίου. • Στα μηλοειδή και ειδικά στο κρυστάλλι με μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή Κάπταν, Φολπέντ, Δινιπροενύσεων σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας. • Οι όγκοι ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα είναι : ΕΞΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ : 200 - 400 λίτρα/στρέμμα, ΜΗΛΟΕΙΔΗ - ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: 150-250 λίτρα/στρέμμα, ΕΛΙΑ: 150-300 λίτρα/στρέμμα, ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ: 80 λίτρα / στρέμμα. • Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή :** για όλες τις καλλιέργειες 21 ημέρες. Σε περίπτωση αναμειγνύμε με άλλο σκέυασμα αφαιρούμε να τηρούμε την «τελευταία επέμβαση» του άλλου σκευάσματος (αν αυτή είναι πάνω από 21 ημέρες).

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού : - Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. - Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού ανακατεύοντας μέχρι να γίνει ομοιομορφο γαλάκτωμα και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. - Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. - Σε περίπτωση που πρέπει να προστεθούν άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτό γίνεται αφού πρώτα το γαλάκτωμα του ορυκτελαίου αναδευτεί καλά. Σε περίπτωση που το αναμειγνύμε με βρέξιμη σκόνη, ετοιμάζουμε πρώτα το αραιωμένο γαλάκτωμα ορυκτελαίου και μετά προσθέτουμε την ήδη διαλυμένη σε νερό βρέξιμη σκόνη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ : • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος. • Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. • Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα στα οποία έπεσε σκέυασμα ή ψεκαστικό υγρό. • Το υλικό και ο περιέκτης του να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας μυών/προσώπου. • Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. • Μην ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ : Σε περίπτωση κατάποσης : Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση εισπνοής : Ο παθών να μεταφερθεί σε καθαρό αέρα. Εάν χρειασθεί ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Αντίδοτο : Συμπιωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 77 93 777.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκέυασμα ή τη συσκευασία του. Αποφύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφανείες.

Τρόπος εφαρμογής : Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος με ψεκαστήρες κινού (5-6 atm) ή μηχανοκίνητους (25-30 atm) και μικτού τύπου σκούπας. **Φυτοτοξικότητα :** Το σκέυασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις χρήσης του. Να χρησιμοποιούνται οι μικρές δόσεις σε ευαίσθητα στο λάδι φυτά (π.χ. σε μερικά καλλωπιστικά). Να γίνεται δοκιμή σε 1 ή 2 φυτά.

Συνδυαστικότητα : Το σκέυασμα συνδυάζεται με όλα τα γνωστά εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα. Δεν συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά σκευάσματα, θείο, Captan.

Οδηγίες για τη ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας : Τα κενά δοχεία του σκευάσματος ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως οι φιάλες με τρύπημα και τα κουτιά με σχίσμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αποτινθένται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Καθαρισμός ψεκαστήρα : Νερό και απορρυπαντικό.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης : Στην αρχική του απαραβίαση συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



HMER. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ :

ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ :