KEYLOFOP 36 EC

Diclofop-methyl (Ντικλοφόπ-μεθύλ) 36 %
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Diclofop-methyl 36 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 64,16 % β/β

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΕ ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του).
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Σε περίπτωση κατάποσης ή μετά από παρατεταμένη εισπνοή να μην προκληθεί εμετός. Προσοχή να μην γίνει πνευμονική αναρρόφηση. Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν χρειαστεί συμβουλευθείτε γιατρό. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Τα παράγωγα αδρεναλίνης αντενδείκνυται. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**

N

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΑΙ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Xn

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΕΥΦΛΕΚΤΟ. ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ. ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνθήκες αποθήκευσης, Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία και σε θερμοκρασίες 20-30 °C. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 7850/ 30-01-2008

Κάτοχος της Έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: SAPEC AGRO S.A., Alameda dos Oceanos lote 1.06.1.1-3º A Parque das Nacoes, Lisboa, Πορτογαλία

Διανομέας:

ΕΛΤΟΝ

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ), Τ.Κ. 190 11 Αυλώνας , Αττική,
Τηλ. 22950 29350, Φάξ 22950 29305

Πεδίο εφαρμογής – Στόχος – Δόσεις σκευάσματος – Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Για **ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια** εφαρμογή με ψεκασμό όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των 2-3 φύλλων και δεν έχουν καλυφθεί από την καλλιέργεια. **Καρότο:** Δόση 350 κ.εκ./στρ. και όγκος ψεκ. υγρού 40-50 λίτρα/στρ. **Λάχανο, Φασόλι:** Δόση 300 κ.εκ./στρ. και όγκος ψεκ. υγρού 30-60 λίτρα/στρ. **Πατάτα:** Δόση 250-300 κ.εκ./στρ. και όγκος ψεκ. υγρού 30-50 λίτρα/στρ. **Σπάρι (μαλακό και σκληρό):** Δόση 250 κ.εκ./στρ. και όγκος ψεκ. υγρού 30-50 λίτρα/στρ. **Κριθάρι:** Δόση 200-250 κ.εκ./στρ. και όγκος ψεκ. υγρού 30-50 λίτρα/στρ. **Ζαχαρότευτλα, Καπνός:** Δόση 300 κ.εκ./στρ. και όγκος ψεκ. υγρού 30-50 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1 εφαρμογή για όλες τις καλλιέργειες.
Παρατηρήσεις: 1. Καταπολεμούμενα ζιζάνια: Avena spp. (αγριοβρώμη), Echinocloa crus-galli (μουχρίτσα), Phalaris spp. (φάλαρη), Milium vernale (μίλιο), Setaria spp. (σετάρια), Digitaria sanguinalis (αιματόχορτο), Lolium multiflorum (πολύανθη ήρα), Eleusine indica (ελευσίνη) κ.α. Επίσης καταπολεμα Sorghum halepense (βέλιουρα) που προέρχεται από σπόρο. 2. Στο κριθάρι να εφαρμόζεται η δόση των 250 κ.εκ. στο στρέμμα σε περίπτωση μεγάλης προσβολής από αγριοβρώμη. 3. Στην πατάτα εφαρμόζουμε τη μεγάλη δόση σε περίπτωση μεγάλης προσβολής.
Ειδικές προφυλάξεις: SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. **SZ2** Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. **SZ5** Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. **SZ7** Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. **SZ8** Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. **SZ12** Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό στο οποίο μπορεί να προστεθεί διαβρεκτικός παράγοντας για καλύτερη απομάκρυνση των υπολειμμάτων του ψεκαστικού διαλύματος.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 3 μήνες από την εφαρμογή του.
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογή με ψεκασμό όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των 2 ή 3 φύλλων. Η εφαρμογή είναι ανεξάρτητη από το στάδιο ανάπτυξης των καλλιεργούμενων φυτών, αλλά ο βαθμός επιτυχίας της εφαρμογής εξαρτάται και καθορίζεται μόνο από το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων. Πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 ατμ. (45 PSI).
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά τα 2/3 με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται τρεις φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό διάλυμα. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
Συνδυαστικότητα: Το σκεύασμα δεν πρέπει να συνδυάζεται με ορμονικά ζιζανιοκτόνα. Η εφαρμογή αυτών θα πρέπει να γίνεται 8-10 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.