

278x115 mm

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάσσετε μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
- Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
- Σς περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
- "Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό".

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σς περίπτωση σπινθηρίσματος με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το φεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σς περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σς περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Μην δίνετε υγρό και μην προκαλείτε εμετό αν ο παθόντας είναι αναισθησμένος ή έχει ασπασμούς. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΗΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 210 77 93 777

Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς.

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Το υλικό και ο περιεκτικός του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικινδύνου απόβλητα.

Αποφύγετε την ελεύθερη ροή στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτία δεδομένων ασφαλείας.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια φάσκα της ζώνης προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη.

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα:

- Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπάρους.
- Συνιστάται εφαρμογές χαμηλής πίεσης (χαμηλότερης από 2 ατμόσφαιρες) για την αποφυγή μεταφοράς φεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές καλλιέργειες.
- Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ζεστές, εφαρμόστε το κατά τις βραδινές ώρες.
- Χρησιμοποιείτε ξεχωριστά φεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- Χρησιμοποιείτε επίπεδη ακροφύσια (flat fan) κατά την εφαρμογή.
- Μην μολύνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό ή γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- Μην μολύνετε λίμνες, ρυάκια, κανάλια, ή υδατοσυλλογές με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Στοιχείο φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται από πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο φεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τριπλή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

- Σίταρι, Κριθάρι: **60 ημέρες**
- Αραβόσιτος: **Μη εφαρμόζομαι**

Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια υποχλωμένο από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε όροσερο και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο προστατευμένο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.



Sanaphen™

600EC

ZIZANIOKTONO

2,4-D (ομάδα φαινοξυαλκανοϊκών)

Εγγυημένη σύνθεση: 2,4-D οξύ: 60% β/ο
(υπό μορφή 2,4-D EHE: 90,5% β/ο)
βοηθητικές ουσίες: 13,48% β/β

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εκλεκτικό δισυστηματικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια σιταριού, κριθαριού και αραβόσιτου


Xi



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

- Ερεθίζει το δέρμα.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Κάτοχος της έγκρισης: Dow AgroSciences Danmark A/S, DANIA

Υπευθύνος για την διάθεση στη χώρα: ELANKO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Διανομή:



ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροίτηγας, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ: 210 55 55 220, 55 59 001-2
Θεο/οίκης: 53 Ο.Τ., Γ' ΦΑΣΗ ΒΙΟΠ.Θ. - Σίνδος
Τηλ: 2310 79 58 84, Fax: 2310 79 67 41

© TM Trademark of the Dow Chemical company ("Dow") or an affiliated company of Dow

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εκλεκτικό δισυστηματικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια σιταριού, κριθαριού και αραβόσιτου.

Σς βιοχημικό επίπεδο το 2,4-D δρα όπως και οι φυσικές αυξίνες, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση στους μερισματογικούς ιστούς των βλαστών και των ριζών και τελικά τη νέκρωση των φυτών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Σίταρι, Κριθάρι: για πλατύφυλλα ζιζάνια * στη δόση 50-100κ.εκ./στρέμμα με 20-40 λίτρα φεκαστικό υγρό/στρέμμα. Μεταφωτρωτική εφαρμογή κατά την περίοδο του αδελφώματος έως τον πρώτο κόμβο και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 1.

Αραβόσιτος: για πλατύφυλλα ζιζάνια * στη δόση 50-100κ.εκ./στρέμμα με 20-40 λίτρα φεκαστικό υγρό/στρέμμα. Μεταφωτρωτική εφαρμογή στο στάδιο 3-6 φύλλων του αραβόσιτου και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 1.

***Καταπολερούμενα ζιζάνια:**

Ευαίσθητα ζιζάνια: *Abutilon theophrasti* (αγριομαμακιά), *Anagallis arvensis* (αναγαλλίδα), *Amaranthus retroflexus* (τραχύ βλήτο), *Bifora radians* (μυμφόρα), *Chenopodium album* (λουβουδάκι), *Cirsium arvense* (κίρσιον), *Convolvulus arvensis* (περιτλοκάδα), *Lamium amplexicaule* (δωδεκάνθη), *Papaver rhoeas* (κοινή παπαρούνα), *Raphanus raphanistrum* (ραπανάδα), *Sinapis arvensis* (άγριο σινάπι), *Solanum nigrum* (αγριονιότημα).

Μερίσιμα ευαίσθητα ζιζάνια: *Datura stramonium* (τάτουλας), *Galium aparine* (μεγαλόκαρπη κολλήτσιδα), *Polygonum aviculare* (πολυκύμμη), *Polygonum persicaria* (αγριοπιπεριά), *Veronica persica* (βερόνικα).

Παρατήρηση:

Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του σταδίου ανάπτυξης και της πυκνότητας των ζιζανίων.

Τρόπος εφαρμογής: Καθαλός καιρός, φυλλώματος με πίεση μικρότερη από 2 atm, με τα συνήθη φεκαστικά εδάφους και 20-40 λίτρα φεκαστικού υγρού.

Τρόπος παρασκευής φεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του φεκαστικού με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύουμε συνεχώς.

Καθαρισμός φεκαστικού: Αδειάζετε τελείως το φεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του φεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε πάλι με άφθονο νερό.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτογείας ή περιβαλλοντικής υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλίσσει:

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέσα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δρά