

MORGAN 83 WP

MORGAN 83 WP

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ		ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρμ. σκευασ./100 λιτ.ψεκ. υγρό	Λίτρα ψεκ. υγρού/ στρέμμα		
Αμυγδαλιά	Φαιά Σήψη	150	100-150	- Αρχή της άνθησης. - Πλήρη άνθηση.	2
	Κορόνιο			Εφαρμογές άνοιξης αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης.	
Μηλιά	Φουζικλάδιο	150	100-200	- Πράσινη κορυφή. - Ροδίνη κορυφή. - Πτώση πετάλων και - 10-15 ημέρες αργότερα (καρπιά).	4
Αχλαδιά	Φουζικλάδιο	150	100-200	- Πράσινη κορυφή. - Λευκή κορυφή. - Πτώση πετάλων και - 10-15 ημέρες αργότερα	4
Κερασιά Ροδακινιά Νεκταρινιά Δαμασκηλιά	Φαιά σήψη	150	100-250	Εφαρμογές στην περίοδο της άνθησης: - Ροδίνη κορυφή (για την κερασιά στο 10% της άνθησης) - 50% άνθηση - πλήρη άνθηση - πτώση πετάλων.	4
	Κορόνιο Εξάσκος			Εφαρμογές άνοιξης αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης. Μια εφαρμογή πριν την διάγκωση των οφθαλμών.	
Βερικοκιά	Φαιά σήψη	150	100-250	Εφαρμογές στην περίοδο της άνθησης: - Ροδίνη κορυφή - 50% άνθηση - πλήρη άνθηση - πτώση πετάλων.	4
	Κορόνιο Εξάσκος			Εφαρμογές άνοιξης αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης. Μια εφαρμογή πριν την διάγκωση των οφθαλμών.	
Τομάτα υπαίθρου	Αλτερναρίωση Τεφρά σήψη Σεπτορίωση	150	50-100	Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα, επανάληψη ανά 15 ημέρες.	3
Πιπεριά υπαίθρου	Προσβολή λαμού	150	50-100	Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα.	1
	Αλτερναρίωση Τεφρά σήψη			Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα	
Πεπόνι υπαίθρου	Τεφρά σήψη	150	50-100	Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα.	3
	Προσβολή λαμού			Μια εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα	
Καλλωπιστικά	Προσβολή λαμού	150	50-100	Μια εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα.	1

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: 1) Έχει μέτρια δράση στην καταπολέμηση του Περονόσπορου, Ανθράκνωσης, Σκληρωτίνιασης και Κλαδοσπορίωσης της τομάτας, πιπεριάς, πεπονιού. 2) Η χρήση του μπορεί να προκαλέσει ελαφρά αύξηση ακάρεων.

MORGAN 83 WP

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε. •Μην αναπνέετε την σκόνη. •Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. •Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. •Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί και πλυθείτε με νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό, κρατώντας τα ανοιχτά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την συσκευασία ή την ετικέτα όπου αυτό είναι δυνατόν. Μην προκαλείτε εμετό. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Να αποφεύγεται η είσοδος σε έκταση που ψεκάσθηκε με CAPTAN επί 4 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

MORGAN 83 WP

CAPTAN (ΚΑΠΤΑΝ) 83%
Βρέξιμη σκόνη

Εγγυημένη σύνθεση: CAPTAN 83% β/β
Βοηθητικές ουσίες 8,8% β/β

Αρ. εγκρ. κυκλοφ.:
6019/82

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες



ΤΟΞΙΚΟ

- Τοξικό όταν εισπνέεται.
- Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
- Ύποπτο καρκινογένεσης.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σ'επαφή με το δέρμα.



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

•Πολύ τοξικο για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Παρασκευαστής:

Arysta Lifescience SAS, Route d'Artix, BP 80, 64150 Nogueres, France

Κάτοχος της έγκρισης – Υπεύθυνος για την διάθεση στην ελληνική αγορά –

Διανομή :



ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ. 210 5555220, 210 5559001-2
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ' Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ-Σίνδος
Τηλ. 2310 795884, Fax: 796741

Μέλος του



MORGAN 83 WP

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το μέσα στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αμυγδαλιά: Στην πλήρη άνθηση, Μηλιά-Αχλαδιά: Στο στάδιο του καρπιδίου, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά: Στην πτώση των πετάλων, Βερικοκιά:21 ημέρες, Τομάτα υπαίθρου - Πιπεριά υπαίθρου: Στο τέλος της πρώτης ανθοφορίας, Πεπόνι υπαίθρου: 21 ημέρες.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Μερικές ποικιλίες μηλιά (π.χ. RED DELICIOUS, WINESAP) και αχλαδιάς (π.χ. D' ANJOU, BOSCO).

Συνδυαστικότητα: ---

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγούμενως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό και σε κανονικές θερμοκρασίες. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 100 γρ.

