

BORDO  
20 WG

BORDO  
20 WG

ΒΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

Bordeaux mixture (Βορδιγάλειος πολτός) 20%

Εγγυημένη σύνθεση: Μεταλλικός χαλκός 20% β/β  
σε μορφή Βορδιγάλειου πολτού  
Βοηθητικές ουσίες 21,57% β/β

Ανόργανο μυκητοκτόνο  
με προστατευτική δράση.

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΧΙ  
Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

N  
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.  
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες  
δυμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο  
περιβάλλον.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ  
ΓΙΑ ΤΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρ. εγκρ. κυκλοφορίας: 60.006 / 26.09.2005

Κάτοχος της άδειας:  
ALINTRA S.A., Carré 3, Polígono Industrial Can Valls, 08150 Parets del Valles, Barcelona, Spain  
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σημειω-Παρασκευαστής-Εργαστήριο παρασκευής:  
INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLES S.A. (I.Q.V.),  
Av. Rafael Casanova 91, 08100 Mollet del Valles, Barcelona, Spain  
Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΑΝΘΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε., Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα

Εργοστάσιο συσκευασίας-Διανομέας:  
ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΕΛΛΑΓΡΕΤ  
Θέση Σηροπηγάδο, 19600 Μόνορα Αττικής  
Τηλ. 210 5555220, 210 5555001-2  
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ' Φάση ΒΙ.Π.Ε.Θ-Σίνδος  
Τηλ. 2310 795884, Fax: 796741

Μέλος του



Φάσμα δράσης: Καλλιέργειες – Ασθένειες – Δόσεις (γρ.σκευάσματος/100 λίτ.ψεκ.υγρό)- Χρόνος εφαρμογής: Εσπεριδοειδή (Γκρέιπ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Κιτριά, Νεραντζιά, Φράπα): Κορυφοξήρα: 400. Προληπτικές εφαρμογές φθινόπωρου: εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Προσβολή κλαδέσεων, φύλλων και καρπών: 400. Εφαρμογή μετά από χαλάζι ή παγετό. Αμυγδαλιά: Κορίνιο: 400. Μία εφαρμογή το φθινόπωρο όταν έχει πέσει το 75% των φύλλων και μία το χειμώνα λίγο πριν την έκπτυξη των ευλοφόρων οφθαλμών. Με την έναρξη της βλάστησης γίνονται άλλες 1-2 εφαρμογές επί όσον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Καρυδιά: Ανθράκωση: 400. Συνιστώνται 3-4 εφαρμογές που αρχίζουν πριν βγουν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες. Να αποφεύγονται οι εφαρμογές στην άνθηση. Μηλιά: Φουζιλιάδιο: 550-625. Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προετοιμασιών συνιστώνται εφαρμογές στα στάδια της πράσινης και ροζέτης καρπικής και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Πυρηνόκαρπα (Βερικοκία, Κερασιά, Ροδόκινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά, Βυσσινιά): Εξασσος, Κορίνιο, Φαίς σήψη: 425. Προληπτικές εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πριν φουσκώσουν τα μάρτια. Αμπέλι (για επιτραπέζια και ονοποποίηση σταφυλίου): Περονόσπορος, Ανθράκωση: 550-650. Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προετοιμασιών προληπτικές εφαρμογές που αρχίζουν την άνοιξη όταν υπάρχουν οι κατάλληλες για την προσβολή συνθήκες και συνεχίζονται ανάλογα με την εξέλιξη των τοπικών συνθηκών. Ελιά: Κυκλοκόνιο: 600-650. Δύο εφαρμογές: η πρώτη εφαρμογή το φθινόπωρο λίγο πριν την έναρξη των βλαστών και η δεύτερη την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ. Γλοισπόριο: 600-650. Δύο εφαρμογές: Η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. Καρπινίσση: 600-650. Μετά από χαλάζι ή παγετό. Λαχανικά (Κρεμμύδι, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κουνουπίδι, Λάχανο, Μορούλι, Σπανάκι, Σέλινο, Πρόσο, Φασόλι): Περονόσπορος, Σπτορίωση: 350. Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σπορόφυτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες. Ανθράκωση: 350. Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά. Βακτηρίωση: 350. Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σπορόφυτων και σταματούν στην καρπώδεια. Τομάτα (u+θ): Περονόσπορος: 550-625. Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Βακτηριακή κηλίδα: 550-625. Εφαρμογές με την εκδήλωση της ασθένειας και εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωση της. Πατάτα: Περονόσπορος: 550-612,5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ.γρό. Σε περίπτωση βαριάς προσβολής εφαρμόζουμε δόση 275-612,5 γρ. σκευάσματος/στρέμμα. Σε περίπτωση ελαφριάς προσβολής εφαρμόζουμε δόση 175-275 γρ. σκευάσματος/στρέμμα. Εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας οι εφαρμογές ξεκινούν όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επαναλαμβάνονται ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Ζαχαρότευτλα: Κερκοσπορίωση: 550-650. Εφαρμογές που αρχίζουν με την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας. Καλλωπιστικά: Περονόσπορος, Σπτορίωση: 550-650. Εφαρμογές που αρχίζουν με την εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων. Φυτόθορα: 550-650. Εφαρμογή στα νεαρά φυτά στο σπορείο ή μετά τη μεταφύτευση. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): Εσπεριδοειδή: 200-250, Αμυγδαλιά-Καρυδιά: 100-150, Μηλιά: 100-200, Πυρηνόκαρπα: 100-120, Αμπέλι: 50-100, Ελιά: 150-300, Λαχανικά: 50-80, Τομάτα (u+θ) – Πατάτα – Καλλωπιστικά: 50-100, Ζαχαρότευτλα: 40. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο: Εσπεριδοειδή, Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Αμπέλι(για επιτραπέζια και ονοποποίηση σταφυλίου), Λαχανικά, Ζαχαρότευτλα: 4. Μηλιά, Πυρηνόκαρπα, Πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προετοιμασιών.

BORDO  
20 WG

ΒΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

Bordeaux mixture (Βορδιγάλειος πολτός) 20%

Εγγυημένη σύνθεση: Μεταλλικός χαλκός 20% β/β  
σε μορφή Βορδιγάλειου πολτού  
Βοηθητικές ουσίες 21,57% β/β

Ανόργανο μυκητοκτόνο  
με προστατευτική δράση.

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΧΙ  
Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

N  
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.  
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες  
δυμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο  
περιβάλλον.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ  
ΓΙΑ ΤΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρ. εγκρ. κυκλοφορίας: 60.006 / 26.09.2005

Κάτοχος της άδειας:  
ALINTRA S.A., Carré 3, Polígono Industrial Can Valls, 08150 Parets del Valles, Barcelona, Spain  
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σημειω-Παρασκευαστής-Εργαστήριο παρασκευής:  
INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLES S.A. (I.Q.V.),  
Av. Rafael Casanova 91, 08100 Mollet del Valles, Barcelona, Spain  
Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΑΝΘΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε., Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα

Εργοστάσιο συσκευασίας-Διανομέας:  
ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΕΛΛΑΓΡΕΤ  
Θέση Σηροπηγάδο, 19600 Μόνορα Αττικής  
Τηλ. 210 5555220, 210 5555001-2  
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ' Φάση ΒΙ.Π.Ε.Θ-Σίνδος  
Τηλ. 2310 795884, Fax: 796741

Μέλος του



ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ:  
•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν τα χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. •Μην αναπνέετε τη σκόνη ή το ψεκαστικό υγρό. •Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. •Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. •Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). •Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να επιστεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων. •Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικινδυνα απόβλητα. •Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτία δεδομένων ασφαλείας. ΠΡΑΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση κατάπτωσης: Χρησιμοποιήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση. Αντίδοτο: Πενικιλαιμίνη. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (σε ημέρες): Εσπεριδοειδή, Αμπέλι (για επιτραπέζια και ονοποποίηση σταφυλίου), Ελιά, Πατάτα, Ζαχαρότευτλα: 21. Μηλιά, Πυρηνόκαρπα: Μη Εφαρμοσμένο (Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της Καλλιέργειας κατά την εφαρμογή). Αμυγδαλιά, Καρυδιά: 28. Λαχανικά (Υ+Θ): 7. Τομάτα υπαίθρου: 10. Τομάτα θερμοκηπίου: 7.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ψεκασμός φυλλώματος ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε τα 2/3 του δοχείου του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό. Ρίξτε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο με συνεχή ανάδευση. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, κερασιά και δαμασκηνιά αφού φουσκώσουν τα μάτια. Επίσης μπορεί να παρουσιάσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή κάτω από ορισμένες συνθήκες (υψηλή υγρασία). Φυτοτοξικότητα παρουσιάζει επίσης σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς, Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με οργανοφωσφορικά και καρβαμικά εντομοκτόνα καθώς και με maneb, mancozeb, folpet, carbin και thiamet. Επίσης δεν συνδυάζεται με ειδικά σκευάσματα όταν ο ψεκασμός γίνεται εντός της εποχής του ληθάργου των δένδρων. Σε περίπτωση ανάγκης να διαλύονται πρώτα τα στερεά σκευάσματα, μετά το Bordo 20 WG και μετά τα σκευάσματα σε υγρή μορφή. Σε περίπτωση νέων συνδυασμών να γίνεται μια μικρή δοκιμή πριν από την τελική εφαρμογή.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σκαυίλες, σάκοι) μαζί με τα καυίδια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκόμιο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα μένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:  
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 ΚΙΛΟ

