

ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ
50 WP

ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ
50 WP

COPPER OXYCHLORIDE 50% (ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ) ΒΡΕΞΙΜΗ ΣΚΟΝΗ WP

Εγγυημένη σύνθεση: Μεταλλικός χαλκός 50 % β/β (σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού)
Βοηθητικές ουσίες: 10,71 % β/β

Αρ. Εγκρ.κυκλοφορίας: 6157/26-2-1980

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

• Μπορεί να προκαλέσει μακρο-
χρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις
στο υδάτινο περιβάλλον.

Κάτοχος της έγκρισης: ALINTRA S.A., Ισπανία
Garbí 3, Polígono Industrial Can Volant, 08150 Parets del Vallès, Barcelona, Spain
Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε., Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση Παρασκευαστής Εργοστάσιο παρασκευής:
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A. (I.Q.V.),
Av. de Rafael Casanova 81, 08100 Mollet del Valles, Barcelona, Spain.



Εργοστάσιο συσκευασίας Διανομή:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ. 210 5555220, 210 5559001-2
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ' Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ-Σίνδος
Τηλ. 2310 795884, Fax: 796741



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. •Μην αναπνέετε τη σκόνη ή το ψεκαστικό υγρό. •Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. •Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια. •Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). • Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να αναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων. •Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.

Αντίδοτο : Πενικιλλαμίνη

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ :

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ :100 γραμμ.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Καλλιέργειες - Ασθένειες - Δόσεις (γρ.σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικό υγρό) - Χρόνος εφαρμογής:

Εσπεριδοειδή (Γκρέιπφρουτ, Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά): **Κορυφοξήρα: 190.** Εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. **Φυτόφθορα καρπών: 190.** Εφαρμογή το δεύτερο 15νήμερο του Οκτωβρίου και επανάληψη μετά από 3-4 μήνες. Συνιστάται να ψεκάζονται τα χαμηλά κλαδιά μέχρι 1,5 μ. από το έδαφος.

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά): **Φουζικλάδιο: 250.** Εφαρμογές το φθινόπωρο πριν την πώση των φύλλων και στα στάδια της πράσινης και ροδινης κορυφής εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.

Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Δαμασκηλιά): **Κορύνιο, Εξώασκος: 170.** Στις περιοχές που ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμογές: α) το φθινόπωρο, μόλις πέσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών.

Αμπέλι (Για επιτραπέζια και οиноποιήσιμα σταφύλια): **Περονόσπορος: 260.** Εφαρμογές όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση.

Ελιά: Κυκλοκόνιο 260. Δύο εφαρμογές : η πρώτη εφαρμογή το φθινόπωρο λίγο πριν την έναρξη των βροχών και η δεύτερη την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ. **Γλοισσπόριο: 260.** Δύο εφαρμογές : Η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα.

Λαχανικά (Καρότο, Ραπάνι, Κρεμμύδι, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθι,Πεπόνι, Καρπούζι, Πράσο, Κουνουπίδι, Λάχανο, Μαρούλι, Σπανάκι, Ραδίκι, Αγκινάρα, Σέλινο, Φασόλι, Μπιζέλι): **Περονόσπορος : 240.** Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σπορόφυτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες. **Φυτόφθορα: 240.** Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

Τομάτα (υπαίθρου-θερμοκηπίου): **Περονόσπορος : 250.** Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **Πατάτα: Περονόσπορος: 240.** Εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν υψος 15-20 εκατ. και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

Παρατηρήσεις:

- Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση, ιδιαίτερα για τα μηλοειδή. Οι μεγαλύτερες δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που γίνονται όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής.
- Στα λαχανικά να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.
- Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
- Στις καλλιέργειες: αμπέλι, εσπεριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λιτ/στρέμμα): Εσπεριδοειδή: 125-250, Μηλοειδή (Μηλιά- Αχλαδιά-Κυδωνιά): 100-200, Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά- Κερασιά- Ροδακινιά-Δαμασκηλιά): 100-120, Αμπέλι (επιτραπέζια και οиноποιήσιμα σταφύλια): 50-150, Ελιά: 150-300, Λαχανικά: 50-100, Τομάτα (υ+θ)-Πατάτα: 50-100.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο: Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, Αμπέλι, Λαχανικά: 3, Πυρηνόκαρπα: 4, Ελιά, Τομάτα (υ+θ), Πατάτα: 2.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: **Εσπεριδοειδή:** 21 ημέρες. **Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα:** Μη Εφαρμόσιμο (Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή). **Αμπέλι (για επιτραπέζια και οиноποιήσιμα σταφύλια):** 21 ημέρες. **Ελιά:** 21 ημέρες. **Λαχανικά (Υ+Θ):** 7 ημέρες. **Τομάτα Υπαίθρου:** 10 ημέρες. **Θερμοκηπίου:** 7 ημέρες. **Πατάτα:** 21 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, κερασιά και δαμασκηλιά μετά το φούσκωμα των οφθαλμών καθώς και στα κολοκυνδοειδή. Οι ποικιλίες μηλιάς Golden delicious, Jonathan, Reinette και Staimon είναι ευαίσθητες όταν το σκεύασμα εφαρμόζεται μετά την έναρξη της βλάστησης. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικούς πολτούς, με σκευάσματα mancozeb, maneb, thiram, captan, folpet και με ισχυρά οξέα και αμμωνία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι) μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.