

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση του επικίνδυνα απόβλητα • Αποφύγετε την απελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτία δεδομένων ασφαλείας • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ Γενικά:** Να έχετε διαθέσιμο, την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. **Επασή με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για μερικά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. **Κατάποση:** Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα **Επασή με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. **Αναπνοή:** Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και ξηλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Να αποφεύγεται η χορήγηση βαρβιτουρικών, βενζοδιαζεπινών και βαλπροϊκού οξέος. Σε περίπτωση κατάποσης, να χορηγηθούν 2-3 ποτήρια νερό και να προκληθεί εμετός, μόνο εάν ο παθών έχει τις αισθήσεις του, με ερεθισμό του φάρυγγα. Περιέχει abamectin και Cyclohexanol. **Τηλέφωνο Κέντρου δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777.**

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/ στρ): Εσπεριδοειδή, Μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά: 100-150, Καλλωπιστικά Θερμοκηπίου, Ροδακινιά, Νεκταρίνια, Βερικοκιά, Δαμάσκηνα, Καρυδιά: 100, Τομάτα (Α/Θ), Μελιτζάνα (Α/Θ), Πιπεριά (Α/Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ), Πεπόνι (Α/Θ), Καρπούζι (Α/Θ): 50-120, Μαρούλι (Θ), Μαϊντανός (Θ), Άνθος (Θ), Σέλινο (Θ): 50, Ραδίκι (Θ), Σκαρόλα (Α), Αμπέλι: 50-100.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς και τους οργανισμούς μη στόχους να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας: Για τις εφαρμογές σε φυλλώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά, να αφήνετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων. Για τις εφαρμογές σε αμπέλι να αφήνετε αφέκαστη ζώνη 10 μέτρων ή εναλλακτικά αφέκαστη ζώνη 3 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού. Για τις εφαρμογές στα εσπεριδοειδή να αφήνετε 20 μέτρων ή εναλλακτικά αφέκαστη ζώνη 10 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 75% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού. Για τις εφαρμογές στις λοιπές καλλιέργειες, να αφήνετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων ή εναλλακτικά αφέκαστη ζώνη 15 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού. Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας: Για τις εφαρμογές σε εσπεριδοειδή να αφήνετε μία αφέκαστη ζώνη 15 μέτρων. Για τις εφαρμογές σε φυλλώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά να αφήνετε μία αφέκαστη ζώνη 5 μέτρων από ακαλιέργειες εκτάσεις. Πιθανώς επικινδύνου για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικινδύνου μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Για την προστασία των μελισσών θα πρέπει οι μελισσοκόμοι της περιοχής να ενημερωθούν ώστε τα μελίσσια να απομακρυνθούν από την περιοχή για τουλάχιστον: 39 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών, 43 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες τομάτας υπαίθρου, 96 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες θερμκηπίου για εξαπόλυση βομβινών/μελισσών στα θερμοκήπια. «Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και τον ψεκασμό» «Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στους αγρούς που έχουν ψεκαστεί πριν σιγνώσει το ψεκαστικό υγρό. Σε περίπτωση που εισέλθετε στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία»

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ :
ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ : Βάλετε από μέρος φιάλης



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

REVOLVER

1,8 EC

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Abamectin (Αμπαμεκτίν) 1,8%

Εγγυημένη σύνθεση: Abamectin 1,8% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 97,96% β/β (Περιέχει Cyclohexanol)

Εντομοκτόνο – ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής.
Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από αστία.

Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αρ. Εγκρ. Κυκλοφορίας: 14.460/7-8-2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ Η' ΚΑΤΑΠΟΣΗ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παρασκευαστής σκευάσματος:
Syngenta Crop Protection AG Switzerland

Κάτοχος της έγκρισης – Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά
– Εργοστάσιο συσκευασίας – Διανομή:



ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
τηλ: 210 55 55 220, 55 59 001-2
Θεσ/νίκη: 53 Ο.Τ., Γ' ΦΑΣΗ ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Σίνδος
τηλ: 2310 79 58 84, Fax: 2310 79 67 41



Φασμα δράσης: Πεδίο εφαρμογής – Στόχοι – Δόσεις (κ.εκ/100λίτρα ψεκ υγρό) – Χρόνος εφαρμογής: Καλλωπιστικά Θερμοκηπίου (φυτά-βολβοί και βολβώδη ανθικά φυτά-δένδρα θάμνοι και φυτώρια δασικών δένδρων): Τετράνυχος, Λυριόμυξα, Θρίπας, Ψύλλα με 75-100. Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη των προσβολών. **Μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά:** Ψύλλα, φυλλορύκτης, Θρίπας, Τετράνυχος, Πανόνυχος με 75. Ψεκασμός φυλλώματος πριν την εκκόλαψη των αυγών σε μίγμα με παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή άλλο προσκολλητικό. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (πριν ή μετά την ανθοφορία). **Ροδακινιά, νεκταρίνια, βερικοκιά:** Ψύλλα, Θρίπας, τετράνυχος, πανόνυχος, με 75-100. Ψεκασμός φυλλώματος πριν την εκκόλαψη των αυγών σε μίγμα με παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή άλλο προσκολλητικό. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. **Εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, λεμόνια, μανταρίνια):** Φυλλοκίστης με 40, Πανόνυχος, Τετράνυχος με 75. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων ή με την εμφάνιση των ακάρεων στους νεαρούς βλαστούς (όχι κατά την ανθοφορία) σε μίγμα με παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή άλλο μη ιοντικό προσκολλητικό. **Αμπέλι:** 'Ακαρι της αμπέλου, τετράνυχος με 50 – 75. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία). **Τομάτα (Α/Θ) – Μελιτζάνα (Α/Θ) – Πιπεριά (Α/Θ):** Τετράνυχος, Λυριόμυξα, Θρίπας: 80 – 100. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό). **Αγγούρι (Θ) – Κολοκύθι (Θ) – Τετράνυχος, Λυριόμυξα, Θρίπας:** 80 – 100. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακαρέων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. **Πεπόνι (Α) Καρπούζι (Α):** Τετράνυχος με 80-100. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακαρέων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό). **Πεπόνι (Θ) Καρπούζι (Θ):** Τετράνυχος, Λυριόμυξα, Θρίπας με 80-100. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακαρέων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. **Μαρούλι (Θ) – Μαϊντανός (Θ), Άνθος (Θ), Σέλινο (Θ), Ραδίκι (Θ):** Θρίπας με 75-100. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακαρέων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. **Σκαρόλα (Α):** Θρίπας με 50 -100. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **Δαμάσκηνα:** Τετράνυχος, Πανόνυχος με 75-100. Ψεκασμός φυλλώματος πριν την εκκόλαψη των αυγών, σε μίγμα με παραφινικό λάδι 0,25 – 0,3% ή άλλο προσκολλητικό. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. **Καρυδιά:** Τετράνυχος, Πανόνυχος με 75. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής (πριν την ανθοφορία ή μετά την ανθοφορία).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Καλλωπιστικά Θερμοκηπίου, Τομάτα (Α/Θ), Μελιτζάνα (Α), Πιπεριά (Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ), Μαρούλι (Θ), Μαϊντανός (Θ), Άνθος (Θ), Σέλινο (Θ), Ραδίκι (Θ): Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά: Μέχρι 2 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. Ροδακινιά, Νεκταρίνια, βερικοκιά: Μέχρι 2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. **Εσπεριδοειδή:** Μέχρι 3 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα, Αμπέλι: Μέχρι 2 εφαρμογές με 14 -21 ημέρες μεσοδιάστημα. Μελιτζάνα (Α), Πιπεριά (Α), Πεπόνι (Α/Θ), Καρπούζι (Α/Θ), Σκαρόλα (Α): Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες. Δαμασκήνια, Καρυδιά: Μέχρι 1 εφαρμογή.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού και προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος και όπου συνιστάται λαδίου ανακατεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό ανακατεύοντας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Μηλιά, αχλαδιά κυδωνιά, αμπέλι: 28 ημερες, Εσπεριδοειδή: 10 ημερες, Ροδακινιά, νεκταρίνια, βερικοκιά: 14 ημερες, Τομάτα, μελιτζάνα αγγούρι, κολοκύθι, πιπεριά, πεπόνι, καρπούζι: 3 ημερες, Μαρούλι, ραδίκι, μαϊντανός, άνθος, σέλινο: 14 ημερες, Ανθοκομικά: δ/ο, Καρυδιά: 60 ημερες, Σκαρόλα: 7 ημερες, Δαμάσκηνα 28 ημερες.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Στην αχλαδιά να αποφεύγεται ο συνδυασμός REVOLVER 1,8 EC με λαδί, 14 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του μυκητοκτόνου Captan.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκατεστεί: Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εδάμεις καλλιέργειες θερμοκηπίου κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο-Φεβρουάριο).

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φ.π. και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τριψύμιο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να αναποστεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο.