

BATHURIN® 16.000 WP

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

Εσπεριδοειδή: Γκρέϊπ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Κιτριά: Ανθοτρήτης: ΔΟΣΕΙΣ 50 γραμ./ 100 λίτρα νερό. Χρόνος εφαρμογής: Να ακολουθούνται οι συστάσεις των τοπικών γεωργικών προειδοποιήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, συστήνονται τα ακόλουθα: Ένας ψεκασμός στην αρχή της ανθοφορίας και εάν χρειασθεί δεύτερος μετά από 7-10 ημέρες. **Ακρόδρυα: Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φυσικιά:** Φυλλοδέτες: Φυλλοφάγες κάμπιες, Υπονομευτές ΔΟΣΕΙΣ 50 γραμ./ 100 λίτρα νερό. Ο πλέον κατάλληλος χρόνος εφαρμογής είναι με την παρουσία των νεογέννητων νεαρών προνυμφών της κάθε γενιάς των εντόμων, πράγμα που καθορίζεται από τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων ή από τον παραγωγό με την χρήση παγίδων φερομόνης. Για τις φυλλοφάγες προνύμφες ειδικά, ο κατάλληλος χρόνος είναι με την παρουσία των νεογέννητων προνυμφών. **Μηλοειδή: Μηλιά, Αχλαδιά:** Φυλλοδέτες, Φυλοφάγες κάμπιες: ΔΟΣΕΙΣ 50 γραμ./100 λίτρα νερό. Χρόνος εφαρμογής: όπως Ακρόδρυα. **Πυρηνόκαρπα: Βερυκοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Δαμασκηνιά:** Ανάρσια, Φυλλοδέτες, Φυλλοφάγες κάμπιες, Υπονομευτές: ΔΟΣΕΙΣ 50 γραμ./ 100 λίτρα νερό. Χρόνος εφαρμογής: όπως Ακρόδρυα. **Αμπέλι:** Ευδεμίδα, Κογχυλίδα, Προνύμφες φυλλώματος. ΔΟΣΕΙΣ 60-100 γραμ./100 λίτρα νερό. Χρόνος εφαρμογής: Να ακολουθούνται οι συστάσεις των τοπικών γεωργικών προειδοποιήσεων. Γενικά ψεκασμοί συστήνονται μία εβδομάδα από την έναρξη πτήσεως της κάθε γενιάς του εντόμου. Επόμενοι ψεκασμοί αν είναι αναγκαίο, σε διαστήματα 7-10 ημερών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν γεωργικές προειδοποιήσεις συνιστώνται τα ακόλουθα, βάσει των φαινολογικών σταδίων της καλλιέργειας: α) Ένας ψεκασμός λίγο πριν την άνθηση. β) Ένας ψεκασμός κατά την γονιμοποίηση των ανθέων. γ) Ένας ψεκασμός όταν οι ράγες έχουν μέγεθος μπιζελιού, και δ) ένας ψεκασμός με την αλλαγή χρώματος των ραγών. **Ελήα:** Πυρηνοτρήτης: Οι ψεκασμοί να ακολουθούν τις συστάσεις των τοπικών γεωργικών προειδοποιήσεων. Εάν δεν υπάρχουν να ακολουθηθούν τα επόμενα: Ψεκασμός όταν 5-25% των ανθέων έχουν ανοίξει. Ψεκάσουμε μόλις εμφανισθούν τα πρώτα ανοικτά άνθη. Μετά 7-10 ημέρες μπορεί να γίνει και δεύτερος ψεκασμός εάν υπάρχει μεγάλος πληθυσμός προνυμφών.

Λαχανικά: Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Κουνουπίδι, Λάχανο, Μαρούλι, Μπάμια, Αγκινάρα, Πράσα: Πιερίδα, Σκόρος των κρμβοειδών, Προνύμφες φυλλώματος, Πράσινο σκουλήκι: ΔΟΣΕΙΣ 80-100 γραμ./100 λίτρα νερό. Ψεκασμός με την εμφάνιση των νεογέννητων νεαρών προνυμφών. Επόμενος ψεκασμός εάν χρειασθεί μετά από 7-10 ημέρες. **Βαμβάκι:** Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι: ΔΟΣΕΙΣ 60-100 γραμ./100 λίτρα νερό. Ψεκασμός ανάλογα με τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. ΔΟΣΕΙΣ 60-100 γραμ./100 λίτρα νερό. **Καλαμπόκι:** Πυραλίδα, Πράσινο σκουλήκι, Σεζάμια: ΔΟΣΕΙΣ 80-100 γραμ./100 λίτρα νερό. Ψεκασμός με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών. **Καπνός:** Πράσινο σκουλήκι: ΔΟΣΕΙΣ 60-100 γραμ./100 λίτρα νερό. Πρώτος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Δεύτερος και τρίτος ψεκασμός εάν χρειασθεί, σε διάστημα 7-10 ημερών. **Καλλωπιστικά:** Φυλλοφάγες και ανθοφάγες προνύμφες: ΔΟΣΕΙΣ 80-100 γραμ./100 λίτρα νερό. Ψεκασμός με την εμφάνιση των νεογέννητων νεαρών προνυμφών. Επόμενος ψεκασμός, εάν χρειασθεί, 7-10 ημέρες αργότερα. **Δασικά δένδρα: Πεύκο, Βελανιδιά:** Φυλλοφάγες προνύμφες, Πιτυοκάμπη, Λυμάντρια, Υφάντρια, Μαλακόσωμα: ΔΟΣΕΙΣ 50 γραμ./100 λίτρα νερό. Ψεκασμός το Σεπτέμβριο. Ψεκασμός φυλλώματος τον Απρίλιο/Μάιο. Ψεκασμός φυλλώματος το Μάιο/Ιούνιο. **Αποθηκευμένα προϊόντα:** Εφέστια: ΔΟΣΕΙΣ 50 γραμ./100 λίτρα νερό. ΔΟΣΕΙΣ 100 γραμ./100 λίτρα νερό. Ψεκασμός της επιφάνειας των αποθηκών.

Παρατηρήσεις: 1. Ψεκάστε μόλις φανούν οι νεαρές προνύμφες και παρατηρηθούν οι πρώτες ζημιές και επαναλάβετε κατά διαστήματα ώστε ο πληθυσμός να κρατηθεί χαμηλός. Χρειάζεται καλό λούσιμο όλης της φυλλικής επιφάνειας γιατί οι προνύμφες πρέπει να καταπιούν το σκεύασμα. Μετά την κατάποση οι κάμπιες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες. **2.** Μην ψεκάσετε εάν αναμένεται βροχή. Εάν βρέξει (σε διάστημα 7-10 ημερών) μετά από ψεκασμό, τότε αυτός πρέπει να επαναληφθεί. **3.** Υπάρχει αντιστοιχία αριθμών μεταξύ εντόμων και φυτών (που προσβάλλονται από αυτά τα έντομα) όπως, π.χ. η πιερίδα (1) προσβάλλει το λάχανο (1) και το κουνουπίδι(1), κ.ο.κ. **4.** Έχει διαπιστωθεί ότι τα έντομα αναπτύσσουν ανθεκτικότητα σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται συνεχώς για την καταπολέμηση τους. Για να αποφευχθεί τέτοιου είδους ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται εναλλαγή δραστικών συστατικών με διαφορετικό τρόπο δράσης.

5. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: Εσπεριδοειδή: 200-400 λίτρα. **Ακρόδρυα:** 100-200 λίτρα. **Μηλοειδή:** 100-200 λίτρα. **Πυρηνόκαρπα:** 150-250 λίτρα. **Αμπέλι:** 50 150 λίτρα. **Ελήα:** 150-300 λίτρα. **Τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα:** 50-100 λίτρα. **Κουνουπίδι, λάχανο:** 100 λίτρα. **Μαρούλι:** 60-80 λίτρα. **Αγκινάρα:** 100 λίτρα. **Πράσα:** 50-80 λίτρα. **Βαμβάκι:** 50-80 λίτρα. **Καλαμπόκι:** 50-100 λίτρα. **Καπνός:** 50-150 λίτρα. **Καλλωπιστικά:** 50-200 λίτρα. **Δασικά δένδρα:** 150-250 λίτρα.

Ημερομ. Παρασκευής:
Ημερομ. Λήξης:
Αριθμός Παρτίδας:

BATH 16-7/07

BATHURIN® 16.000 WP
Βρέξιμη σκόνη

BATHURIN®
16.000 WP
Βρέξιμη σκόνη

(ΜΠΑΘΟΥΡΙΝ)

Εγγυημένη σύνθεση:

δ-Endotoxin/Ενεργός πρωτεΐνη υπό μορφή κρυστάλλων του B. thurigiensis var.Kurstaki 3,2% β/β ή 16000 IU/mg
Αδρανείς και βοηθητικές ουσίες: 82,2% β/β

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Βιολογικό
εντομοκτόνο στομάχου
με εκλεκτική δράση κατά
προνυμφών λεπιδοπτέρων

Xn - Xi



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση
όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα

Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες.
Αριθμ. Εγκρ. κυκλοφορίας: 6844/21-12-2001

Καθαρό βάρος: 500 γραμ.

Τυποποιτής - ISAGRO BIOFARMING, Ιταλίας
Παρασκευαστής-Συσκευαστής:

ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ® ΑΒΕΕ

Δυρραχίου 70, 104 43 Αθήνα, Τηλ.: 210 514 2470
210 514 2255, FAX: 210 514 3465
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 22620-30 804, FAX: 22620- 30 805



Μέρος του



BATHURIN® 16.000 WP

Προφυλάξεις: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε. Μην αναπνέετε την σκόνη. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Να φοράτε κατάλληλα γάντια.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Σε περίπτωση κατάποσης, σταματήστε την εργασία και καλέστε γιατρό. Προκαλέστε εμετό ενεργώντας στο βάθος του φάρυγγα με μη αιχμηρό αντικείμενο.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 77 93 777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψης φυλλώματος. Ειδικά για την ευδεμίδα και κογχυλίδα στο αμπέλι, ο ψεκασμός να γίνεται στη ζώνη των τσαμπιών.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε λίγο νερό. Προσθέτουμε το πυκνό διάλυμα στο μισογεμάτο με νερό ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνουμε με νερό υπό συνεχή ανάδευση. Ψεκάσουμε με το ψεκαστικό υγρό μέσα σε λίγες ώρες. Σε περίπτωση ανάμιξης με άλλο σκεύασμα διαλύουμε πρώτα το BATHURIN και μετά προσθέτουμε το άλλο σκεύασμα.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης και για τις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν όξινη ή αλκαλική αντίδραση όπως οξυχωριούχος χαλκός ή διαφυλλικά λιπάσματα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Το BATHURIN μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενη και χωρίς υγρασία αποθήκη σε θερμοκρασία 10-25 βαθμούς C στην αρχική του απαράβαστη συσκευασία μακριά από το ηλιακό φως.

Στις παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.