

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.
- Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
- Φοράτε κατάλληλη μάσκα κατά την εφαρμογή.
- Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία, γάντια και κατάλληλες μπότες, εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής, μετά τον ψεκασμό.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 50 κ.εκ.



Bifenazate (Μπιφenoζέιτ) 48%
Συμπυκνωμένο αιώρημα

Βοηθητικές ουσίες: 54,2% β/β

2184/04.04.2012

για την καταπολέμηση κινητών μορφών ακάρεων
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
 Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Κάτοχος της έγκρισης: Chemtura Europe Limited, - Berkshire, Ηνωμένο Βασίλειο

Υπεύθυνος για την τεχνική συγγραφή και σύνταξη-διορθώσεις:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνική Αντιστάσεως 73, 15231 Χαϊρόντο

Toll: 211-205555 ext. 211-205559

Өзгөчө/үйүн: Т.Ө. 1343, Т.К. 57008 №10/0

Tiň.: 2310784931-6, doi: 2310780453

Egyesüdtárs: Önkéntes Barátok



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

xi



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΔΡ.ΠΑΡΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βρέψε επί της συσκευασίας.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

**ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗ-
ΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:** Διατηρείται στην αρχική του συ-
σκευασία, καλά κλειστό, σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο,
προστατευμένο από παγετό. Σε αυτές τις συνθήκες, παραμένει
(2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

**ANXIETE
FAO**

ΑΚΡΑΜΑΪΤ: Ακαρεοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση των κινητών μορφών των ακάρεων. Έχει μέτρια ωοκτόνο δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος με καλή διαβροχή των φυτών.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος, αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε στη συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΦΡΑΟΥΛΑ (υπαίθρου): Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*, *Tetranychus cinnabarinus*). Δόση: 20-25 κ.εκ. σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό (20-25 κ.εκ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων ακάρεων. **ΦΡΑΟΥΛΑ (θερμοκηπίου):** Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*, *Tetranychus cinnabarinus*). Δόση: 20-25 κ.εκ. σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό (20-30 κ.εκ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων ακάρεων. **ΠΙΠΕΡΙΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ-ΑΓΓΟΥΡΙ-ΚΟΛΟΚΥΘΙ-ΠΕΠΟΝΙ-ΚΑΡΠΟΥΖΙ (υπαίθρου-θερμοκηπίου)-ΤΟΜΑΤΑ (θερμοκηπίου):** Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*, *Tetranychus cinnabarinus*). Δόση: 20-25 κ.εκ. σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό (20-37,5 κ.εκ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων ακάρεων.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): Φράουλα υπαίθρου (100), Φράουλα θερμοκηπίου (100-120), Πιπεριά-Μελιτζάνα-Αγγούρι-Κολοκύθι-Πεπόνι-Καρπούζι (υπαίθρου & θερμοκηπίου)-Τομάτα θερμοκηπίου (100-150).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Δύο (2) εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών.

Παρατηρήσεις: Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την πυκνότητα του πληθυσμού των ακάρεων.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Φράουλα-Πιπεριά-Μελιτζάνα-Αγγούρι-Κολοκύθι-Πεπόνι-Καρπούζι-Τομάτα: **1 ημέρα** (Υ+Θ).

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα, όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες καλλιεργείες, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής, στις ελλήνικες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

•Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων, ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για τον αποτελεσματικό έλεγχο των ακάρεων. •Να παρακολουθείται συστηματικά η καλλιεργεία. Συνίσταται να πραγματοποιούνται εφαρμογές, μόνο όταν είναι απαραίτητο, με βάση τα όρια οικονομικής ζημιάς (εφόσον υπάρχουν) και με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για τα ωφέλιμα αρθρόποδα εντός της καλλιεργείας. Η επέμβαση να πραγματοποιείται πριν την εγκατάσταση υψηλού πληθυσμού ακάρεων. •Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της άνω και κάτω φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. •Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με **Acramite® 480SC**. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με ακαρεοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης. •Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων, ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν, θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλη σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.