

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ● Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. ● Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε. ● Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. ● Να φοράτε κατάλληλα γάντια. ● Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

“ Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης. ”

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση αδιαθεσίας από εισπνοή ψεκαστικού υγρού, μετακινήστε στον καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα επιμεινούν, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, κρατώντας τα βλεφαρα ανοικτά. Αν προκληθεί ερεθισμός, συμβουλευτείτε αμέσως οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση κατάποσης, να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77.93.777

Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί ρύπανση του περιβάλλοντος. Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

Περιορισμοί-προφυλάξεις σε περίπτωση εφαρμογής του στα πεύκα:- Πριν από την εφαρμογή του σκευάσματος σε κοινόχρηστους χώρους, οι Δήμοι υποχρεούνται να προειδοποιούν τους κατοίκους για τον επικείμενο ψεκασμό.

-Οι Δήμοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την επισήμανση των περιοχών όπου έγινε εφαρμογή.-Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σκευάσματος (τόσο σε κοινόχρηστους όσο και σε ιδιωτικούς χώρους) και έως ότου στεγνώσουν τα ψεκασθέντα μέρη των πεύκων, να μην εισέρχονται άνθρωποι (πλην του ψεκαστή) και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόμενη περιοχή.

-Σε κοινόχρηστους χώρους (πάρκα, σχολεία) απαιτείται διάστημα 24 ωρών για την είσοδο των ανθρώπων.

-Η χρήση του σκευάσματος για την αντιμετώπιση του εντόμου *Marchallina hellenica* σε πεύκα στικών και περιστικών περιοχών, θα πραγματοποιείται:

α) Σε κοινόχρηστους χώρους, με ευθύνη των κατά τόπους Δήμων και Κοινοτήτων, οι οποίοι: θα καθορίσουν την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής του σκευάσματος και θα λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης για την ασφαλή χρήση του.

β) Σε ιδιωτικούς χώρους (αυλές σπιτιών, οικόπεδα κλη), με ευθύνη των ενδιαφερόμενων. Η εφαρμογή θα διενεργείται τον χρόνο που γίνεται εφαρμογή στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω χώρων, να συνεργάζονται με τους υπευθύνους των Δήμων που επιβλέπουν την εφαρμογή του σκευάσματος στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής, και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Διατηρείται στην αρχική του αδιαβρήχτη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από πηγές θερμότητας. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο χρόνια.

Ηρ. Παροσκάνης, Ηρ. Λήξης, Αρ. Παρίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας

ADMIRAL^{10EC}

ΠΥΡΙΠΡΟΧΥΦΕΝ (ΠΥΡΙΠΡΟΞΙΦΕΝ) 10%

Εγγυημένη σύνθεση: pyriproxifen 10 % β/ο

βοηθητικές ουσίες: 88,79% β/β

Χημική ομάδα: παράγωγα πυριδινίλης (pyridinil)

ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (ΕC)

Αρ. Έγκρ. κυκλοφορίας:

1874 / 5.05.05

Εντομοκτόνο μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων. Επιδρά στη μορφογένεση, την αναπαραγωγή και την εμβρυογένεση των εντόμων, ανάλογα με το στάδιο της ανάπτυξης τους (ωό, προνύμφη, νύμφη, ακμαιο), παρεμποδίζοντας την ομαλή εξέλιξη και ενηλικίωσή τους

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το σκεύασμα να μην εφαρμοστεί κοντά σε λίμνες, ποτάμια και γενικά υδάτινο περιβάλλον. Απαγορεύεται: ● η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς ● η εφαρμογή του σε δασικά οικοσυστήματα ● η εφαρμογή του σε πεύκα που έχουν μελιτώδη εκκρίματα και όταν παρατηρείται δραστηριοποίηση των μελισσών

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

Ερεθίζει το δέρμα. Επιβλαβές, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνευμόνες σε περίπτωση κατάποσης.

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Παρασκευαστής:
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S,
2 RUE CLAUDE CHAPPE,
69370 SAINT DIDIER AU MONT D' OR, Γαλλία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:



ΑΘΗΝΑ: Φλέμιγγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ, 57022 Σίνδος, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδας Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9
e-mail: info@hellasfarm.gr

**Περιεχόμενο:
1 ΛΙΤΡΟ**



ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΕΧΘΡΟΙ ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./100 λίτρα νερό) -ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά): Λεκάνια, Δόση:30-50. Κόκκινη ψώρα των εσπεριδοειδών. Μυτιλόμορφη ψώρα των εσπεριδοειδών. Παρλατόρια. Δόση:50-75. Ένας ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων της 1^{ης} γενεάς.

ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ: Ψώρα του San Jose, Βαμβακάδα. Δόση:30. Ένας ψεκασμός πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων της 1^{ης} γενεάς.

ΚΕΡΑΣΙΑ: για Ψώρα San Jose (*Quadraspidiotus perniciosus*) και βαμβακάδα (*Pseudalacaspis pentagona*).

Δόση:30. Ένας ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων 1ης γενιάς και οπωσδήποτε πριν την άνθηση. Βλέπε παρατήρηση 4.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: Ψώρα του San Jose, Βαμβακάδα. Δόση:30. Ένας ψεκασμός πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων της 1^{ης} γενεάς.

ΕΛΙΑ: Λεκάνιο. Δόση:30. Ένας ψεκασμός πριν την άνθηση και εφόσον εμφανιστούν οι προνύμφες της πρώτης γενιάς. Δευτερεύουσα δράση κατά της παρλατόριας.

ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ (Θερμοκηπίου): Αλευρώδεις (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*). Δόση:50. Δύο ψεκασμοί (με μεσοδιάστημα επεμβάσεων 10 ημέρες όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 25 °C και 15 ημέρες όταν είναι μικρότερη) που αρχίζουν με την άνθηση των πρώτων ακμαίων (1).

ΒΑΜΒΑΚΙ: Αλευρώδεις (*Bemisia tabaci*). Δόση:50 κ. εκ/στρέμμα. Ένας ψεκασμός πριν το άνοιγμα των καρυδίων και με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων.

Πεύκα στικών και περιστικών περιοχών: *Marchallina hellenica*. Δόση 75. Ένας ψεκασμός όταν έχει εκκολληθεί το 70-75% των νυμφών (ερπουσών) και όταν τα πεύκα δεν έχουν μελιτώδη εκκρίματα και δεν παρατηρείται δραστηριοποίηση των μελισσών και με την προϋπόθεση ότι για τον ίδιο σκοπό δεν θα χρησιμοποιηθεί και άλλο φυτοπροστατευτικό προϊόν την ίδια χρονική περίοδο. Ο ακριβής χρόνος επέμβασης θα προσδιορίζεται από τους γεωπόνους των δήμων και κοινοτήτων ή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή άλλης κρατικής υπηρεσίας.

Παρατηρήσεις: 1) Σε περίπτωση που ο πληθυσμός των ακμαίων αλευρώδων είναι σε υψηλά επίπεδα, να χρησιμοποιείται κατάλληλο ακμαιοκτόνο ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός και κατόπιν να εφαρμόζεται το ADMIRAL 10 EC. 2) Το ADMIRAL 10 EC είναι συμβατό με προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης. 3) Ψεκαστικό υγρό (λίτρα/στρέμμα): Εσπεριδοειδή 200-300, Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδάκινα, Βερικοκία, Νεκταρινιά 80-100, Κερασιά 80-100, Ελιά 100-125, Κηπευτικά 100-150, Βαμβάκι 40-80. 4) Για τη χρήση στην κερασιά, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη συγκεκριμένη χρήση ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα κατά τη χρήση του σκευάσματος.

Τρόπος δράσης: Το ADMIRAL 10 EC είναι εντομοκτόνο μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων. Συγκεκριμένα έχει επίδραση: α) στα αυγά ηλικίας 1-3 ημερών όπου η εκκόλαψη περιορίζεται ή επιβραδύνεται και παρατηρούνται μετεμβρυακές αλλαγές, β) αναστέλλει τη μεταμόρφωση των προνυμφών, γ) προκαλεί παρεμπόδιση της έκδυσης των νυμφών και της εμφάνισης των ακμαίων και δ) έχει στεριωτικές ιδιότητες στα θηλυκά, με αποτέλεσμα μειωμένη ωοτοκία και ελάττωση της βιωσιμότητας των αυγών. Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος στα έντομα-στόχους εμφανίζεται πιο αργά και σταδιακά συγκρινόμενη με αυτήν των εντομοκτόνων που δρουν στο νευρικό σύστημα των εντόμων. Η μετακίνηση της δραστηρικής ουσίας pyriproxifen στα φυτά είναι διελασματική.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης. Σε περίπτωση εφαρμογής του στα πεύκα ψεκασμός, με καλή διαβροχή, των προσβεβλημένων από το *Marchallina hellenica* μερών των πεύκων.

Η εφαρμογή του σκευάσματος στα πεύκα θα γίνεται παρουσία Γεωπόνου.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάζετε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχανήμα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Εσπεριδοειδή: 28 ημέρες, κηπευτικά θερμοκηπίου: 3 ημέρες.

ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΕΛΙΑ: Μην εφαρμόζουμε (εφαρμογή πριν την άνθηση).

ΒΑΜΒΑΚΙ: Μην εφαρμόζουμε (εφαρμογή πριν το άνοιγμα των καρυδίων). **ΠΕΥΚΑ:** Μην εφαρμόζουμε