L164157 GREC/2Q

Affirm®

095 SG

syngenta®

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μπαστούνιας με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε ανοιξάντας την συκκτιμώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό ανοιξάντας συκκτιός. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να ανακάτεύεται καλά πριν αρχίσει ο ψεκασμός.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μπαστούνιας με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε ανοιξάντας την συκκτιμώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό ανοιξάντας συκκτιός. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να ανακάτεύεται καλά πριν αρχίσει ο ψεκασμός.

Οδηγίες για την ασφαλή απόρριψη του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Το κενό υδατικό συσκευασίας ξεπλένονται από πάτση με κατάλληλο μπαστούνι ή νίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερό του ξεπλύματος τα ρίνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαστείας χρήσης, ανακυκλώνται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:
1. Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων-στόχων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στο αποδεκτός απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.
2. Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητες, με βάση τα όρια οικονομικής ζημιάς (εφόσον υπάρχουν) και με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για τα ωφέλιμα αρθρόποδα.
3. Το AFFIRM 095 SG θα πρέπει να εφαρμόζεται στη καταλληλη χρονική στιγμή, σύμφωνα με πίνακα ευαισθησία βιολογικά σταδία των εντόμων-στόχων.
4. Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.
5. Μη σπαρέλιγκτα οι διαδοχικές εφαρμογές με AFFIRM 095 SG. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με δοσοροστικό τρόπο δράσης. Στις περιπτώσεις παρακολούθησης των πληθυσμών του εντόμου-στόχου και όπου απαιτούνται πολλαπλές εφαρμογές ανά έτος ή καλλιεργητική περίοδο για αποτελεσματικό έλεγχο (π.χ. Lobesia botrana, Helicoϊna armigera), διαδοχικές γενιές των εντόμων-στόχων συνίστεται να μην ανταλλασσόνται με σκευάσματα της ίδιας ομάδας.
6. Μη δοσολογούνται συστηματικές έλεγχοι των πληθυσμών των ενήλικων-σπάλων ώστε να ενεπιοθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Μπίπλο, Τομάτα (Θ+Υ), Πιπεριά (Θ+Υ), Μελιτζάνα (Θ+Υ), Αγγούρι (Θ), Πεπόνι (Θ+Υ), Καρπούζι (Θ+Υ), Κολοκυθάκι (Θ), Μαρούλι (Θ+Υ), Μπροκόλο, Λάχανο, Κουνουπίδι, Πράσινο φασολάκι (με λοβό): 3 μέρες;
Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Αμπέλι (επιτρ.&ονομ.): 7 μέρες;
Βαμβάκι: 28 μέρες; *Φασολιάς, Αγκινάρα:* 1 μέρα.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από τα άμεσα ηλιακό φώς και υγρασία σε θερμοκρασίες πάνω από -10° C έως 35° C.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 kg e

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
*• Φυλάσσετε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
• Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εκτίθενται στο πεδίο εφαρμογής μετά του ψεκασμού. • Το υπόλοιπο αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αλλοιώνετε την ετικέτα του στο περιβάλλον. Αντιφορείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.*

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ξιπασμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Να μην προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: *Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.*
Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες. Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται μετά το πέρας της πτήσης των μελισσών, αργά το απόγευμα.

Τοξικό για τις μέλισσες.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να προστατεύετε τους υδρόβιους οργανισμούς να σέβεστε μιαν ασφάλεια ζώνη προστασίας 5 μέτρων για την καλλιέργεια του βαμβακιού και των κηπευτικών ξηρών/ωμών (<50 εκ.), 10 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού και των υπόλοιπων κηπευτικών (>50 εκ.) και 50 μέτρων από τις καλλιέργειες των σπορμών και από τα επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατεύετε μη στοχευόμενα φυτά να σφίξετε μιαν αβέλιαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της μηλιάς.
Επικίνδυνο για τις μέλισσες.
Για να προστατεύετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος δράσης: Δρα κυρίως με κατάποση. Προσβάνεται στους υπόδοκτε του γαμαγκλιοτιμικού οξέως (GABA) και ενεργοποιεί το κανάλι ιόντων κλωρίου. Η συνεχής ενεργή ιόντων κλωρίου στο μυϊκό κύτταρο οδηγεί στην παράλυση και τελικά το θάνατο των εντόμων.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός κοπλήμεως φυλλώματος.

L164157 GREC/2Q

Affirm®

095 SG

syngenta®

Emamectin benzoate, (ομάδα αβερμεκτίνες)

Υδατοδιαλυτού κόκκου (SG)

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ. Προϊ.: 14384/3-4-2012

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Emamectin benzoate 0,95% β/β
Βοηθητικές ουσίες 99% β/β

Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση λεπιδοπτέρων εντόμων που προσβάλλουν κηπευτικά, αμπέλι, βαμβάκι, μηλιά, ροδακινιά και άλλες καλλιέργειες. Παρουσιάζει διελασματική κίνηση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: **Syngenta Crop Protection AG**, Elβετία
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: **Syngenta Hellas A.E.B.E.**
Ανθούσα, Αττικής. Τηλ.: 210 6666612-13
www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΝΙΚ: Β/ΠΕ. Φ. Σύνδος, Τηλ.: 231 0796940-3
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: **Syngenta Hellas A.E.B.E.**
Ονόμαστα Βοιωτίας, Τηλ.: 2262 051600

N

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 kg e

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΧΘΡΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Μπίπλο για Καρπόκαψη της μηλιάς (Cydia pomonella) και για Κοψίλα (Argyrotaenia ljungiana), Ροδακινιά-Νεκταρινιά για Βλαστοφαγάκη της ροδακινιάς (Cydia molesta) και για Ανάρσια (Anarsia lineatella): 200-250 γρ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 200-325 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-130 λίτρα/στρέμμα. Αμπέλι (επιτρ. & ονομ.) για Ευδεμίδα (Lobesia botrana) και για Κοκκοβίνη (Cydia ambiguella): Τομάτα (Υ) για Πράσινο σκουλήκι (Helicoϊna armigera), για Σπανιόπτερα (Spodoptera spp.) και για Φυλλόρυκτη της τομάτας (Tuta absoluta), Πιπεριά (Υ)-Μελιτζάνα (Υ)-Πεπόνι (Υ)-Φασολάκι (Θ + Υ)-Αγκινάρα για Πράσινο σκουλήκι (Helicoϊna armigera) και για Σπανιόπτερα (Spodoptera spp.), Καρπούζι (Υ) για Σπανιόπτερα (Spodoptera spp.), Μπιζέλι για Σπανιόπτερα (Spodoptera spp.) και για Πιβοκτόνο (Plutella xylostella), Λάχανο-Κουνουπίδι για Πράσινο σκουλήκι (Helicoϊna armigera), για Σπανιόπτερα (Spodoptera spp.) και για Πιβοκτόνο (Plutella xylostella) και για Πεταλίδα (Pieris spp.): 150 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Τομάτα (Θ) για Πράσινο σκουλήκι (Helicoϊna armigera), για Σπανιόπτερα (Spodoptera spp.) και για Φυλλόρυκτη της τομάτας (Tuta absoluta), Πιπεριά (Θ)-Μελιτζάνα (Θ)-Πεπόνι (Θ) για Πράσινο σκουλήκι (Helicoϊna armigera) και για Σπανιόπτερα (Spodoptera spp.), Καρπούζι (Θ) για Σπανιόπτερα (Spodoptera spp.): 150 γρ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 120-225 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-150 λίτρα/στρέμμα. Αγγούρι (Θ)-Κολοκυθάκι (Θ) για Σπανιόπτερα (Spodoptera spp.): 150 γρ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 75-225 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-150 λίτρα/στρέμμα. Βαμβάκι για Πράσινο σκουλήκι (Helicoϊna armigera): 150 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρέμμα. Πράσινο Φασολάκιο (με λοβό) για Πράσινο σκουλήκι (Helicoϊna armigera) και για Σπανιόπτερα (Spodoptera spp.): 150 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-80 λίτρα/στρέμμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ –
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
Μπίπλο, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Αμπέλι (επιτρ. & ονομ.): Εφαρμογή σύμφωνα με τις συστάσεις των Τοπικών Κέντρων Γεωργικών Προειδοποιήσεων ή με την εμφάνιση της προσβολής. Μέχρι 3 εφαρμογές (εφόσον απαιτείται με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες.
Όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες: Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Μέχρι 3 εφαρμογές (εφόσον απαιτείται με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες.

Παρατηρήσεις:
1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την πυκνότητα του πληθυσμού.

Αρ. Παρτίδας: Βλέπε φάκελο
Ημ/νία Παραγωγής: Βλέπε φάκελο