

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. •Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση κατάποσης,** να μην προκαλέσετε έμετο. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του. **Σε περίπτωση δηλητηρίασης,** καλέστε γιατρό για την παροχή πρώτων βοηθειών. **Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:** 21 0793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ν



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΞΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
•Φυλάξτε το χωριστά από γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και απόρρυς. •Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικό μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. •Να μη απένδρννται χειμερινά σιτηρά και αραβόσιτος στο ίδιο χωράφι πριν περάσουν 3 μήνες από την εφαρμογή του Agil® 10 EC. •Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. •Μην αδειάζεται το ψεκαστικό υγρό πιο κοντά από 50 μέτρα από μέρη που έχουν νερό. •Αν ρυπαίνονται τα νερά άρδευσης, να μη χρησιμοποιηθούν πριν περάσουν 24 ώρες. •Μην ψεκαζέτε όταν φυσάει. •Μη διηποικεζάτε τα άκρα των ποταμών. •Μην αδειάζετε τις δόσεις. •Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται. •Μετά τον ψεκασμό, ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορριπαίνετε.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όσα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανακίνηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Διατηρείται στην αρχική του απορριβαστική συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από τον ήλιο και την υγρασία και σε θερμοκρασία από -10°C έως +35°C. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



04/2010-4



**Propaquizafop (Προπακιζαφόπ) 10%
Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο**

Εγγυημένη σύνθεση: **Propaquizafop 10% β/ο**
Βοηθητικές ουσίες: 89,46% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Φ. : 7537/29.02.2000
Ημ. λήξης: 31.05.2014

**Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο
ετησίων και μερικών πολυετών
αγρωστωδών ζιζανίων**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
ΥΠΟΠΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ



Κάτοχος της έγκρισης-Υπευθυνός για την τελική συσκευασία και σήμανση-Διανομέας:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαϊλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Θεσο/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωάννα
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΑΤΖΙΑ:
Καταπολέμηση ετησίων αγρωστωδών και μερικών πολυετών ζιζανίων, μεταφυτρωτικά. Το προπακιζαφόπ απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων και μεταφέρεται στις ρίζες, στους στέλες και στα ριζώματα. Τα ψεκασμένα ζιζάνια σταματούν να αναπτύσσονται 1-2 ημέρες μετά την εφαρμογή. Τα νεώτερα φύλλα γίνονται κίτρινα και το χαμηλότερο μέρος των βλαστών νεκρώνεται. Τελικά όλο το ζιζάνιο καταστρέφεται μέσα σε 10-20 ημέρες, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Το Agil® 10 EC εφαρμόζεται με ψεκασμό επιφανείας σε φυτρωμένα ζιζάνια νεαρού σταδίου ανάπτυξης, με ψεκαστές μέσου όγκου με 20-60 λίτρα νερό/στρέμμα, με πίεση μέχρι 3 atm και μικρό τύπου σκόνης. Δεν απαιτείται επιπλέον ποσότητα διαβρεκτικού παράγοντα σε ψεκαστικό υγρό.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με το μισό του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΑΜΠΕΛΙ-ΤΟΜΑΤΑ-ΒΑΜΒΑΚΙ-ΠΑΤΑΤΑ-ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ-ΚΑΠΝΟΣ-ΠΕΠΟΝΙ-ΦΑΣΟΛΙ-ΜΗΔΙΚΗ: Ετήσια και μερικά πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια*. Δόση: α) 75-120 κ.εκ./στρ. για **Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια**. Ψεκασμός φυλλώματος μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους των ζιζανίων, β) 150-200 κ.εκ./στρ. για **Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια**. Ψεκασμός φυλλώματος μεταφυτρωτικά, όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 15-20 εκ. γ) 100-150 κ.εκ./στρ. μόνο για το **βελιούρα**. Ψεκασμός φυλλώματος μεταφυτρωτικά, όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 30-40 εκ.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-60 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιερητική περίοδο: Μία (1) εφαρμογή.

Παρατηρήσεις:
•Η εφαρμογή συνιστάται να γίνεται πριν καλυφθούν τα ζιζάνια από την καλλιέργεια. Η δόση εφαρμογής κυμαίνεται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων. •Για την καταπολέμηση της αγριόδα, μπορούν να εφαρμοσθούν εναλλακτικά δυο ψεκασμοί με την δόση 100 κ.εκ./στρ., ως εξής: 1) όταν βλαστήσει έχουν μήκος 10-15 εκ. και 2) μια εβδομάδα αργότερα. •**Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια (ετήσια και πολυετή):** Αγρωστή, Αλεονοπούρα, Αγριοβρώμη, Βρόμος, Αγριόδα, Αμαράνθο, Μουκράτα, Ελεούλη, Έλμυς, Αγριοκάρβου, Ποιόνυδη ήρα, Λεπτή ήρα, Φάληρη, Τραχεία βλαδοπόδα, Λεία βλαδοπόδα, Στάρι, Βελιούρα, •**Ανθεκτικά ζιζάνια:** Όλα τα πλατύφυλλα ζιζάνια και τα καλαμιά (*Phragmites spp.*).

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Αμπέλι-Καπνός-Πεπόνι: 49 ημέρες. Ζαχαροτεύτλη: 90 ημέρες για ρίζες και ζωοτροφή. Τομάτα: 21 ημέρες. Βαμβάκι-Μηδική: 90 ημέρες. Πατάτα: 42 ημέρες. Φασόλι: 56 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
Σε μενδές δόσεις εφαρμογής, μπορεί να εμφανισθούν συμπτώματα χλώρωσης στα φύλλα της πατάτας, τα οποία όμως είναι παροδικά και δεν επηρεάζουν τελικά την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής. Στις λοιπές καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις δεν είναι φυτοτοξικό.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Η συνδυάζεται με προϊόντα που έχουν αλκαλική αντίδραση. Σε περίπτωση εφαρμογής πλατυφυλλοκτόνων ζιζανιοκτόνων, που δεν έχει δοκιμασθεί η συνδυαστικότητα τους με το Agil® 10 EC, προτείνεται μεσοδιάστημα 3 τουλάχιστον ημερών μεταξύ των ψεκασμών.