

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

Φοράτε κατάλληλες μπότες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται μετά την ώρα συλλογής των μελισσών (αργά το απόγευμα). Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για 1 ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Να μη δώσετε υγρό και να μην προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

Πληροφορίες για το γιατρό: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**



Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: ΒΛΕΠΕ ΦΙΛΙΝ

ALE 10 EC

cypermethrin
(ομάδα πυρεθρινοειδή)

Εγγυημένη σύνθεση: Cypermethrin 10% β/ο
Βοηθ. ουσίες: 88,4% β/β

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

**Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο
επαφής και στομάχου.**

Επίσης ασκεί αντιτροφοκική δράση

Xn



- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Ερεθίζει το δέρμα.
- Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
- Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.
- Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Εγκρ. Κυκλ.: 14377/28-12-2011

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

Κάτοχος της έγκρισης: CEDRE SA, Av. Jean Foucault, 34500 BEZIERS, Γαλλία

Παρασκευαστής σκευάσματος -

Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: SBM FORMULATION, Γαλλία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Φυλής 232, 112 52 ΑΘΗΝΑ

Διανομέας:

Ε.Κ.Ε. Ευθυμιώδη αδελφ.

ΒΙ.ΠΕ.Θ.ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΤΗΛ. 2310 568656 • FAX: 2310 798423 • e-mail: info@efthymidis.gr

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης ασκεί αντιτροφοκική δράση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Αμπέλι: για Ευδεμίδα, Κογχυλίδα στη δόση 30-60κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση /στρέμμα:30κ.εκ.) με 50-100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: Μέχρι 2 με μεσοδιάστημα 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Μαρούλι (υπαίθρου-θερμοκηπίου): για Πράσινο ακουλήκι, Πράσινη αφίδα στη δόση 37-50κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση /στρέμμα:30κ.εκ.) με 60-80 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 1.

Τομάτα, Μελιτζάνα (υπαίθρου-θερμοκηπίου): για Πράσινο ακουλήκι, Πράσινη αφίδα στη δόση 30-60κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση /στρέμμα:30κ.εκ.) με 50-100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 1.

Λάχανο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο (υπαίθρου): για Πράσινη αφίδα στη δόση 30κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση /στρέμμα:30κ.εκ.) με 100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: Μέχρι 2 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Παρατήρηση:

Οι μικρές δόσεις σκευάσματος ανά 100λίτρο χρησιμοποιούνται με τους μεγάλους όγκους ψεκαστικού διαλύματος και οι μεγάλες δόσεις σκευάσματος ανά 100λίτρο με τους μικρούς όγκους ψεκαστικού διαλύματος, έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα (30 κ. εκ.).

Τρόπος εφαρμογής: Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμό φυλλώματος εξασφαλίζοντας πολύ καλή και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό κατά 3/4 και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.
- Εφαρμογές, μόνο όταν είναι απαραίτητο, με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς και με τρόπο ώστε να μην μειώνεται ο κίνδυνος για τα ωφέλιμα αρθρόποδα.
- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.
- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με ALE 10 EC. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τα πυρεθρινοειδή.
- Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιεργείες και δόσεις εφαρμογής.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

-Αμπέλι, Μαρούλι, Λάχανο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Τομάτα υπαίθρου, Μελιτζάνα υπαίθρου: **7 ημέρες**

-Τομάτα θερμοκηπίου, Μελιτζάνα θερμοκηπίου: **3 ημέρες**

0214