

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:				
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος εφαρμογής - χρόνος εφαρμογής
		κ.εκ./ στρέμμα (max)	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρ. λίτρα/ στρέμμα
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ	Κερκόσπορα (Cercospora beticola) Οϊδίο (Erysiphe communis)	40-80	100-200	40
ΡΥΖΙ	Pyrricularia oryzae	100	–	20-40
ΣΙΤΑΡΙ	Septoria tritici, Puccinia recondita	60-100	–	20-30
ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ	Alternaria brassicae, Sclerotinia sclerotiorum	80-100	–	20-30

Παρατηρήσεις:
• Στο ρύζι η εφαρμογή να πραγματοποιείται από το στάδιο του φουσκώματος του κολλεού - BBCH 41 (Booting stage) μέχρι του τέλους του ξεσταχυάσματος- BBCH 59(end of heading). Όγκος ψεκαστικού υγρού 200-400 l/ha. Η εφαρμογή να πραγματοποιείται σε χωράφια που δεν είναι πλημμυρισμένα (το έδαφος πρέπει να είναι κορεσμένο αλλά όχι πλημμυρισμένο, και το φύλλωμα της καλλιέργειας συγκρατεί το προϊόν για να μη φτάσει στο έδαφος). Οι εφαρμογές του νερού της καλλιέργειας αναπροσαρμόζονται μετά την εφαρμογή.
• Στο σιτάρι η πρώτη εφαρμογή να πραγματοποιείται στο στάδιο BBCH 39 και η δεύτερη εφόσον απαιτείται όχι μετά το στάδιο BBCH 69.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση των προϊόντων και της συσκευασίας:
Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ξέπλυση (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα ή αχίρω, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:
Δύο (2) χρόνια τουλάχιστον αν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία χωρίς να ανοιχθεί, σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος. Προφυλάξτε το σκεύασμα από τον παγετό.

Αρ. Πατίδας:
Ημ/νία Παραγωγής:



L171617 GREC/4R



syngenta®

Azoxystrobin (αζοξυστρομπίνη)

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Αναπ. & Τροφ.:
60359/08-04-13

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Azoxystrobin 25% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 76,2% β/β

Μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντιπροπογόνο δράση. Περιέχει το δρών συστατικό azoxystrobin

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Προσρίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 666612-13
www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lte



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

TM

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
• Διατηρείστε την αρχική συσκευασία ερμητικά κλεισμένη. • Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος. • Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. • Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και τον ψεκασμό. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Από αναπνοή: Απομακρύνετε τον ασθενή από τον χώρο που εκτέθηκε και κρατήστε τον να αναπνέει σε ζεστό χώρο. Ενημερώστε τον γιατρό προληπτικά. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν μολυνθεί και ξεπλύνετε τα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα, συμπεριλαμβανόντας τα μαλλιά και τα νύχια, με νερό και σαπούνι. Αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα για να ελαχιστοποιήσετε την έκθεση στον δερματός. Τα λερωμένα ρούχα θα πρέπει να πλυθούν πριν ξαναφορεθούν. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό ή ειδικό διάλυμα για τα μάτια, κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα τουλάχιστον για 5 λεπτά. Ζητήστε την συμβουλή γιατρού. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως συμβουλή γιατρού και δείξτε του το δοχείό ή την ετικέτα. Εάν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του ξεπλύνετε του το στόμα με νερό. Μην του προκαλέσετε εμετό. **Περαιτέρω θεραπευτική αγωγή – Αντίδοτο:** Συμπτωματική και υποστηρικτική αγωγή όπως ενδείκνυται.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλήψευς. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευση. Τα κενά συσκευασίας ξεπλύνετε τα πολλές φορές ρίχνοντας το νερό στο ψεκαστικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Δόση εφαρμογής: Εφαρμόζετε τις χαμηλότερες δόσεις όταν η πίεση του μολυσματος είναι ακόμα χαμηλή (προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων) και τις υψηλότερες όταν η πίεση του μολυσματος είναι μεγάλη (συνηθισμένες εννοίες για την ανάπτυξη της ασθένειας).

Ποσότητα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα: Ψεκάστε με τον απαραίτητο όγκο νερού ώστε να επιτευχθεί καλή κάλυψη και διείσδυση της φυλλικής επιφάνειας από το ψεκαστικό υγρό.

Χρόνος εφαρμογής: Εφαρμόστε το Amistar προληπτικά, πριν ή αμέσως μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα, για βέλτιστα αποτελέσματα προλαμβάνει η εφαρμογή να γίνεται πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της προσβολής. Να μην αναμινύεται με προσκαθλητικά καθώς και με σκευάσματα με ισχυρή προσκολλητική ή διαλυτική δράση. Να αποφεύγεται η ανάμιξη με Υγρά Γοακτωματοποιήσιμα σκευάσματα (EC).

Διασείριση Ανθεκτικότητας: • Μείγματος αριθμός εφαρμογών 1-2 ανά καλλιεργητική περίοδο ανάλογα με τις καλλιεργείες. • Αποφύγετε τις συνεχόμενες εφαρμογές με Amistar 25 SC. Μετά τον ψεκασμό με Amistar 25 SC να ακολουθούν επεμβάσεις με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. Για παράδειγμα, εναλλαγή του Amistar 25 SC με τα μυκητοκτόνα που έχουν σαν δραστικό ουσία τα kresoxim methyl, famoxadone, fenamidone, picoxystrobin, pyraclostrobin, trifloxystrobin, fluxoxastrobin, metominostrobin, oryastrobin, dimoxystrobin & το enestrobutin, δεν επιτρέπεται. Οι εναλλαγές συνεχίζονται με την ίδια σειρά και στις ακολουθούμενες καλλιεργείες.

Φυτοτοξικότητα:

1. Το Amistar είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. Μην χρησιμοποιείτε το Amistar για εφαρμογές στις μηλιές ή όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νέφος να φθάσει σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς.
2. Ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές με το Amistar 25 SC να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

Τελεία ενέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Ζαχαρότευτλα: 30 ημέρες. **Ρύζι:** 28 ημέρες. **Σιτάρι:** 35 ημέρες. **Ελαιόκραμβη:** 21 ημέρες.