Φυτοτοξικότητα: *Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.*

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης: *Στην αρχική του συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.*

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: *Λάχανο: 7 ημέρες. Τομάτα, κουνουπίδι, μπρόκολο: 3 ημέρες. Μαρούλι ,Σαλάτα, iceberg, Σγουρό μαρούλι, μαρούλι ρομάνα, ήδλες, ρόκα, αντίδι, σκάρολα, ραντίσιο, Αρωματικά φυτά (όπως θυμάρι, βασιλικός, δενδρολίβανο, ρίγανη, μαντζουράνα, σχοινόπρασο, μαϊντανός, εστραγκόν, κύμινο, μάραθος, κοριάνδος), Αραβόσιτος, γλυκό καλαμπόκι: 14 ημέρες.*

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμα (max)	κ. εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα		
Τομάτα (Υπαίθρου	Πράσινο σκουλήκι (helicoverpa armigera) Σποντόπτερα (Spodoptera exigue, spodoptera littoralis) Tuta absoluta	40	–	20-100	Στη φάση της ωοτοκίας ή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών στα φύλλα ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημερών
Μαρούλι Σαλάτα, iceberg, Σγουρό μαρούλι, μαρούλι ρομάνα, ήδλες, ρόκα, αντίδι, σκάρολα, ραντίσιο Αρωματικά φυτά (όπως θυμάρι, βασιλικός, δενδρολίβανο, ρίγανη, μαντζουράνα, σχοινόπρασο, μαϊντανός, εστραγκόν, κύμινο, μάραθος, κοριάνδος) (Υπαίθρου)	Πράσινο σκουλήκι (helicoverpa armigera) Σποντόπτερα (Spodoptera exigue, spodoptera littoralis)	40	–	20-100	Στη φάση της ωοτοκίας ή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών στα φύλλα ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημερών
Λάχανο Κουνουπίδι Μπρόκολο (Υπαίθρου)	Πλουτέλα (plutella xylostella) Πιερίδα (Pieris brassicae) Πράσινο σκουλήκι (helicoverpa armigera) Σποντόπτερα (Spodoptera exigua, spodoptera littoralis)	40	–	20-100	Στη φάση της ωοτοκίας ή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών στα φύλλα ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημερών
Καλαμπόκι Γλυκό Καλαμπόκι	Λεπιδόπτερα (Ostrinia nubilalis)	30	–	20-100	Στη φάση της ωοτοκίας ή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών στα φύλλα ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημερών

Παρατηρήσεις: *•Απαγορεύεται η χρήση στο θερμοκήπιο •Ανεξάρτητα από τους όγκους νερού που χρησιμοποιούνται, να τηρείτε τις δόσεις ανά στρέμμα για κάθε καλλιέργεια.*

L172087 GREC/5R

Ampligo®
150 ZC

syngenta®

Chlorantraniliprole + lambda cyhalothrin

Μείγμα (ZC) από Μικροκάψουλες σε εναιώρημα (CS) και Πυκνό εναιώρημα (SC)

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.: 14444/21-5-13

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Chlorantraniliprole 10% β/ο
Lambda cyhalothrin 5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 84,9% β/β

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση του πράσινου σκουλήκιού, της σποντόπτερας, της πιερίδας και προνυμφών φυλλώματος σε διάφορες καλλιέργειες υπαίθρου.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: ***Syngenta Hellas A.E.B.E.***
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13
www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lt e

Χη

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

- ***Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης και όταν εισπνέεται.***

Ν

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- ***Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες ανεπιθύμητες επιδράσεις στο υδρόβιο περιβάλλον.***

TM

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. •Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. •Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. •Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικά: *Μεταφέρετε τον παθόντα σε καλά εξαεριζόμενο χώρο και προφυλάξτε τον από την υποθερμία. Σε περίπτωση υποψίας δηλητηριάσεως καλέστε αμέσως γιατρό.*
Επαφή με τα μάτια: *Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για μερικά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.*
Κατάποση: *Χορηγήστε επαναλημμένα ιατρικό άνθρακα με μεγάλες ποσότητες νερού. Μην χορηγήσετε οτιδήποτε εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.*
Επαφή με το δέρμα: *Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.*
Αναπνοή: *Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα.*
Αντίδοτο: *Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.*
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά στα επιφανειακά ύδατα.
Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους.
Για να προστατεύσετε τα ωφέλιμα αρθρόποδα να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας ***5 μέτρων*** *σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης* ***95%*** *της διασποράς του ψεκαστικού νέφους για την καλλιέργεια της τομάτας, μια αψέκαστη ζώνη προστασίας* ***5 μέτρων*** *σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης* ***50%*** *της διασποράς του ψεκαστικού νέφους για την καλλιέργεια του καλαμποκιού και μια αψέκαστη ζώνη προστασίας* ***5 μέτρων*** *σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης* ***75%*** *της διασποράς του ψεκαστικού νέφους για τις υπόλοιπες εγκεκριμένες καλλιέργειες, μέχρι μη γεωργική γη.*
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας ***10 μέτρων*** *από τα επιφανειακά ύδατα.*
Επικίνδυνο για τις μέλισσες.
Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά την ημέρα της χρήσης του προϊόντος. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.
Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για μία ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: *Το chlorotraniliprole, ανήκει στην χημική ομάδα των ανθρανιλίκών διαμιδίων και έχει έναν νέο τρόπο δράσης σε βιοχημικό επίπεδο, χωρίς να εμφανίζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με καμία από τις γνωστές ομάδες εντομοκτόνων. Δρα ενεργοποιώντας τους υποδοχείς της ryanodine (ryanodine receptor modulator) με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της λειτουργίας του μυϊκού συστήματος, την παράλυση και το θάνατο των εντόμων.*
Το lambda cyhalothrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράδονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, πράγμα που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

Τρόπος εφαρμογής: *Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.*

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: *Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστήρα με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκεύασμα πριν τη χρήση. Προσθέστε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Αναδεύετε και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.*

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: *Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.*

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: *Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερό του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.*

Αρ. Παρτίδας:
Ημ/νία Παραγωγής: