

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.
- Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικινδύνα απόβλητα.
- Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτία δεδομένων.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατρεί τις αισθήσεις του).

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης ή μετά από παρατεταμένη εισπνοή να μην προκληθεί εμετός. Προσοχή να μην γίνει πνευμονική αναρρόφηση. Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν χρειαστεί συμβουλευθείτε γιατρό. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Τα παράγωγα αδρεναλίνης αντενδεδεικνύται. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Το σκεύασμα πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες 20-30 °C στην αρχική του κλειστή συσκευασία. Σ' αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Βλέπε φάλη



Ανσερ

ANSWER 36 EC

Ζιζανιοκτόνο

Xη



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διανομέας:



ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ. Γληνού 32, Βαυλιόρη, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com
www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Diclofor methyl - Ντικλοφ όφ μεθύλ 36%

Εγγυημένη Σύνθεση: diclofor-methyl 36% B/O
Βοηθητικές ουσίες: 64,16% B/B

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι, κριθάρι και ορισμένες πλατύφυλλες καλλιέργειες

- Εύφλεκτο
- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
- Ερεθίζει το δέρμα.
- Κινδύνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Αρ. Εγκρ. Κυκλοφορίας: 7900/23.12.2008

Κάτοχος της Έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.
C/Alcala, 498 - 2a Planta
MADRID - ΙΣΠΑΝΙΑ, Postal Code: 28027
Τηλ.: +34 913273200, Fax: +34 913037172, E-mail: global@tradeorp.sapec.pt

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΣΤΟΧΑΙ	ΔΟΣΗ κ.εκ./στρέμμα	ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καρότο	Καταπολέμηση ετησίων αγρωστωδών ζιζανίων	350	Εφαρμογή με ψεκασμό όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των 2 ή 3 φύλλων και δεν έχουν καλυφθεί από την καλλιέργεια
Λάχανο, Φασόλι		300	
Πατάτα		250-300	
Σιτάρι (μαλακό και σκληρό)		250	
Κριθάρι		200-250	
Ζαχαρότευπλα, Καπνός		300	

Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο: 1 για όλες τις καλλιέργειες.

Όγκος Ψεκαστικού Υγρού (λίτρα/στρέμμα):

Καρότο: 40-50, Λάχανο, Φασόλι: 30-60, Λοιπές καλλιέργειες: 30-50

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Αγριοβρόμος (Avena spp), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Φάλαρη (Phalaris spp), Μίλιο (Milium vermale), Στάρι (Setaria spp), Αματόχορτο (Digitaria sanguinalis), Πολύανθη ήρα (Lolium multiflorum), Ελευσίνη (Eleusine indica) κ.ά.

Επίσης καταπολεμά Βέλιουρα (orghum halepense) που προέρχεται από σπόρο.

Στο κριθάρι εφαρμόζεται η δόση 250κ.εκ./στρέμμα σε περίπτωση μεγάλης προσβολής από αγριοβρόμη.

Στην πατάτα εφαρμόζουμε τη μεγάλη δόση σε περίπτωση μεγάλης προσβολής.

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ:

- Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
- Χρησιμοποιείστε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- Μην σπέρνετε και μην φυτεύετε άλλη καλλιέργεια στην ψεκασμένη έκταση πριν περάσουν 3μήνες από την εφαρμογή του.
- Μην μολύνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
- Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- Ψεκάζετε με πίεση όχι μεγαλύτερη από τρεις (3) Atm (45PSI).
- Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό στο οποίο μπορεί να προστεθεί διαβρεκτικός παράγων για καλύτερη απομάκρυνση των υπολειμμάτων του ψεκαστικού διαλύματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογή με ψεκασμό όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των 2 ή 3 φύλλων.

Η εφαρμογή είναι ανεξάρτητη από το στάδιο ανάπτυξης των καλλιεργούμενων φυτών, αλλά ο βαθμός επιτυχίας της εφαρμογής εξαρτάται και καθορίζεται μόνο από το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων.

Πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 ατμ. (45 PSI).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το ψεκαστικό κατά τα 2/3 με νερό και προσθέστε την αναγκαία ποσότητα του σκευάσματος ανακατεύοντας. Ξεπλύνετε τα άδεια υλικά συσκευασίας τρεις (3) φορές με άφθονο νερό που θα το ρίξετε και αυτό στο διάλυμα. Υπό συνεχή ανάδευση προσθέστε το υπόλοιπο νερό.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Το σκεύασμα δεν πρέπει να συνδυάζεται με ορμονικά ζιζανιοκτόνα. Η εφαρμογή αυτών θα πρέπει να γίνεται 8-10 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτινάζονται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.