



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μίγμα δύο μυκητοκτόνων ενός επαφής (propineb) και ενός διαυστηματικού (triadimenol) με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΠΕΛΙ

Ωίδιο (*Uncinula necator*), Περονόσπορος (*Plasmopara viticola*): Πριν την άνθηση, όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 5-10 εκ. και μέχρι την αλλαγή του χρώματος των ραγών ανά 10-12 ημέρες. **Δόση:** 200 γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (300 γρ. / στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 150 λίτρα / στρέμμα.

ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ)
Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*), Αλτερνάρια (*Alternaria solani*): Προληπτικές εφαρμογές ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ανά 7-10 ημέρες. **Δόση:** 200 γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (280 γρ. / στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 140 λίτρα/στρέμμα.

ΑΙΤΟΥΡΙ (Υ+Θ)
Ωίδιο (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*), Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*): Προληπτικές εφαρμογές ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ανά 7-10 ημέρες. **Δόση:** 200-250 γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (400-500 γρ. / στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 200 λίτρα/στρέμμα.

Διανομέας:
Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100

ΠΕΠΟΝΙ (Υ+Θ)
Ωίδιο (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*), Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*): Προληπτικές εφαρμογές ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ανά 7-10 ημέρες. **Δόση:** 200-250 γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (200-250 γρ. / στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Αμπέλι: 2, Τομάτα (Υ+Θ), Αγγούρι (Υ+Θ), Πεπόνι (Υ+Θ): 3.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ
Στις καλλιέργειες αμπέλι και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
Αμπέλι: 35 ημέρες, Αγγούρι, Τομάτα, Πεπόνι: 21 ημέρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση.



Bayer CropScience



Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ψεκασμοί φυλλώματος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας (σακούλες), μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίασμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστάμενες καλλιέργειες και δόσεις.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και χωρίς να εκτίθεται απ'ευθείας σε ήλιο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Ημ. Παρασκευής - Ημ. Λήξης: Βλέπε στο καπάκι του κουτιού.

Αρ. Παρτίδας: Βλέπε εσωτερική σακούλα.



5 200309 892510



Καθ. βάρος 800γρ. e

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγ. σύνθεση: propineb 65% β/β, triadimenol 2% β/β
Βοηθ. ουσίες: 26,51% β/β

Μυκητοκτόνο

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

- Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης
- Επιβλαβές: Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ABEE

L



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μην τρώτε, μην πίνετε ή μην καπνίζετε. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Μετακινήστε τον παθόντα από την επικίνδυνη περιοχή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύντε το αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και βγάλτε τα λερωμένα ή βρεγμένα ρούχα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210 7793777.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

L 02 0483 11