

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ: -Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτηροφές. - Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. - Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια - Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. - Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. - Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. - "Φοράτε κατάλληλες μπότες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής"

"Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον φεκασμό"

"Για την περίπτωση κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης."

Πρώτες βοηθείες – Αντίδοτο: Γενικά: Σε περίπτωση αποχύτασης ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). Σε περίπτωση επαφής με τα δέρμα: Αφαρέστε τα εμποτισμένα με το φεκαστικό υγρά ρουχά αμέως και πλυντείτε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του ώματος με νερό και σαπούνι και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείτε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλεύεθετε οφθαλμάτρο. Σε περίπτωση κατάποσης: Να μη δώσετε υγρά και να μην προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή ή την ετικέτα του. Πληροφορίες για το γιατρό: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπατωματική θεραπεία.

Τήλ. Κέντρου Δηλητηρίασην: 210.77.93.777

Το υλικό και ο περιέκτης του θα θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ειλικρίδεωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές δόνησες δελτίο δ σ δ ο μ έ ν ω ν α γ α σ φ α λ ε ι α ζ . ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΗ ΤΟΥ. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήστε μιαν αφέκστη ζόνη προστασίας 30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες του αμπελού, και των κληπτικών των οποίων η ανάπτυξη υπερβαίνει τα 50 cm και 10 μέτρων για τα κηπευτικά των ο π ο ι ω ν ή α ν ά π τ ο υ ξ η είναι να μετρήσετε την ζόνη προστασίας μη υπερβαίνει τα 50 cm. Για να προστατέψετε μη στοχευμένα αρθρότοδα να αφήστε μιαν αφέκστη ζόνη προστασίας 50 μέτρων από τη μη γεωργική γη για τις καλλιέργειες του αμπελού και των κηπευτικών των οποίων η ανάπτυξη υπερβαίνει τα 50 cm. Επικίνδυνα για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και όλα έντονα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζέανιον. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζέανια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται μετά την ώρα συλλογής των μελισσών (αργά το απόγευμα). Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για 1 ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό.

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΗΜ. ΛΙΘΗΣ - ΑΡ. ΠΑΡΤΔΟΣ: Βλέπε όντα μέρος φύλλου

APHICAR 100 EC

Cypermethrin (Συπερμεθριν) 10 % β/ο (χημ.ομάδα πυρεθρινοίσιδή) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Εγγυημένη σύνθεση: Cypermethrin: 10% β/ο, Βοηθ. ουσίες: 88,4% β/β ΑΑΔΑ: 14376 /28-12-2011

Πυρεθρινοίσιδες εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαιύλων Na+ στους νευράδες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης ασκεί αντιτροφική δράση.

ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιεχόμενο: 1 Λίτρο

Κέπος της έγκρισης:
IRIS SOLPACK SAS,
1126A Avenue du Moulinas –
Route de St Privat,
30340 SALINDES. Γαλλία
Υπεύθυνος επικοινωνίας - Υπεύθυνος για την
τελική διάθεση στην Ελλάδα:
ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,
ΦΥΛΗΣ 232, 11252 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210.8623144
FAX: 210.8663978

Εργοστάσιο συσκευασίας -Διανομέας:

ΧΕΛΛΑΦΟΡΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ: Φλέμιγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ: 210.68.00.900
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ, 57022 Σινάρο, Τηλ: 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ: 22380.22.008-9

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άμπελοι: για Ευδέμιδα, Κοχυλίδα με δόση 30 κ. ε.κ./ στρέμμα ή 30-60 κ. ε.κ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50 – 100. Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Φυλλώδη λαχανικά: Μαρούλι (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου):** για Πράσινο ακουλήκι, Πράσινη αφίδα (Myzus persicae) με δόση 30 κ. ε.κ./ στρέμμα ή 37,5-50 κ. ε.κ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 60-80. Ένας ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **Τομάτα, Μελιτάνια (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου):** για Πράσινο ακουλήκι, Πράσινη αφίδα (Myzus persicae) με δόση 30 κ. ε.κ./ στρέμμα ή 30-60 κ. ε.κ./ στρέμμα ή 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50-100. Ένας ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **Κουνουπίδι, Μπρόκολο, λάχανα (Υπαίθρου):** για Πράσινη αφίδα (Myzus persicae) με δόση 30 κ. ε.κ./ στρέμμα ή 30 κ. ε.κ./ στρέμμα ή 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 100. Ψεκασμοί με πτηνή εμφάνιση της προσβολής. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι μικρές δόσεις σκευάσματος ανά 100λίτρο χρησιμοποιούνται με τους μεγάλους όγκους ψεκαστικού διαλύματας και οι μεγάλες δόσεις σκευάσματος ανά 100λίτρο με τους μικρούς όγκους ψεκαστικού διαλύματας, έτσι ώστε σε κάθε περιπτώση να μην ξεπερνείται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα (30 κ. ε.κ.). Τρόπος εφαρμογής: Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμό φυλλώματος εξασφαλίζοντας πολύ καλή και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό κατά 3/4 και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται το πλήθυσμα των εντόμων και να μείνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως αποτάξεις για αποτελεσματικό λεγχού. Εφαρμογές, μάλισταν είναι απαραίτητο, με βάση τα πιθανά υφιστάμενα άρια οικονομής ζημιά και με τρόπο ώστε να μειωνείται ο κίνδυνος για τα ωφέλιμα αρθρόποδα. Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. Μη αποφέυγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με APHICAR 10 EC. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τα περιθωριούδια. Να διενεργεύεται συστατικός λεγχούς των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπιοθεί έγκριψη ανδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστώνεται περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Συνδυαστικότητα:-

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αμπελέ, Μαρούλι, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, λάχανα: 7 ημέρες Τομάτα, Μελιτάνια 7 ημέρες (Υπαίθρου), 3 ημέρες (Θερμοκηπίου)

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στα ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφόνται προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περιττώρευτης εφαρμογής, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρού, δροσερού και καλά αεριζόμενο μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως