

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
•Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. •Να φοράτε μάσκα κατά την αναμίξη φόρτωση και εφαρμογή. •Να φοράτε κατάλληλα υποδήματα κατά την εφαρμογή. •Μαζεύετε τη χυμένη ποσότητα. •Το υλικό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατεθούν σε συγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικά: Μετακινείτε τον παθόντα σε καθαρό αεριζόμενο χώρο ή σε καθαρό αέρα και προστατέψτε τον από υποθερμία. Αν υποψιάζεστε δηλητηρίαση, καλέστε αμέσως γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό κρατώντας τα βλεφάρια ανοιχτά για αρκετά λεπτά τουλάχιστον και καλέστε αμέσως γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα βρωμένα ρούχα και πλύνετε πολύ καλά τα βρωμένα μέρη του σώματος με νερό πρώτα και με σαπούνι και νερό στη συνέχεια. Τα βρωμένα ρούχα πρέπει να πλυθούν καλά και να σιδερωθούν πριν ξαναφορεθούν.
Σε περίπτωση αναπνοής: Απομακρύνετε το άτομο από την επικίνδυνη περιοχή σε καθαρό αεριζόμενο χώρο και προστατέψτε το από την υποθερμία. Για προληπτικούς λόγους καλέστε γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το γιατρό και δείξτε του αυτό το δοχείο ή την ετικέτα, μην προκαλέσετε εμετό.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για να προστατέψετε φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων ή 5 μέτρων** με χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς από μη γεωργική γη.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **18 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.
Περιέχει **prosulfocarb** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή ακάσιμο.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος δράσης:
Περιέχει συνδυασμό δύο δραστηνών συστατικών του prosulfocarb (θειοκαρβαμικό) και του metribuzin (τριαζινόνη) με ζιζανιοκτόνο δράση.

Τρόπος εφαρμογής:
Καθοδικός ομοιομορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους με ψεκαστήρα υψηλού όγκου και ψεκαστικό υγρό 20-40 λίτρα / στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Βάζουμε στο ψεκαστικό δοχείο τη μισή της απαιτούμενης ποσότητας νερού και υπό συνεχή ανάδευση ρίχνουμε το Arcade 880EC. Υπό συνεχή ανάδευση συμπληρώνουμε το υπόλοιπο νερό. Το ψεκαστικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του, αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:
Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανακίνηση ενέργειας.

L178124 GREC/2S



Arcade®
880 EC



Prosulfocarb
Metribuzin
Γαλλικατωματοποίησημο Υγρό (EC)
Αρ. Έγκρ. Κυβλ. Υπ. Γεωργ.: 70066/29-1-2014

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Prosulfocarb 80% (β/ο)
Metribuzin 8% (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 12.5 % β/β
Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλάτυφυλλων ζιζανίων σε πατάτα.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: **Syngenta Hellas A.E.B.E.**
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13
www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lte

ΠΡΟΣΟΧΗ



• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: •σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μετά την εφαρμογή του Arcade 880EC μπορεί να επανασπαρθεί μόνο πατάτα. •σποράς ή φύτευσης καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε προγράμματα αμειψισποράς, μετά την εφαρμογή του προϊόντος μπορούν να επανασπαρθούν όλες οι καλλιέργειες. •της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Οι εργάτες κατά την είσοδο τους στον αγρό μετά την εφαρμογή πρέπει να φορούν γάντια και κατάλληλα υποδήματα. Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης: Αποθηκεύεται στην αρχική του απαράβαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από -10 °C και μεγαλύτερες από +35 °C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Πατάτα: δεν ορίζεται.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ/ στρέμμα (max)	κ.εκ σκ./ 100 λίτ. ψεκ. υγρό	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Πατάτα	Ετήσια αγρωστώδη και πλάτυφυλλα ζιζάνια	400-500	–	20-40	Προφυτρωτικά. Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται σε βαριά, οργανικά εδάφη και σε περίπτωση μεγάλων πληθυσμών ζιζανίων.	1
Παρατηρήσεις: Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγρωστώδη: Echinochloa crus-galli, Lolium rigidum, Setaria viridis. Πλάτυφυλλα: Aethusa sp., Amaranthus blitoides, Amaranthus retroflexus, Atriplex patula, Chenopodium album, Datura stramonium, Fumaria officinalis, Mercurialis annua, Polygonum aviculare, Polygonum convolvulus, Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, Senecio vulgaris, Urtica sp, Xanthium spinosum. Για καλύτερη αποτελεσματικότητα εφαρμόστε προφυτρωτικά σε υγρό και καλά επεξεργασμένο έδαφος.						

Αρ. Παρτίδας:
Ημ/νία Παραγωγής:

