

Ascot®

2,5WG

Lambda-cyhalothrin (Λάμδα-συσληοθρίν) 2,5%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι

ΑΣΚΟΤ:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, ευρέος φάσματος. Δρα δίεπαφής και διά στομάχου, με προληπτική και καταστατική δράση, για τον έλεγχο μυζητικών και μαστικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, πράγμα που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και ρίξτε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: Πράσινη αφίδα, Μύγα Μεσογείου. Δόση: **40 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Ψεкаσμοί φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής.
ΠΑΤΑΤΑ: Πράσινη αφίδα. Δόση: **60 γρ./στρ.** Δορυφόρος. Δόση: **40 γρ./στρ.** Ψεкаσμοί φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):

Ροδακινιά-Νεκταρινιά (100-150), Πατάτα (50-80).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 15 ημέρες.

Παρατηρήσεις:

Χρησιμοποιήστε τη μεγάλη δόση σε περίπτωση μεγάλης προσβολής.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

•Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιο-λογικών μεθόδων, ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. •Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. •Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλώτικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. •Να αποφεύγονται διαδοχικές εφαρμογές με το **Ascot® 2,5WG**. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα, με διαφορετικό τρόπο δράσης. •Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων, ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Ροδάκινα-Νεκταρινία: **7 ημέρες.**

Πατάτες: **15 ημέρες.**

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Το σκεύασμα φυλάσσεται στην αρχική του συσκευασία, σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας. Σε αυτές τις συνθήκες, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

Βλέπε επί της συσκευασίας.

Ascot®

2,5WG

Lambda-cyhalothrin (Λάμδα-συσληοθρίν) 2,5%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι

Εγγυημένη σύνθεση: **Lambda-cyhalothrin 2,5% β/β**
Βοηθητικές ουσίες 97,4% β/β

Αρ.Έγκρ.Κυκλ.οφ.: 14407/23.10.2012

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο ευρέος φάσματος επαφής & στομάχου

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΕΑΝ ΚΑΤΑΠΟΘΕΙ

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

Κάτοχος της έγκρισης:

Proplan - Plant Protection Company SL,
Ισπανία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση του προϊόντος στην ελληνική αγορά-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



Μέλος του



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο αν το άτομο έχει τις αισθήσεις του). Μην προκαλείτε εμετό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** βγάλτε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπρεπε σκεύασμα. Ξεπλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση εισπνοής,** βγάλτε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον σε ανάπαυση. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777**

Ν ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ (ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ / ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΡΥΠΑΝΣΗ ΜΕΣΩ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΥΛΕΣ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΥΣ)
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΦΕΡΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΜΙΑΝ ΑΨΕΚΑΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ **30 ΜΕΤΡΩΝ** ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ **20 ΜΕΤΡΩΝ** ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΤΑΤΕΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΤΑ ΜΗ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ, ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΜΙΑΝ ΑΨΕΚΑΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ **10 ΜΕΤΡΩΝ** ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ **5 ΜΕΤΡΩΝ** ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΝΤΟΜΑ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ Ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ Ή/ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΤΕ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ Η ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ ΟΙ ΚΥΨΕΛΕΣ

01/2013-3



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 400 γρ.